

古植物 漢名 圖考

主編 高明乾

副主編 盧龍門

大象出版社



內容提要

該書收載了植物古漢名4394個，分屬於177科，800種。附圖789幅，80餘萬字。對每個植物古漢名都作了注釋，標明了現代漢名和世界通用的拉丁名，注明了出典或書證，傳承古今，溝通中外。對每種植物的形態特征、生境產地、簡要用途作了介紹，還附有植物形態圖便于讀者識別。作為我國第一部《植物古漢名圖考》，給生物學、農學、醫藥學、林學、花卉學、文學、史學、地理學等工作人員帶來莫大的方便。

恭賀植物古漢名圖考問世

承傳古今
溝通中外

國家自然科學基金委員會
生命科學部 王欽鈞
二〇〇〇年
五月十日

國家自然科學基金資助項目(30370864)

植物古漢名圖考

顧問 葉和春
審校 張銘哲 圳 朵 開 川

主編 高明乾
副主編 盧龍門
編委 馬劍敏 劉萍
李發啓 張紅緒
高樺 張晉豫
李金亭 靳萍
劉福林 張勝
龐振玲 易朝暉
朱鳳榮 劉家棟

大象出版社

前 言

拯救古文化是刻不容緩的研究課題。

植物古漢名在文學、史學、生物學、農學、植物學、醫藥學、林學、花卉學以及地理學等古代文獻中大量存在。例如，《詩經》、《楚辭》、《爾雅》、《神農本草經》、《神農本草經集注》、《本草綱目》、《植物名實圖考》等古典著作中都記載有很多植物，由於歷史變遷，時代跨度長，植物名稱發生嬗變，我們有必要確認它們並搞清它們的古名、今名、拉丁名、生境、產地、特徵、用途，這對科研和教學有重大意義，具有學術價值和社會價值。

歷史上許多學者都做過植物名的訓詁工作。李時珍在《本草綱目》中記述了大量植物古名稱，他感慨：“古有《本草》一書，自炎黃及漢、梁、唐、宋，下迨國朝，注解群氏舊矣。第其中舛謬差訛遺漏不可枚數，乃敢奮編摩之志，僭纂述之權。歲歷三十稔，書考八百餘家，稿凡三易。復者芟之，闕者緝之，訛者繩之。”清末植物學家吳其濬完成了巨著《植物名實圖考》，他說：“古今草木，同名異物，同物異名，何可悉數。”“稱名亦無確詁，蓋方言侏僂，難為譯也。”清末以來，我國學者開始用雙名法命名植物，同時也考證植物古漢名。胡先驕先生 1915~1918 年間寫了數篇《說文植物古名今證》的文章；劉壽聘先生於 1919~1922 年間發表了 4 篇《植物異物同名考》；張宗緒 1920 年出版有《植物名匯拾遺》；鐘觀光、夏緯瑛兩先生曾從事古代本草的考證研究。鐘觀光先生曾以《植物名實圖考》的考證工作為主，對我國古代植物學著作進行了廣泛而深入的研究，結合實地考察，寫成《植物古名考證》初稿及其他手稿 150 餘萬字。可惜這些手稿在抗日戰爭中大都遺失了。另外，孔慶來、孫醒東、陸文鬱、陳禎、伊欽恒、吳征鎰、李璠、繆啓愉、林有潤等先生都做過有價值的工作。《中國植物誌》和《高等植物圖鑒》的出版，也給植物古漢名的訓詁工作帶來了很大的方便。

植物古漢名的研究，大體上還有以下一些問題：一是古代文獻繁多，而被認真研究過的只是少數，已有成果不够全面系統。二是由於地域不

同和歷史變遷，同物異名、異物同名的現象大量存在，有待進一步回溯查找。三是需要補充實地考察資料，特別是對西域、嶺南、雲、貴、川等地域性彊的植物名的確認。四是要根據植物學發展的水平，訂正古漢名注釋中的錯誤。

爲了傳承古今、溝通中外，我們組織河南師範大學生命科學學院、中文系和其他院校的同志，用訓詁學和現代植物分類學相結合的方法，從浩如煙海的古代文獻中收集和考證了大量植物古漢名，在繼承前人成果的基礎上，做了進一步的補充、整理、校勘，終於完成了《植物古漢名圖考》的編纂。《植物古漢名圖考》收集植物古漢名 4394 個，分屬 177 科，800 種（包括變種）；對每種植物注出今名、拉丁名，對其形態、特徵、生境產地和主要功用做了介紹；計 80 餘萬字，配圖 789 幅。這個項目是國家自然科學基金委員會和河南省教育委員會（教育廳）立項的自然科學基礎研究項目。在這一課題研究過程中，高明乾教授做了大量的前期工作，從 1974 年開始，已歷時 25 年之久。

參加《植物古漢名圖考》編纂的有：高明乾、盧龍門、馬劍敏、劉萍、李發啓、張紅緒、張晉豫、高樺、李金亭、靳萍、劉福林、張勝、龐振玲、易朝暉、朱鳳榮、劉家棟。

本課題在研究過程中，受到了國家自然科學基金委員會、河南省教育委員會（教育廳）和王欽南、葉和春等先生的大力支持，並獲得了河南師範大學學術專著出版基金的資助，謹於此表示誠摯的感謝！

錯漏之處，請批評，以求改進。

《植物古漢名圖考》編輯組

1999 年 1 月

凡 例

1. 古典著作的時間跨度：在時間跨度上，由 1848 年即吳其濬著《植物名實圖考》刊行之時為界，其前的所有典籍記載的植物都列入研究對象。另據龔啓鎣先生指出，我國植物學發展史可劃分為四個時期：由上古神農至莊襄王三年（公元前 247 年），稱為自彊不息時期；由秦始皇元年（公元前 221 年）到清道光二十七年（1847 年），稱為旁系維係時期；由清道光二十八年（1848 年）延續到 1931 年稱為樂觀時期；預測 1931 年以後為長足進步時期。在 1848 年以前，西方文化對中國文化尚未產生大的影響，我們把此前的著作稱為古典著作。

2. 內容的編排格式：分為注釋條目和一般條目。注釋條目中介紹某種植物的其他古漢名，要在一般條目中作簡要介紹；注釋條目介紹的內容較詳細，一般條目介紹的內容較簡略，欲知詳細內容請轉查該種植物的注釋條目或其他條目。它們的格式分別為下：

注釋條目：	古漢名	現代漢名	(科名)	拉丁名
其他古漢名	書證	拉丁名釋義	形態描述	生境產地
簡要用途	附圖			
一般條目：	古漢名	現代漢名	(科名)	拉丁名
出典或書證	詳見某注釋條目或有相同書證的一般條目			

3. 目錄及內文字形：以繁體字筆畫為序編排目錄和內文。目錄詞條按首字筆畫多少分部；每部中以首字首筆橫、豎、撇、點、折（一、丨、丿、丶、㇇）排序分檔；每檔中首字左右結構先排，上下結構次之，其他結構綴後，“乚”按點“丶”檔集中排。另外，繁體字異體較多，我們一般以微機字庫中的繁體字為準，查找時請注意。目錄中注釋條目的古漢名前加星號“*”以示區別。個別條目考慮到與其他條目的聯系，順序略有出入。

4. 古漢名：選自古代典籍中的植物名（個別古漢名選自民國初期書

籍),以古今名稱有差異者,包括同物異名或同名異物者為選取對象,古今名一致者,一般不再收入。

5. 現代漢名:以《中國植物誌》、《中國高等植物圖鑒》等著作上的植物名為現代漢名,一般不用俗名作為現代漢名,以保持植物命名的規範性。有的古代漢名包現代植物分類學上同屬的多種植物,一般選用該屬常見植物為代表。

6. 書證:書證內容選自某古典原著,少數轉引自其他著作(如《唐本草》)。一般條目中的書證不作重複引證,可詳見其他條目中的引證。

7. 拉丁名:植物的拉丁名選自《中國植物誌》或《高等植物圖鑒》。少數拉丁名選自地方植物誌或其他植物分類書籍。當一種植物只能判定它是某屬,而確定不了種名時,可在屬名後加拉丁文種的縮寫符號“sp.”;當某古漢名泛指某屬的多種植物,不好具體指哪一種植物時,可在屬名後加注“spp.”。

8. 拉丁名釋義:介紹拉丁文學名的含義,便於讀者了解拉丁名的來源或了解該植物的某種特徵,增加對該植物的相關知識。內容大多選自《拉漢植物學名辭典》、《植物種名釋》和《中國樹木學名詮釋》等典籍。有些拉丁名的含義難於查到,付缺存疑。

9. 形態描述等:形態描述中簡要介紹該種植物在根、莖、葉、花、果實、種子等方面的主要特徵,以及介紹該植物的生境、產地、簡要用途。以便使植物學工作者以外的讀者增進對該植物的了解。

10. 附圖:附圖旨在直觀形象地表達植物的形態特徵和某器官或附屬物的特徵,便於讀者配合文字對照閱讀,也便於識別某種植物。一般人們熟悉的農作物、蔬菜、果木、樹木或花卉不再附圖。書中附圖由高明乾、李金亭、李發啓、張晉豫、靳萍等同志繪制,少數圖選自《中國高等植物圖鑒》、《中國植物圖鑒》、《中國經濟海藻誌》等書籍。特此說明並致謝。

11. 拉丁文索引:安排在《圖考》後面。

12. 後記

總目

前言	1
凡例	1
目錄	1
正文	1
拉丁名索引	525
後記	548

目 錄

一 畫

一丈紅	1
一帆青	1
一朵芙蓉花	1
一把抓	1
* 一枝香	1
一綫香	1
* 一瓣蓮	1

二 畫

* 二至花	2
十大功勞	2
十樣錦	2
丁子香	2
丁公藤	2
丁香茄	2
丁香柿	2
丁翁	2
丁廕	2
* 七星蓮	2
卜地蜈蚣	3
八月芒	3
* 八月春	3
八月蘭	4
* 八仙花	4
八仙草	4
* 八字草	4
八角大茴	4
八角金盤	5
* 八角茴香	5
八角茶	5
八角珠	5
八角烏	5
八角盤	5
八寶草	5

人字草	5
人柳	5
九子萍	5
九日	5
九英	6
九英菘	6
九英蔓菁	6
九真藤	6
九節蓮	6
九節蘭	6
* 九里明	6
* 九里明	6
九里香	7
九層塔	7
九頭獅子草	7
九蟲根	7
九叢根	7
乃東	7
刀鞘豆	7

三 畫

三百兩銀藥	7
三秀	7
三角尖	7
三角楓	7
三角酸	7
三枝九葉草	7
三庚草	7
三春柳	7
三柰	7
三柰子	7
三眠柳	7
三葉草	8
三葉酸	8
三葉酸草	8
三葉酸漿	8

三稜草	8
三廉	8
* 三蔓草	8
* 三賴	8
三斂子	9
三賴	9
土人參	9
* 土三七	9
* 土三七	9
土大黃	10
土瓜	10
土瓜	10
土瓜	10
* 土芋	10
土芝	10
土杏	11
土豆	11
土貝	11
土貝母	11
土貝母	11
土卵	11
土卵	11
* 土青木香	11
土茜	11
土茴香	11
* 土恒山	11
* 土馬鬃	12
土柴胡	12
土柴胡	12
土黃連	12
* 土草薺	12
土鹵	13
* 土參	13
土細辛	13
土細辛	14
土酥	14

土筋	14	大椒	17	* 山金橘	21
土鼓	14	大棗	17	山草	22
土鼓藤	14	* 大順筋藤	17	山茵陳	22
土蕁撥	14	大蒜	18	山胡椒	22
土蛹	14	大椿	18	* 山扁豆	22
* 土當歸	14	大腹子	18	山苣	22
* 土竭力	14	大蓼	18	山莧菜	22
土精	15	大適	18	山荷葉	22
土質汗	15	大戟	18	* 山桂	22
土薯	15	大薊	18	* 山烏龜	23
土櫃	15	大樹波羅	18	山黃楊	23
土藟	15	大頭菜	18	山菜	23
土蟲草	15	大澤蘭	18	山梔子	23
* 下馬仙	15	大薺	18	山葡萄	23
大一枝箭	15	* 大翹	18	* 山蔥	24
大力子	16	大藍	19	山蔥	24
大弋豆	16	大藍	19	山棘	24
大札	16	大蟲杖	19	山棗	24
大芥	16	大顛茄	19	山棗	24
大貝母	16	大蘭	19	山棗樹	24
大皂莢	16	丈菊	19	山絲苗	24
大青	16	* 上黨人參	19	山蒜	24
大苦	16	* 山大丹	19	山蒲桃	24
大茴香	16	山大豆根	20	山椿	24
大風茅	16	山大黃	20	山榆	24
大活血	16	山五甲	20	* 山園荜	24
大室	16	山牛蒡	20	山裏果	25
大紅花	16	山丹	20	山裏紅	25
* 大紅袍	16	山玉竹	20	* 山慈姑	25
大紅繡球	17	山石榴	20	山慈菰	25
大桂	17	* 山石榴	20	山辣	26
大菊	17	山地栗	21	山韶子	26
大萍	17	山芋	21	山精	26
大麥苳	17	山西胡麻	21	* 山漆	26
大救駕	17	山羊蹄	21	山樗	26
大眼桐	17	* 山豆根	21	山豬糞	26
大巢菜	17	山茄子	21	山薑	26
大葉冬藍	17	山粉榆	21	* 山薤	26
大葉楊	17	山金柑	21	山薯	27
大葉櫟	17	山金柑	21	山薊	27

山橘 27
 * 山鞠翦 27
 山斂 27
 山藥 27
 山藥蛋 27
 山瞿麥 27
 山蘄 27
 山躑躅 28
 山鷄茶 28
 山籬 28
 千心妓女 28
 * 千年艾 28
 千年健 28
 千年棗 28
 千年矮 28
 千年潤 28
 千里及 28
 千里急 29
 千兩金 29
 千兩金 29
 千金子 29
 千金草 29
 * 千金菜 29
 千重塔 29
 千歲子 29
 * 千歲藥 29
 千層塔 30
 千鍼草 30
 千鍼草 30
 川椒 30
 川草花 30
 川烏 30
 川強瞿 30
 川彈子 30
 * 夕句 30
 勺藥 31
 及地果 31
 及瀉 31
 女里 31
 * 女青 31

女兒茶 31
 女兒香 31
 女草 31
 女華 31
 女莖 31
 女萎 31
 女葳 31
 女楨 32
 女雷 32
 女節 32
 女蘭 32
 * 女蘿 32
 小一枝箭 32
 小木奴 32
 小芒草 32
 小牡丹 32
 * 小辛 32
 小青 33
 小柈 33
 小苦耽 33
 小荆 33
 小草 33
 小茴香 33
 小茴香 33
 小紅綠豆 33
 * 小桃紅 33
 小黃楊 34
 小萍子 34
 小菰 34
 小甜水茄 34
 * 小魚仙草 34
 小巢菜 34
 * 小葉薄荷 34
 小棘 35
 小筆管菜 35
 小蒜 35
 小楊 35
 小桌 35
 小酸苗 35
 小酸茅 35

* 小薊 35
 小龍牙 35
 小澤蘭 35
 * 子午花 35
 * 子午蓮 36
 子母草 36
 子菜 36

四畫

王瓜草 36
 王母珠 36
 王母簪 36
 王帚 36
 * 王連 36
 王彗 37
 王蒸 37
 王薺 37
 王壇 37
 井口邊草 37
 井闌草 37
 夫須 37
 夫須 37
 夫煙樹 37
 夫漏樹 37
 天王葉 37
 天仙藤 38
 天瓜 38
 天瓜 38
 天吊瓜 38
 天白 38
 * 天芥菜 38
 天豆 38
 * 天豆 38
 天青地紅 39
 天苴 39
 天茄 39
 天茄兒 39
 天炙 39
 天泡草 39
 天門精 39

* 天胡荽	39	木瓜花	45	木樨花	52
* 天南星	40	* 木奴	45	木橘	52
* 天南星	41	* 木奴樹	45	木藥子	52
天香菜	41	* 木耳菜	46	木蘭	52
天荷	41	木耳菜	46	木鹽	52
天麻草	41	木血竭	46	* 木欒	52
天葵	41	* 木羊乳	46	五木	53
天棘	41	* 木李	47	五木香	53
天然子	41	* 木威	47	五方草	53
天絡絲	41	木威子	47	五爪龍	53
天絲瓜	41	木骨	47	五月梅	53
* 天蓬草	41	木香	47	五月紅	53
天蔓菁	42	* 木香	48	* 五加	53
天蓼	42	木香	48	五加蕨	54
天蓼	42	木香	48	五行草	54
天蓼木	42	木桂	48	五色林檎	54
天精	42	* 木桃	48	五花	54
天精菜	42	木莓	49	五角楓	54
天蕪菁	42	* 木菌	49	五佳	54
天薤	42	木梨	49	五香	54
天燈籠	42	木棉	49	五葉木通	54
天薺	42	* 木軸子	49	五葉莓	54
天藕	43	木粟	49	五葉藤	54
天羅	43	木蓮	50	五稜子	54
天羅布瓜	43	* 木蓮	50	五楸	54
天羅絮	43	* 木蒴藿	50	五鳳草	54
天鹽	43	木蛾	50	* 五斂子	54
元及	43	木堽	50	支連	55
* 元胡索	43	* 木蜜	50	支解香	55
元修菜	43	木蜜	51	支蘭	55
元參	43	* 木蜜	51	不死草	55
元臺	43	木蜜	51	不死草	55
木八角	43	木蜜香	51	不死藥	55
木子	43	木綿	51	不凋草	55
木子樹	44	* 木綿	52	犬牙	55
* 木王	44	木稷	52	巨句麥	55
* 木天蓼	44	木彈	52	巨苾	55
木丹	44	木橘	52	巨荒	55
木禾	44	木龍	52	巨勝	55
木瓜	45	木樨	52	* 牙子	55

牙石	56	牛脣	62	* 文木	66
比目	56	牛曼	62	文光果	66
互草	56	牛棘	62	文希	66
瓦花	56	* 牛筋	62	文林郎果	66
* 瓦草	56	牛筋	62	文官	66
止行	56	牛莠子	62	文官花	66
少辛	56	牛遺	62	* 文官果	66
日及	57	牛癩	62	* 文星草	67
* 日及	57	牛藻	62	文冠花	67
日中金錢	57	毛召	63	文章草	67
日給	57	* 毛建草	63	文章樹	67
日精	57	毛荔支	63	* 文無	67
* 中庭花	57	毛堇	63	文錢紅	68
中藥	58	毛脚茵	63	* 文蘭樹	68
牛子蕉	58	毛蓼	63	方莖	68
牛毛黏	58	毛蕨	63	方賓	68
牛孌柿	58	升推	63	方潰	68
牛孌柑	58	升陽菜	63	方蘭	68
牛孌橘	58	* 仁頻	63	火母	68
* 牛皮凍	58	化木香	64	火把花	68
牛皮菜	58	介	64	火欵	68
* 牛耳大黃	58	公公鬚	64	火欵草	68
* 牛耳草	59	公母草	64	火炊燈	69
牛舌草	59	公孫樹	64	* 火麻	69
牛舌菜	59	月月紅	64	火參	69
* 牛舌頭花	59	月桂	64	火蔥	69
* 牛李	60	月記	64	火燄草	69
牛肚菘	60	月貴	64	火燄草	69
牛角花	60	* 月爾	64	* 火燄草	69
牛尾菜	60	丹荔	65	火燒草	70
* 牛尾蒿	60	丹桎木	65	心	70
牛尾蘊	61	丹棘	65	巴山虎豆	70
* 牛金子	61	丹楓	65	巴且	70
牛蝨鬼	61	丹黏子	65	巴椒	70
牛星草	61	印鉅	65	水蔔菜	70
牛屎柴	61	六月柿	65	水三稜	70
牛莖	61	六月春	65	水木樺	70
牛烏	61	六月凌	65	水巴戟	70
牛勒	61	* 六駁	65	* 水玉	70
牛菜	62	文	66	水旦	70

水白 71
 水白 71
 水瓜 71
 水芝 71
 水竹 71
 水芙蓉 71
 水芹菜 71
 水皂角 71
 水沉 71
 水青 71
 水英 71
 * 水松 71
 水菘 71
 * 水胡椒 72
 水香 72
 水香稜 72
 * 水泉 72
 * 水前胡 73
 水紅 73
 水華 73
 水華 73
 水菟菜 73
 水莎 73
 水硫黃 73
 水浚 73
 水堇 73
 水黃芹 73
 水菖蒲 73
 水萍 74
 水萍 74
 水薺菜 74
 * 水麻 74
 水參 74
 水葵 74
 * 水葵 74
 * 水粟 75
 * 水楊 75
 * 水楊柳 75
 * 水楊梅 76
 水慈菰 76

水葛 76
 * 水槐 76
 水對菜 77
 水辣菜 77
 * 水蘄 77
 水芸 77
 水劍草 78
 * 水錦花 78
 水薑薑 78
 水燈心 78
 水藍 78
 水蘊 78
 * 水瀉 78
 水蘇 79
 水蘇 79
 水蘇 79
 水鏡草 79
 水蟻草 79
 水簾 79
 水鬚 79

五 畫
 叩巨 79
 艾子 79
 艾菊 79
 艾蒿 79
 玉女 79
 玉朮 79
 玉札 79
 玉米 79
 玉芙蓉 79
 * 玉門精 79
 * 玉枝 80
 玉乳 80
 玉延 80
 玉容丹 80
 玉容草 80
 * 玉桃 81
 * 玉高粱 81
 玉麥 81

玉椒 81
 玉蜀秫 81
 * 玉豉 81
 玉蔓菁 82
 玉樞 82
 * 玉蕊花 82
 玉環 82
 玉鷄苗 82
 末利 82
 * 末麗 82
 示姑 83
 正馬 83
 去水 83
 * 甘瓜 83
 * 甘竹 84
 甘柘 84
 * 甘根 84
 甘棠 84
 甘蒲 85
 * 甘蕉 85
 甘澤 85
 甘藷 85
 * 甘藷 85
 甘藷 86
 甘露 86
 甘露兒 86
 * 古貝 86
 古度子 86
 * 古終藤 86
 朮律草 87
 左篆藤 87
 左轉藤 87
 左纏藤 87
 * 石下長卿 87
 石打穿 87
 石瓜 87
 石皮 88
 石竹 88
 石血 88
 石芥 88

石芥	88	平慮草	95	白朮	99
石花	88	可離	95	白瓜	99
石花	88	只刺	95	白瓜	99
石花	88	目草	95	白石木	99
石花菜	88	田字草	95	白地草	99
* 石花菜	88	田字草	95	白地栗	99
石長生	88	由胡	95	白地榆	99
* 石風丹	88	四大金剛	95	* 白羊鮮	99
石茵陳	89	四季花	95	白旱蓮	99
石華	89	四季豆	95	白杉	99
* 石荷葉	89	* 四季青	95	* 白楊	99
石能	89	四嶽近陽草	96	白芩	100
石被	90	四眼菜	96	白花草	100
石都念子	90	* 四葉細辛	96	* 白花射干	100
石菜	90	四葉草	96	* 白花益母草	100
* 石棗兒	90	* 四葉菜	96	* 白花益母草	101
石棠花	90	四補草	97	白花藤	101
石榆子	90	央匱	97	白花蟛蜞菊	101
* 石藍	90	出隧	97	* 白豆	101
* 石遂	91	仙人杖	97	白刺	102
石雲茶	92	仙人掌	97	* 白參	102
石髮	92	仙術	97	白昌	102
石解	92	仙遺糧	97	白粉	102
* 石蓴	92	仙靈脾	97	白果	102
石蓮花	93	* 冬瓜樹	97	白笏樹	102
石磋	93	冬生	97	白茅菅	102
石蕊花	93	冬年	98	白馬鞭	103
石龍	93	冬青	98	白草	103
* 石龍牙草	93	冬青	98	白草	103
石龍藤	93	冬青果	98	* 白草果	103
石檀	93	* 冬風	98	白莖	103
石膽草	93	冬風菜	98	白胡荽	103
* 石濡	93	冬寒菜	98	白柘	103
* 石韃	94	冬蔥	98	白根	103
石蘭	94	冬牆	98	白麵根	103
石鯪	94	生瓜	98	白前	103
布瓜	94	禾雀舌	98	白給	103
* 戊己芝	94	白醜	98	白旃檀	103
平仲	95	白木香	99	* 白桐	104
平波	95	白毛藤	99	白椴木	104

白茛..... 104
 白莫..... 104
 白蓮..... 104
 白椶..... 104
 白椶..... 104
 白梁..... 104
 白楸..... 104
 白菖..... 104
 白菘..... 104
 白麻..... 104
 白棠..... 105
 * 白萼..... 105
 白華..... 105
 白幕..... 105
 白幕..... 105
 白榆..... 105
 白蒺藜..... 105
 白蒿..... 105
 白蒿..... 105
 * 白蒿..... 106
 白鼓釘..... 106
 白微..... 106
 白蕤..... 106
 白膠香..... 106
 白藥..... 106
 白頭翁..... 106
 白澤..... 106
 白環藤..... 106
 白檀..... 106
 白蘋..... 106
 白蘇..... 107
 白羶..... 107
 白蘘荷..... 107
 白蘚..... 107
 白鶴仙..... 107
 白蘄..... 107
 * 瓜子金..... 107
 瓜子菜..... 107
 * 瓜香草..... 107
 * 瓜槌草..... 108

瓜樓..... 108
 瓜蔓..... 108
 包穀..... 108
 氏冬..... 108
 * 主田..... 108
 玄及..... 109
 玄臺..... 109
 玄胡索..... 109
 半支蓮..... 109
 半春子..... 109
 半邊蓮..... 109
 * 必栗香..... 109
 * 奴會..... 110
 皮弁草..... 110
 尼克特草..... 110
 母豬芥..... 110

六 畫

地丁..... 110
 * 地不榮..... 110
 地文..... 111
 地仙..... 111
 地瓜兒..... 111
 * 地瓜兒苗..... 111
 地羊鮮..... 111
 地羊羶..... 111
 地芝..... 111
 地血..... 111
 地血..... 111
 地衣..... 111
 地芙蓉..... 112
 地芙蓉..... 112
 地豆..... 112
 * 地茄..... 112
 * 地柏葉..... 112
 地胡椒..... 113
 地草果..... 113
 地骨..... 113
 地栗..... 113
 地連錢..... 113

地筍..... 113
 地筍子..... 113
 * 地朕..... 113
 地烏桃..... 113
 地菘..... 113
 地麥..... 113
 地麥草..... 113
 地參..... 114
 地棠草..... 114
 地椒..... 114
 地筋..... 114
 地筋..... 114
 地筋..... 114
 地筋..... 114
 地落艾..... 114
 地葵..... 114
 * 地葵..... 114
 地節..... 114
 地節..... 114
 地新..... 114
 * 地椹..... 114
 地槐..... 115
 * 地錦..... 115
 地輔..... 115
 地精..... 115
 地麩..... 116
 * 地樓..... 116
 地噤..... 116
 地噤..... 116
 * 地錢草..... 116
 * 地薰..... 117
 地藤草..... 117
 地蘘根..... 117
 地蘭..... 117
 地蠶..... 117
 地蠶子..... 117
 杓..... 117
 杓子..... 117
 * 杓子..... 117
 邪木..... 118
 * 邪蒿..... 118

芋渠..... 118	* 西番葵..... 120	回頭見子花..... 125
芋魁..... 118	西番蜀秫..... 121	回頭青..... 125
芋菜..... 118	百嫺..... 121	* 回鶻豆..... 125
芍..... 119	百合蒜..... 121	因預..... 125
芍..... 119	* 百兩金..... 121	* 肉果..... 125
芒芋..... 119	百枝..... 121	肉棗..... 126
芒種花..... 119	百條根..... 121	肉蓯..... 126
芒草..... 119	* 百倍..... 121	* 伏牛花..... 126
芒草..... 119	百般嬌..... 122	伏兔..... 126
芒草..... 119	百部草..... 122	伏豬..... 126
芝..... 119	* 百結..... 122	* 伏靈..... 126
茺蘭..... 119	百結花..... 122	竹帚..... 127
芎藭..... 119	百蜚..... 122	* 竹園荑..... 127
芑..... 119	百歲羹..... 122	竹節草..... 128
芫..... 119	百頭..... 122	竹節菜..... 128
吉貝..... 119	戎菽..... 122	竹葉草..... 128
老少年..... 119	戎菽..... 122	竹葉柴胡..... 128
老虎花..... 119	戎菽..... 123	* 竹葉菜..... 128
老虎刺尖..... 119	* 戎葵..... 123	竹頭草..... 128
老翁鬚..... 119	灰莧..... 123	竹鷄草..... 128
老鼠花..... 119	灰條..... 123	玃蒿..... 128
老鼠刺..... 119	灰條菜..... 123	合子..... 128
老鴉瓜..... 119	灰桑樹..... 123	合昏..... 128
老鴉舌..... 120	灰菜..... 123	合鉢兒..... 128
老薺..... 120	灰蓀菜..... 123	多南子..... 129
老鶴菜..... 120	灰滌銀粉菜..... 123	多香木..... 129
老鶴嘴..... 120	灰藿..... 123	* 多骨..... 129
老鶴瓢..... 120	* 灰藿..... 123	多摩羅拔香..... 129
耳癩草..... 120	托盤..... 124	朱竹..... 129
耳環草..... 120	吐血絲..... 124	朱果..... 129
耳璫草..... 120	赤..... 124	朱果..... 129
西土藍..... 120	同蒿..... 124	朱茱..... 129
西天王草..... 120	同蒿菜..... 124	朱槿..... 129
西王母杖..... 120	回子白菜..... 124	朱贏..... 129
西芎..... 120	* 回回豆..... 124	朱薯..... 129
西河柳..... 120	回回豆..... 124	朱蘭..... 129
西洋鞠..... 120	回回葱..... 125	朱櫻..... 129
西茵陳..... 120	回回蒜..... 125	朱樂..... 129
西國草..... 120	回芸..... 125	朱樂..... 130
西番菊..... 120	回陽草..... 125	自炙..... 130

自然穀……………	130	羊泉……………	135	七 畫	
血皮菜……………	130	* 羊韭……………	135		
血見愁……………	130	羊負來……………	135	形虞……………	139
血見愁……………	130	羊桃……………	135	坎菜……………	139
* 血見愁……………	130	羊桃……………	135	却老……………	139
血風草……………	130	羊婆孌……………	135	却暑……………	139
血參……………	130	羊婆孌……………	135	邯曙……………	139
* 血竭……………	130	羊椽……………	135	* 杜……………	139
血竭……………	131	羊眼半夏……………	135	杜……………	140
* 血藤……………	131	羊腸……………	135	杜牛膝……………	140
* 血櫛……………	131	羊飴……………	135	杜赤豆……………	140
江柳……………	132	羊蹄大黃……………	135	杜芫……………	140
江離……………	132	羊蹄草……………	135	杜姥草……………	140
冰粉樹……………	132	羊蓍……………	135	杜細辛……………	140
* 冰臺……………	132	羊躑……………	136	杜葵……………	140
交加枝……………	132	羊嫺科……………	136	杜蓮……………	140
交莖……………	132	羊嫺嫺草……………	136	杜蘇……………	140
交時……………	132	守田……………	136	杜衡……………	140
交麻……………	132	守田……………	136	杜衡葵……………	140
交藤……………	132	守宅……………	136	杜衡……………	140
交讓木……………	132	* 守宮槐……………	136	杜衡……………	141
充蔚……………	133	* 安石榴……………	136	杜蘭……………	141
羊不食草……………	133	安胡……………	137	杜蘭……………	141
羊矢棗……………	133	安樂菜……………	137	杉……………	141
羊矢橘……………	133	* 米布袋……………	137	杞……………	141
羊石子……………	133	* 米飯花……………	137	扶老杖……………	141
羊石子草……………	133	米鋪……………	138	* 扶移……………	141
羊耳朵……………	133	米穀花……………	138	* 扶桑……………	141
* 羊尿胞……………	133	米囊花……………	138	扶桑菊……………	142
羊肚菜……………	133	光明草……………	138	扶留……………	142
羊角……………	133	光風草……………	138	扶留藤……………	142
羊角……………	133	* 光頭稗子……………	138	扶櫓……………	142
羊角瓜……………	133	好女兒花……………	138	* 扯根菜……………	142
羊角苗……………	133	如意花……………	138	志取……………	142
* 羊角菜……………	133	那合豆……………	138	芙蓉……………	142
羊乳……………	134	那悉茗花……………	138	芙蕖……………	142
羊乳……………	134	防己……………	139	* 芫……………	142
羊刺……………	134	羽客……………	139	芫華……………	143
羊明……………	134	* 牟……………	139	芸香草……………	143
* 羊屎柴……………	134	牟麥……………	139	芸蒿……………	143

* 芰	143	李子樹	148	* 豆蔻	153
芰	144	赤瓜子	148	* 豆瓣鹿銜草	154
芰苡	144	* 赤朮	148	夾竹桃	154
* 芰苳	144	赤芫	149	豕首	154
芰菜	144	赤芹草	149	* 豕零	154
芰菜	144	赤杉	149	豕囊	154
芰苳	144	* 赤豆	149	吻莽	154
芰瓜	144	赤果	149	旱金蓮	155
芮草	144	赤根菜	149	旱珍珠	155
芙	144	赤孫施	149	旱荷	155
花上花	144	* 赤菜	149	旱蓮子	155
花上花	144	赤眼老母草	150	* 旱蓮草	155
花木香	144	赤參	150	吳菝葜	155
花奴	144	赤葛	150	吳葵	155
花芥	144	* 赤葛	150	呆	155
花梨木	144	赤棗	150	男續	155
花蓂蓉	144	赤棠	150	岑草	155
花薺	144	赤棠	151	岑莖	155
芹	145	赤楊	151	里木	155
芹菜	145	赤霞	151	* 見風消	155
芹菜	145	赤霞子	151	見腫消	156
* 芥	145	赤綱	151	貝父	156
芥圪答	145	赤槿	151	貝母	156
芥葯	145	赤槿	151	貝多	156
芥蕘	145	赤潑藤	151	牡茅	156
* 芥藍	145	赤樸	151	牡桂	156
* 芩	146	赤檉木	151	牡麻	156
芩母	146	赤斂	151	牡葍	156
芩	146	* 赤藤	151	邱葵	156
芩菁	146	赤藥	152	何樹	156
* 芳香	146	戒火	152	伯萍	156
芩光	147	孛孛丁菜	152	佛手	156
芩光	147	孛桃	152	佛手芥	157
* 芩明	147	車輪菜	152	佛手柑	157
芩芫	147	更生	152	佛手香櫞	157
芩苴	147	豆角	152	佛手根	157
* 芩	147	豆蔻	152	佛甲草	157
* 杏葉沙參	148	* 豆蔻	152	佛耳	157
杏葉草	148	豆蔻	153	佛耳草	157
杏參	148	* 豆蔻	153	佛豆	157

佛指甲..... 157
 * 佛指甲..... 157
 佛指甲..... 157
 佛桑..... 158
 伽子..... 158
 禿菜..... 158
 皂角..... 158
 卮子..... 158
 * 含桃..... 158
 * 希仙..... 158
 卵菱..... 159
 系系葉..... 159
 * 快果..... 159
 冷水丹..... 159
 冷金丹..... 159
 冶葛..... 159
 冷飯團..... 159
 沙木..... 159
 沙吉木兒..... 159
 沙米..... 159
 * 沙苑蒺藜..... 160
 沙果..... 160
 沙孤..... 160
 沙飛草..... 160
 沙蒺藜..... 160
 沙穀..... 160
 沙薑..... 160
 * 沉水香..... 160
 沉木香..... 161
 沈藩..... 161
 没石子..... 161
 没利..... 161
 没骨花..... 161
 没香..... 161
 没食子..... 161
 忘憂..... 161
 忘憂草..... 161
 辛夷..... 161
 辛枸..... 161
 辛菜..... 161

羌青..... 161
 羌活..... 161
 良棗..... 162
 良薑..... 162
 良薑..... 162
 返魂煙..... 162
 迎風子..... 162
 迎陽花..... 162
 壯陽草..... 162
 阿月渾..... 162
 阿列布..... 162
 阿迦噶香..... 162
 * 阿虞..... 162
 阿虞載..... 162
 阿駟..... 162
 阿嗟..... 163
 阿薩禪..... 163
 阿濕曷咄婆力
 又..... 163
 阿羅漢草..... 163
 附支..... 163
 附地菜..... 163
 妓女..... 163
 君子花..... 163
 忍冬..... 163
 忍冬草..... 163
 忍冬藤..... 163
 忍陵..... 163
 延年..... 163

八 畫

肝臟..... 163
 * 耶悉茗花..... 163
 杭..... 164
 * 林檎..... 164
 林蘭..... 164
 林蘭..... 164
 柜..... 164
 柜木..... 164
 柜柳..... 164

析目..... 164
 析萸..... 164
 枇木..... 165
 * 板藍..... 165
 粉..... 165
 粉榆..... 165
 松上寄生..... 165
 松心木..... 165
 * 松楊..... 165
 * 栝..... 166
 * 柎..... 166
 柎子..... 166
 杼..... 167
 刺三甲..... 167
 刺瓜..... 167
 刺花..... 167
 刺芥..... 167
 刺柏..... 167
 刺紅..... 167
 刺通..... 167
 * 刺菱..... 167
 刺菠..... 167
 刺梨子..... 167
 * 刺犁頭..... 167
 刺榆子..... 168
 * 刺楓..... 168
 刺蜜..... 168
 刺豬苓..... 168
 刺薊..... 168
 刺薊菜..... 168
 刺藤..... 168
 抹利..... 168
 抹厲..... 169
 抹麗..... 169
 拔..... 169
 拔火..... 169
 拒冬..... 169
 * 拒霜花..... 169
 拐棗..... 169
 拘那夷..... 169

* 拘那花..... 169
 拘拏兒..... 170
 抱牙..... 170
 抱孃蒿..... 170
 拂煙樹..... 170
 * 招豆藤..... 170
 青小豆..... 170
 青子..... 170
 * 青木香..... 170
 青木香..... 171
 青木香..... 171
 青白蘇..... 171
 青皮木..... 171
 青芥..... 171
 * 青刺尖..... 171
 青刺薊..... 172
 青刺薊..... 172
 * 青果..... 172
 青荖葉..... 172
 * 青菜..... 172
 * 青菀..... 173
 * 青萍..... 173
 青梧..... 173
 青斑豆..... 173
 青稍子..... 173
 青絲柳..... 174
 青蒿..... 174
 青楊..... 174
 青稞..... 174
 青梁..... 174
 * 青裳..... 174
 青橄欖..... 174
 青藍..... 174
 青黏..... 174
 * 青藤..... 174
 苦力蔥..... 175
 苦力強..... 175
 苦心..... 175
 苦心..... 175
 苦杞..... 175

苦地膽..... 175
 * 苦苣..... 175
 * 苦杖..... 176
 苦花..... 176
 * 苦豆..... 176
 苦苣..... 177
 苦低草..... 177
 苦板..... 177
 苦骨..... 177
 苦耽..... 177
 苦茶..... 177
 苦連婆..... 177
 苦堇..... 177
 苦菜..... 177
 苦菜..... 177
 * 苦菜..... 177
 苦萃..... 178
 苦梗..... 178
 苦葳..... 178
 * 苦棟..... 178
 苦櫟..... 178
 苦魯麻棗..... 178
 苦藜..... 178
 苦樹..... 178
 苦歷..... 178
 苦澤..... 179
 苦蕒..... 179
 苦櫪..... 179
 苦蕒..... 179
 苦蕒..... 179
 苦蕒..... 179
 苦蕒..... 179
 苦蕒..... 179
 * 若芝..... 179
 芨華..... 179
 芨木..... 179
 苴麻..... 179
 苴蓴..... 179
 苜蓿..... 179
 苜蓿菜..... 180
 英桃..... 180

英雄草..... 180
 茵..... 180
 英..... 180
 苻..... 180
 苻葵..... 180
 苻離..... 180
 * 苽..... 180
 苽蔣..... 180
 苽..... 180
 苽耳..... 180
 苽..... 181
 苞杞..... 181
 苞飯花..... 181
 苧..... 181
 苧..... 181
 苧饒..... 181
 * 茅瓜子..... 181
 茅瓜子..... 181
 茅蕒..... 181
 茅香..... 181
 茅蒐..... 182
 茅榿..... 182
 武威..... 182
 其積..... 182
 長生不死草..... 182
 長生草..... 182
 長生草..... 182
 * 長生菓..... 182
 長皂莢..... 182
 長命菜..... 182
 長春花..... 183
 長春花..... 183
 長春菊..... 183
 長瓠..... 183
 長壽仙人柳..... 183
 東方宿..... 183
 東瓜..... 183
 東根..... 183
 * 東廡..... 183

東牆……………	183	虎鬚……………	189	垂絲柳……………	193
兩頭黏……………	183	虎鬚……………	189	兒草……………	193
雨絲……………	184	* 虎鬚草……………	189	兒草……………	193
* 雨師……………	184	果瓜……………	189	兒草……………	193
來……………	184	果松……………	189	兒踵草……………	193
* 來……………	184	果宗……………	189	卑山共……………	193
來甘……………	184	果羸……………	190	卑共……………	193
來禽……………	185	固不婆律……………	190	卑相……………	193
奈花……………	185	知母……………	190	卑鉢羅……………	193
奈何草……………	185	知羞草……………	190	卑鹽……………	193
奄間……………	185	* 牧宿……………	190	金不換……………	193
* 盱……………	185	* 和血丹……………	190	金玉香草……………	193
味諫……………	185	和血丹……………	191	金瓜……………	193
明石……………	185	和事草……………	191	金竹花……………	193
明目果……………	185	和尚頭草……………	191	金豆……………	194
明粲……………	185	和姑……………	191	金果……………	194
昌……………	185	和圓子……………	191	* 金沸草……………	194
昌支……………	185	秬……………	191	金柑……………	194
* 昌陽……………	185	佳……………	191	金星草……………	194
昌歌……………	186	狎客……………	191	金莖……………	194
昆布……………	186	狐絲……………	191	金剛樹……………	194
* 昆布……………	186	狗牙半支……………	191	金陵草……………	194
* 昆明沙參……………	187	狗耳草……………	191	金頂龍芽……………	194
* 昆明烏木……………	187	狗舌花……………	191	* 金毬……………	194
忠果……………	188	* 狗卵草……………	191	金雀兒椒……………	195
虎子桐……………	188	狗尾半支……………	192	金釵花……………	195
虎目……………	188	狗蝨……………	192	金釵股……………	195
虎皮百合……………	188	狗兒秧……………	192	金魚草……………	195
虎豆……………	188	狗骨……………	192	金蛋……………	195
虎沙……………	188	狗骨……………	192	金寄奴……………	195
虎捲……………	188	狗屎花……………	192	金棗……………	195
* 虎棲菜……………	188	狗薺……………	192	金鈎木……………	195
虎眼樹……………	189	狗蠅梅……………	192	金絲草……………	195
虎麻……………	189	郟蟬草……………	192	金絲醺……………	195
虎葛……………	189	乳香草……………	192	金蓮子……………	195
虎薊……………	189	肥珠子……………	192	金蓮兒……………	195
虎蒲……………	189	委萎……………	192	金盞花……………	196
虎膏……………	189	* 笏莧菜……………	192	金盞兒花……………	196
虎蘭……………	189	季女……………	193	* 金盞草……………	196
虎鼻……………	189	垂水……………	193	金鳳花……………	196

金銀花..... 196
 * 金銀藤..... 196
 金綫吊芙蓉..... 197
 金綫吊蝦蟆..... 197
 金綫草..... 197
 金綫草..... 197
 金綫風..... 197
 * 金綫壺盧..... 197
 金蕊..... 197
 * 金蝴蝶..... 198
 金寶..... 198
 金彈..... 198
 金橘..... 198
 金錢花..... 198
 金錢花..... 198
 金錢菊..... 198
 金錢紫花葵..... 198
 金錢薄荷..... 198
 金燈花..... 198
 * 金燈花..... 198
 金鎖天..... 199
 * 金鎖匙..... 199
 金簪草..... 199
 * 金罌子..... 199
 金鷄樹..... 200
 金鷄獨立草..... 200
 金鹽..... 200
 * 周升麻..... 200
 周盈..... 200
 周麻..... 200
 * 兔核..... 200
 兔奚..... 201
 兔蘆..... 201
 放杖草..... 201
 * 淨土樹..... 201
 淨友..... 201
 淨街槌..... 202
 淨腸草..... 202
 怕羞草..... 202
 河柳..... 202

河柳..... 202
 河鳧茈..... 202
 油灼灼..... 202
 油灼灼..... 202
 油珠子..... 202
 * 油菜..... 202
 * 油麥..... 202
 油麻..... 203
 沿鈎子..... 203
 沿籬豆..... 203
 波律樹..... 203
 波斯草..... 203
 波斯棗..... 203
 波稜菜..... 203
 * 波羅奢..... 203
 * 波羅蜜..... 204
 泡桐..... 204
 治癩..... 204
 * 郎耶草..... 204
 郎榆..... 205
 京芎..... 205
 夜叉頭..... 205
 夜光..... 205
 夜合..... 205
 夜合花..... 205
 * 夜合花..... 205
 夜合花..... 205
 夜合樹..... 206
 夜呼..... 206
 夜牽牛..... 206
 夜落金錢..... 206
 底珍樹..... 206
 * 卷耳..... 206
 * 宜母..... 206
 宜男..... 207
 * 宜州薑黃..... 207
 宜濛..... 207
 * 官柳..... 207
 空草..... 208
 空腹妙..... 208

空腹蓮..... 208
 宛豆..... 208
 宛童..... 208
 述藥..... 208
 迦拘勒..... 208
 迦算香..... 208
 狀元紅..... 208
 * 降香..... 208
 降痰王..... 208
 姑孃菜..... 209
 * 姑榔木..... 209
 姑榆..... 209
 * 建人參..... 209
 建參..... 209
 居陵迦..... 210
 屈人..... 210
 屈馬第..... 210
 承夜..... 210
 承露..... 210
 孟..... 210

九 畫

* 珍珠花..... 210
 珍珠花..... 210
 珍珠花..... 210
 珍珠草..... 210
 * 珍珠梅..... 210
 * 珍珠蓮..... 211
 珊瑚花..... 211
 * 珊瑚菜..... 211
 珊瑚毯..... 212
 胡王使者..... 212
 胡王使者..... 212
 * 胡瓜..... 212
 * 胡芥..... 212
 胡豆..... 213
 * 胡豆..... 213
 胡枝子..... 213
 胡韭子..... 213
 * 胡荽..... 213

* 胡桐	214	枸木	220	茈菱	227
* 胡堇草	214	* 枸那	220	茈菀	227
胡萸	215	枸那異	221	茈蒨	227
胡菜	215	枸那衛	221	茈碧花	227
胡菜	215	枸忌	221	草木之王	227
* 胡麻	215	枸骨	221	草石蠶	227
胡藁	215	枸骨刺	221	* 草瓜茹	227
胡葵	215	枸棘	221	草血竭	227
* 胡蔥	215	* 枸櫞	221	草決明	227
胡椒菜	216	* 椈	221	草芙蓉	228
胡蒜	216	* 椈子	222	* 草豆蔻	228
胡蔓草	216	椈粘	222	草附子	228
胡榛子	216	柳穿魚	222	草金鈴	228
胡燕脂	216	柳葉蒿	222	草毒	228
胡盧巴	216	柱夫	223	草珊瑚	228
胡蕊	216	* 耐冬	223	草禹餘糧	228
胡翦	216	耐驚菜	223	草麥	228
* 胡蘆蕨	216	* 斫合子	223	草雲母	228
柑	216	拾櫨木	224	* 草蒿	229
柑子	217	* 指甲	224	草蒿	229
* 枯鹽萆	217	* 春草	224	草蜜	229
* 柘	217	* 春桂	225	草蓯蓉	229
* 柘	217	春蘭	225	草蔻	229
柘木	218	毒根	225	草鞋底	229
柘榆	218	毒魚	225	草鴟頭	229
柯欖	218	荆芥	225	草龍珠	229
* 柎	218	荆桃	225	草龍膽	229
柎木	218	荆葵	225	草鐘乳	229
枳	218	荳	225	草續斷	229
枳枸	218	茜	225	草鱉甲	229
枳柜	218	茜	225	草薑	230
* 柞	218	荊藪	226	茵蕒	230
柞械	219	萹	226	莒	230
柞樹	219	莖	226	茴草	230
柞櫟	219	莖藜	226	茴香	230
* 栢脈根	219	莖藜草	226	蒟草	230
* 栢寄生	219	茹草	226	茯菟	230
柧	220	* 茹蘆	226	茯苓	230
枸	220	* 茈草	226	荏	230
枸	220	茈胡	227	荏桐	230

荏菽……………	230	厚皮……………	234	香菜……………	238
荏……………	230	頁爆芽……………	234	香菜……………	238
荏絲菜……………	230	虺牀……………	234	香菜……………	238
荃……………	230	* 昧履支……………	234	* 香菅……………	238
苔……………	230	映山紅……………	234	香麻……………	239
茗……………	230	* 映日果……………	234	* 香麻……………	239
薜……………	230	* 昨葉何草……………	235	香絲菜……………	239
茭……………	230	毗尸沙……………	236	香蒿……………	239
茭耳菜……………	231	哈昔泥……………	236	* 香楓……………	239
茭草……………	231	* 貞木……………	236	香樹……………	240
茭白……………	231	貞蔚……………	236	香薷……………	240
茭筍……………	231	省頭草……………	236	香檬……………	240
茭瓜……………	231	思仙……………	236	香蘇……………	240
荒草……………	231	思仲……………	236	* 香櫟……………	240
荒蔚……………	231	思益……………	236	香櫟子……………	240
芋麻……………	231	思想草……………	237	* 香萊……………	240
苻……………	231	骨美……………	237	* 香萊……………	241
* 茨……………	231	韭逢……………	237	香樂……………	241
茨梨……………	231	柎……………	237	竿蔗……………	241
苙蘿……………	231	杭……………	237	* 怎地羅……………	241
* 苙……………	232	秋木瓜……………	237	食胡荽……………	241
* 苙麥……………	232	秋果……………	237	* 食茱萸……………	242
荔支……………	232	秋葵……………	237	盆桂……………	242
荔枝奴……………	232	秋蝴蝶……………	237	* 盆甌草……………	242
南天竺……………	233	秋蘭……………	237	冠脫……………	242
南天竺草……………	233	科藤……………	237	負擔……………	242
南天竺草……………	233	便牽牛……………	237	急改索……………	242
南天燭……………	233	修脆……………	237	急性子……………	243
南木香……………	233	侯莎……………	237	* 急解索……………	243
南芥……………	233	後卓……………	237	* 重皮……………	243
南豆……………	233	後庭花……………	237	* 重陽柳……………	243
南椒……………	233	胖柳……………	237	重臺……………	244
南椰……………	233	香水蘭……………	237	* 重臺……………	244
南薄荷……………	233	香花子……………	237	重澤……………	244
南燭草木……………	233	香茅……………	238	鬼目……………	244
* 南藤……………	233	香茅……………	238	鬼目……………	244
* 柰……………	233	香果……………	238	鬼目……………	245
柰子……………	234	香茸……………	238	鬼目……………	245
咸……………	234	香草……………	238	鬼目草……………	245
威蛇……………	234	香菱……………	238	鬼目菜……………	245

鬼白……………	245	洛神珠……………	249	* 紅百合……………	253
鬼芋……………	245	洛陽花……………	249	紅羊……………	253
* 鬼見愁……………	245	洋桃……………	249	紅花艾……………	253
鬼見愁……………	245	洋紫荆……………	249	紅花菜……………	254
鬼柳……………	245	神仙掌……………	249	* 紅花菜……………	254
鬼香油……………	245	神投時……………	249	紅花菜……………	254
鬼卿……………	245	神草……………	249	紅花樹……………	254
* 鬼針……………	245	神砂草……………	249	紅花紫荆……………	254
鬼扇……………	246	* 神箭……………	249	* 紅豆……………	254
鬼釵……………	246	神錦花……………	250	紅豆……………	254
鬼桃……………	247	亭歷……………	250	* 紅豆蔻花……………	254
* 鬼督郵……………	247	帝女花……………	250	紅茄……………	255
鬼箭……………	247	美李……………	250	紅姑孃……………	255
鬼箭羽……………	247	* 美草……………	250	* 紅荆樹……………	255
鬼頭……………	247	美草……………	250	紅紫荆……………	256
鬼燈籠……………	247	美草……………	250	紅草……………	256
鬼醜……………	247	美棗……………	250	* 紅梅消……………	256
鬼臉升麻……………	247	首烏……………	250	紅落葵……………	256
鬼藏……………	247	* 染山紅……………	250	紅棉……………	256
鬼藥……………	247	染指甲草……………	251	紅椿……………	256
禹韭……………	247	染菽……………	251	紅瑣梅……………	256
禹孫……………	247	染緋草……………	251	紅蔻……………	256
禹葭……………	247	* 羗桃……………	251	紅絲綫……………	256
禹餘糧……………	247	扁竹……………	251	紅蕉……………	256
禹餘糧……………	248	扁苻……………	251	紅檬……………	257
風車兒草……………	248	* 扁蒲……………	251	紅藍……………	257
風茄兒……………	248	逃軍糧……………	252	紅藍花……………	257
風流樹……………	248	* 送春歸……………	252	紅藍棗……………	257
風蓂……………	248	迷蕨……………	252	紅藤……………	257
施州龍牙草……………	248	退血草……………	252	紅藤菜……………	257
* 恒山……………	248	追風使……………	252	紅藥子……………	257
糶……………	248	除辛……………	252	紅蘭……………	257
糶秫……………	248	娃草……………	252	紅蘆菔……………	257
* 糶粟……………	248	姨媽菜……………	253	紅躑躅……………	257
洱海連翹……………	249	孩兒拳頭……………	253	胥邪……………	257
活菴……………	249	孩兒菊……………	253	胥耶……………	257
活鹿草……………	249	紅小豆……………	253	* 胥餘……………	257
洗鍋羅瓜……………	249	紅內消……………	253	拏子……………	258
洗瘴丹……………	249	紅心灰藿……………	253	* 飛天蜈蚣……………	258
涎衣草……………	249	紅百合……………	253	飛雉……………	258

* 飛輕..... 258
 飛穰..... 259
 泉麻..... 259
 羿先..... 259
 柔臺..... 259
 屋上無根草..... 259
 屋莢..... 259
 屏風..... 259
 屏風..... 259

十 畫

珠蘭..... 259
 * 都念子..... 259
 都淋藤..... 260
 都梁香..... 260
 都蔗..... 260
 桂..... 260
 * 桂..... 260
 桂圓..... 260
 * 栲..... 260
 桓..... 261
 * 栲栗..... 261
 榭..... 261
 桐..... 261
 桐麻..... 261
 * 栝..... 261
 枅栝..... 262
 格覽..... 262
 移..... 262
 移柳..... 262
 移楊..... 262
 移楊..... 262
 桃朱術..... 262
 桃柳藤..... 262
 核桃..... 262
 栢欄..... 262
 * 栢..... 262
 破地錐..... 263
 破血丹..... 263
 * 破故紙..... 263

破銅錢..... 263
 破網巾..... 263
 * 挾劍豆..... 263
 * 挈櫨..... 264
 秦..... 264
 秦州菴藺子..... 264
 秦椒..... 264
 秦鈎吻..... 264
 秦瓊劍..... 264
 素心蘭..... 264
 貢檀兜..... 264
 華..... 264
 華木..... 264
 蒼..... 265
 蒼公鬚..... 265
 * 苳蕘..... 265
 * 莽草..... 265
 莖..... 265
 莖..... 265
 莧陸..... 266
 * 苧..... 266
 苧麻..... 266
 * 莠..... 266
 莠草子..... 267
 * 莠..... 267
 莠蒿..... 267
 荷..... 267
 荷苴..... 267
 荷華..... 267
 莢子..... 267
 莢..... 267
 茶..... 267
 茶..... 267
 * 茶..... 267
 茶草..... 268
 菴..... 268
 菴梁..... 268
 菴蒿..... 268
 蔗苞..... 268
 惹..... 268

* 莎木..... 268
 * 莎草..... 268
 莎結..... 269
 莞..... 269
 * 莞草..... 269
 莞荳..... 269
 蒼..... 269
 蒼蓬菜..... 269
 菱..... 270
 * 柰..... 270
 索菜..... 270
 * 栗當..... 270
 夏生..... 271
 夏枯草..... 271
 夏菊..... 271
 夏橘..... 271
 烈樸..... 271
 起貧草..... 271
 * 起陽草..... 271
 鬥牛兒苗..... 271
 鬥雪紅..... 272
 時計果..... 272
 時美中..... 272
 蚍蜉..... 272
 蚍蜉酒草..... 272
 * 剛前..... 272
 畢豆..... 272
 畢楞伽..... 272
 員實..... 272
 崑崙..... 273
 馬刀豆..... 273
 馬王菜..... 273
 馬目毒公..... 273
 馬豆..... 273
 馬芥..... 273
 * 馬肝石..... 273
 馬辛..... 273
 馬尾藻..... 273
 馬尾..... 273
 馬尾..... 273

馬屁胞.....	273	倒陽菜.....	277	留夷.....	282
* 馬尿花.....	274	倒築傘.....	277	烏女.....	282
馬牀.....	274	倒燃子.....	277	烏文木.....	282
馬金南.....	274	倒黏子.....	277	烏禾.....	282
馬金南.....	274	* 條.....	277	* 烏芋.....	282
馬金囊.....	274	倭木.....	277	烏把.....	283
* 馬述.....	274	倭青草.....	277	烏吹.....	283
馬帚.....	274	脂麻.....	278	烏泡果.....	283
馬草.....	274	師姑草.....	278	烏草.....	283
馬韭.....	275	師草實.....	278	烏草.....	283
馬虬.....	275	殷櫟.....	278	烏韭.....	283
馬虬瓜.....	275	* 釘地黃.....	278	* 烏炭子.....	283
馬架百興.....	275	豺羽.....	278	* 烏扇.....	283
* 馬莧.....	275	豺節.....	278	烏菱.....	284
馬烏.....	275	* 豺漆.....	278	烏菜.....	284
馬銜芎藭.....	275	豹足.....	279	烏麥.....	284
馬薯.....	275	狸豆.....	279	烏階.....	284
馬蓼.....	275	狼子.....	279	烏槎樹.....	284
馬熏.....	275	狼牙.....	279	* 烏喙.....	284
馬駒.....	275	狼尾.....	279	烏飯草.....	284
馬齒草.....	275	狼茅子.....	279	* 烏犀.....	284
馬齒菜.....	275	狼茅子蒴草.....	279	烏蒲.....	285
馬齒龍芽.....	275	狼齒.....	279	烏蘆.....	285
馬蹄.....	276	筓芒.....	279	烏楠木.....	285
馬蹄決明.....	276	* 筓茅.....	279	烏嬰.....	285
馬蹄草.....	276	臭八寶.....	280	烏橄欖.....	285
馬蹄草.....	276	* 臭皮藤.....	280	烏賴樹.....	285
* 馬蹄香.....	276	臭牡丹.....	280	烏藤菜.....	285
馬螳草.....	276	* 臭草.....	280	烏蘆.....	285
馬薊.....	276	臭草.....	281	* 烏藥.....	285
馬藍.....	276	臭柚.....	281	烏覆子.....	286
馬蘭菊.....	276	臭莖子.....	281	烏蔽草.....	286
馬纓花.....	276	* 臭蒿.....	281	旅葵.....	286
缺盆草.....	276	臭楓根.....	281	* 旃檀.....	286
秫.....	276	臭豬巢.....	281	旃檀那.....	286
秬.....	277	臭橘.....	281	* 粉豆花.....	286
倚驕.....	277	臭橙.....	281	粉團花.....	287
倒垂蓮.....	277	臭穢.....	281	* 凍青.....	287
倒挂金鐘.....	277	* 臭蘇.....	281	凍菜.....	287
倒捻子.....	277	留豆.....	282	凍蔥.....	287

娑羅樹..... 287
 * 海仙..... 287
 海米..... 288
 海花菜..... 288
 * 海松..... 288
 海紅..... 288
 海珠蘂..... 288
 海珠叢..... 288
 海菜..... 288
 * 海菜..... 288
 海椒..... 289
 海棕..... 289
 海棕木..... 289
 海棠..... 289
 海棠子..... 289
 * 海棠梨..... 289
 海蔴..... 290
 海薑..... 290
 海薑菜..... 290
 海瘋藤..... 290
 海漆..... 290
 * 海錯..... 290
 海藻..... 291
 * 海藤..... 291
 * 海藻..... 291
 海臘..... 292
 海蘿..... 292
 浴香..... 292
 浮留..... 292
 浮留藤..... 292
 浮萍草..... 292
 浮萍..... 292
 浮椒..... 292
 流星草..... 292
 凋苾..... 292
 凋胡..... 292
 涼茶樹..... 292
 涼衍豆..... 292
 高良薑..... 292
 高飛..... 292

高飛..... 293
 * 亲..... 293
 * 旁其..... 293
 旁通..... 293
 畜菖子..... 293
 益母..... 293
 益明..... 294
 益明..... 294
 * 益智..... 294
 * 益智子..... 294
 害母草..... 294
 家芒..... 295
 家芝..... 295
 窠木..... 295
 冥菁..... 295
 唐..... 295
 唐婆鏡..... 295
 唐梨..... 295
 唐蒙..... 295
 唐藜..... 295
 羞天花..... 295
 羞天草..... 295
 羞寒花..... 295
 朗榆..... 295
 扇仙..... 295
 連及草..... 295
 連母..... 295
 連枝草..... 295
 連珠..... 295
 連錢草..... 295
 連蟲陸..... 295
 逐馬..... 295
 通草..... 295
 * 通草..... 296
 通草花..... 296
 通靈草..... 296
 * 陸英..... 296
 陵苕..... 296
 陵郎..... 297
 陵居腹..... 297

陵烏..... 297
 * 陵游..... 297
 陵霄..... 297
 陵澤..... 297
 陵藁..... 297
 陵藁..... 297
 陳知白..... 297
 陳刺波..... 297
 * 陰瓜..... 297
 陰成..... 298
 陰藁..... 298
 純陽瓜..... 298
 純盧..... 298
 紐絲藤..... 298
 眞珠花..... 298
 眞珠蘭..... 298
 眞檀..... 298
 桑上寄生..... 298
 * 桑椹樹..... 298
 桑椹..... 299

十一畫

乾棗..... 299
 * 乾薑..... 299
 乾歸..... 299
 乾鷄筋..... 299
 * 梗草..... 299
 梗榆..... 300
 梧..... 300
 梢瓜..... 300
 枙..... 300
 枙樹..... 300
 椶..... 300
 椶..... 300
 * 椶..... 300
 斬蛇劍..... 300
 軟柿..... 300
 * 軟棗..... 300
 軟棗..... 301
 軟腸..... 301

* 瓠	301	菘	307	萍	313
瓠瓜	301	菘	307	萍子草	313
瓠瓢	302	* 菘楚	307	* 菠薐	313
瓠臚	302	* 菘	307	* 菅根	313
匏	302	菲	308	葎草	314
匏瓜	302	* 菲	308	葎	314
掛金燈	302	味	308	菰	314
掛臂草	302	萌葛	308	菰菜	314
排風	302	菌子	308	菰蔣	314
排風草	302	茵草	308	菰蔣草	314
排風藤	302	蒿菜	308	* 菰苔	314
排菜	302	蒿笋	308	黃大戟	314
推藟	302	莛	308	黃斤	314
推藟	302	萎香	308	黃瓜	315
* 掐不齊	302	萎蔕	309	* 黃瓜菜	315
* 接余	303	萎蕤	309	* 黃皮子	315
* 接骨木	303	萹	309	黃芝	316
* 接骨草	304	萹	309	黃百合	316
* 接續草	304	* 草麻	309	黃色映山紅	316
掃帚	304	菜芝	309	黃米	316
掃帚菜	304	菜伯	309	黃米	316
救火	304	菟邱	309	黃芽菜	316
菁	305	* 菟奚	309	黃花母	316
菁苜香	305	* 菟葵	310	黃花地丁	316
* 菘菜	305	* 菟葵	310	黃花苗	316
菱角	305	菟槐	311	黃花郎	316
菘	305	菟藟	311	黃花菜	316
* 菘	305	菟縷	311	黃花劉寄奴	316
菘沒羅	305	* 菊花菜	311	黃花龍牙	316
菘沒羅	306	菊華	311	黃杜鵑	316
菘勒	306	菊婢	311	黃良	316
菘藟草	306	菩提子	311	黃狗頭	316
菘藟蒿	306	菩提婆力叉	311	黃昏木	316
菜	306	* 菩提樹	311	黃荊	316
菜菜	306	菩達	312	黃草	317
菜蕨	306	* 菩薩豆	312	* 黃耆	317
萋蒿	306	萋	312	黃桐	317
菘蔕	306	萋余	312	黃連祖	317
* 菘菘	306	* 菘	312	黃菅	317
* 菘藟	306			黃梅	317

- | | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| * 黃梅花…………… 317 | 麥英…………… 321 | * 野槐樹…………… 326 |
| 黃梔子…………… 318 | 麥夏枯…………… 321 | 野園荇…………… 327 |
| 黃野葛…………… 318 | 麥穎…………… 321 | 野蓼…………… 327 |
| 黃蛇豹花…………… 318 | 麥穗夏枯草…………… 321 | * 野繡毬…………… 327 |
| 黃麻…………… 318 | 盛湛…………… 321 | 野豌豆…………… 327 |
| 黃淡…………… 318 | 盛榘…………… 321 | 野蕻…………… 327 |
| 黃葛藤…………… 318 | 雪裏蕪…………… 321 | 野薤…………… 327 |
| * 黃蔴…………… 318 | 雪客…………… 321 | 野漆樹…………… 327 |
| 黃葵…………… 318 | 雪檀…………… 321 | 野縑絲…………… 327 |
| 黃參…………… 318 | 敗華…………… 321 | 野蔞頭…………… 327 |
| 黃結…………… 318 | * 野丈人…………… 321 | 野鷄冠…………… 327 |
| 黃棟樹…………… 318 | 野天麻…………… 321 | 野蠶豆…………… 327 |
| * 黃楊木…………… 318 | * 野天門冬…………… 321 | 略石…………… 327 |
| 黃農芥…………… 319 | 野木瓜…………… 322 | 蚵蚶草…………… 327 |
| 黃梁…………… 319 | * 野艾蒿…………… 322 | 蛇不過…………… 327 |
| 黃遠…………… 319 | 野芝麻…………… 322 | * 蛇全…………… 327 |
| 黃彈…………… 319 | 野同蒿…………… 323 | 蛇米…………… 328 |
| 黃薑…………… 319 | 野杉…………… 323 | 蛇草…………… 328 |
| 黃獨…………… 319 | 野茉莉…………… 323 | 蛇珠…………… 328 |
| 黃檀…………… 319 | 野苦菜…………… 323 | 蛇粟…………… 328 |
| 黃檀…………… 319 | * 野苜蓿…………… 323 | 蛇銜…………… 328 |
| 黃龍尾…………… 319 | 野苗…………… 323 | 蛇桌…………… 328 |
| * 黃蘗…………… 319 | 野茄…………… 323 | 雀舌…………… 328 |
| 黃藍…………… 320 | 野狐絲…………… 323 | 雀舌草…………… 328 |
| 黃藤…………… 320 | 野狐漿草…………… 323 | 雀林草…………… 328 |
| 黃藥…………… 320 | * 野胡椒…………… 323 | 雀兒草…………… 328 |
| 黃藥子…………… 320 | 野茴香…………… 324 | 雀兒卧單…………… 328 |
| 黃藥子…………… 320 | 野韭…………… 324 | 雀兒酸…………… 328 |
| 黃蘆木…………… 320 | 野紅花…………… 324 | 雀腦芎…………… 328 |
| 黃糯…………… 320 | * 野莧…………… 324 | 雀頭香…………… 329 |
| 黃躑躅…………… 320 | 野莧菜…………… 324 | 雀瓢…………… 329 |
| 黃蘿蔔…………… 320 | * 野菘豆…………… 324 | 雀瓢…………… 329 |
| 黃鬱…………… 320 | 野甜瓜…………… 325 | 常山…………… 329 |
| 堇草…………… 320 | 野梨…………… 325 | 常春藤…………… 329 |
| 堇堇菜…………… 320 | 野悉蜜花…………… 325 | 常春藤…………… 329 |
| 堇葵…………… 320 | * 野葛…………… 325 | 常思菜…………… 329 |
| 婪尾春…………… 320 | * 野葡萄…………… 325 | 常泉…………… 329 |
| 麥瓜…………… 320 | 野蔥…………… 326 | 常蓼…………… 329 |
| 麥句薑…………… 320 | 野萱花…………… 326 | * 曼陀羅…………… 329 |
| 麥句薑…………… 320 | 野槐…………… 326 | 異翹…………… 330 |

崖木瓜.....	330	旋芥.....	336	鹿豆.....	339
* 崖石榴.....	330	旌節花.....	336	鹿角.....	340
崖蜜.....	330	惟那木.....	336	鹿角菜.....	340
崑崙草.....	330	淹藺.....	336	鹿韭.....	340
崑崙瓜.....	330	淮豆.....	336	鹿胎.....	340
* 國老.....	330	淡竹葉.....	336	鹿活草.....	340
國豆.....	331	* 淡把姑.....	336	鹿首.....	340
甜草.....	331	章柳.....	337	鹿腸.....	340
甜菜.....	331	章陸.....	337	* 鹿腸.....	340
* 甜梅.....	331	望冬紅.....	337	鹿蔥.....	340
甜棒槌.....	331	渠芋.....	337	鹿蔥.....	340
甜蕎.....	331	剪刀草.....	337	鹿蔥.....	341
側耳根.....	331	剪絨花.....	337	* 鹿銜草.....	341
側金箋.....	331	剪金花.....	337	鹿劍.....	341
假水菜.....	331	剪春羅.....	337	鹿藿.....	341
* 假蘇.....	331	剪紅羅.....	337	鹿藿.....	341
* 徘徊花.....	332	婆那娑.....	337	牽牛子.....	341
獐.....	332	婆固脂.....	337	* 牽巴巴.....	341
舶茴香.....	332	婆婆丁.....	337	過山龍.....	342
脚斯蹬.....	332	婆婆針扎兒.....	337	過山龍.....	342
豚榆.....	332	婆婆針袋兒.....	337	過江龍.....	342
豚榆系.....	332	婆婆針綫包.....	337	過路黃.....	342
梨棗樹.....	332	婆婆酸.....	337	進賢菜.....	342
梨頭草.....	333	婆婦草.....	337	* 將軍.....	342
筴竹花.....	333	* 婆絨花.....	338	將軍樹.....	342
符蘆.....	333	婆羅門參.....	338	* 將離.....	342
貨母.....	333	盜庚.....	338	階前草.....	343
* 兜婁婆香.....	333	寄生草.....	338	階前菊.....	343
* 魚子蘭.....	333	* 寄屑.....	338	* 張天剛.....	343
魚尾草.....	334	宿田翁.....	339	* 陽春子.....	343
* 魚腥草.....	334	宿菜.....	339	* 陽春砂仁.....	344
魚鱧.....	334	麻柳.....	339	陽草.....	344
* 象豆.....	334	麻茶澤.....	339	陽桃.....	344
* 象貝.....	334	麻纒.....	339	* 陽藿.....	344
象貝母.....	335	* 庵摩勒.....	339	組.....	345
象柴.....	335	庵摩落迦.....	339	細子.....	345
* 象穀.....	335	庵藺.....	339	細草.....	345
象膽.....	335	庵蘆.....	339	* 細草.....	345
訥會.....	336	鹿耳蔥.....	339	* 紆.....	345
* 旋菡.....	336	鹿列.....	339	貫渠.....	346

落草.....	357	越王頭.....	361	紫檀.....	366
落首.....	357	* 越瓜.....	361	紫藤.....	366
落藜.....	357	* 越桃.....	361	紫藤香.....	366
落帚.....	357	* 雁來紅.....	362	* 紫檳榔.....	366
* 落蘇.....	357	雁來黃.....	362	棠毬.....	366
蒴.....	358	雁喙.....	362	棠毬.....	366
萱.....	358	雁頭.....	362	棠棣子.....	366
萱花.....	358	雁膳.....	362	棠梨.....	367
葵.....	358	貼梗海棠.....	362	* 景天.....	367
葵子.....	358	蛤蟆衣.....	362	買笑.....	367
葷菜.....	358	蛤蟆藍.....	362	黑三稜.....	367
葷.....	358	蛤蟆草.....	362	黑心薑.....	367
葷華.....	358	嘔尸羅.....	363	黑醜.....	367
葷萌.....	358	* 喝呼草.....	363	黑狗脊.....	367
葷.....	358	喝起草.....	363	黑牽夷.....	367
葷子草.....	358	紫丹.....	363	黑參.....	367
蒨.....	358	紫荊.....	363	稍瓜.....	367
蒨.....	358	紫芙.....	363	* 稌.....	367
蒨草.....	358	紫花地丁.....	363	* 稊.....	367
藁耳.....	358	紫花桐.....	363	* 稷.....	368
葵.....	358	紫花菘.....	363	傅公.....	368
葵花白菜.....	359	紫芹.....	363	傅延年.....	368
葵菜.....	359	紫芥.....	363	御弋.....	368
葳草.....	359	紫金牛.....	363	御米花.....	368
棗棘.....	359	紫金鎖.....	364	御菜.....	368
棗樹.....	359	紫京.....	364	御麥.....	368
惡菜.....	359	* 紫背草.....	364	復實.....	368
* 惡實.....	359	* 紫背浮萍.....	364	須.....	368
雲丹.....	359	紫背魚腥草.....	364	須.....	368
雲芝茶.....	359	紫背龍牙.....	365	須從.....	368
雲花.....	359	* 紫菜.....	365	鉅勝.....	369
雲英.....	360	紫浮萍.....	365	鈎.....	369
雲英.....	360	紫菘.....	365	鈎挽.....	369
雲茶.....	360	紫菊.....	365	飯包菠.....	369
* 雲南連翹.....	360	* 紫葳.....	365	飯豆.....	369
雲南稗.....	360	紫蒨.....	366	勝沉香.....	369
雲南根.....	360	紫莢.....	366	* 勝春.....	369
雲珠.....	360	紫蒴.....	366	勝烏.....	369
* 雲藕豆.....	360	紫繡毬.....	366	* 勝鐵力木.....	369
超凡子.....	361	紫藪.....	366	猢猻頭.....	370

獼猴頭草..... 370
 猴菽..... 370
 猴葵..... 370
 猴蒜..... 370
 * 猴檣..... 370
 猴藥..... 370
 猴騷子..... 370
 * 無心菜..... 371
 * 無名子..... 371
 無名木..... 371
 * 無食子..... 371
 無根金絲草..... 372
 無根草..... 372
 無患..... 372
 無葉..... 372
 * 無漏子..... 372
 犇馬草..... 372
 犁食..... 372
 * 犁頭草..... 372
 黍..... 373
 黍喇棘..... 373
 筒桂..... 373
 * 筋竹..... 373
 衆..... 374
 * 番山丹..... 374
 番白葉..... 374
 番瓜..... 374
 番瓜..... 374
 番豆..... 374
 番茄..... 374
 番降..... 374
 番南瓜..... 374
 番麥..... 374
 * 番椒..... 374
 番棗..... 375
 番蕉..... 375
 * 番藷..... 375
 舜芒穀..... 375
 舜英..... 375
 舜華..... 375

豎豆..... 376
 訶梨勒..... 376
 訶黎..... 376
 * 訶黎勒..... 376
 * 湖南連翹..... 376
 * 湖南稷子..... 377
 湖鷄腿..... 377
 渤海..... 377
 温州莪朮茂..... 377
 溫菘..... 377
 渴留..... 377
 滑菜..... 377
 滑腸菜..... 377
 游冬..... 378
 游胡..... 378
 游龍..... 378
 滋..... 378
 滋草..... 378
 渥丹花..... 378
 滁州夏枯草..... 378
 割田蔗..... 378
 補骨鷓..... 378
 童梁..... 378
 勞祖..... 378
 粢..... 378
 * 寒瓜..... 378
 寒豆..... 379
 寒莓..... 379
 寒菜..... 379
 寒漿..... 379
 寓木..... 379
 * 遏藍菜..... 379
 道人頭..... 379
 強瞿..... 379
 隔虎刺花..... 379
 隔河仙..... 379
 隔蔥..... 379
 結毬大白菜..... 379
 絨樹..... 380
 * 給勃羅..... 380

給客橙..... 380
 絳草..... 380
 絡石草..... 380
 * 絲茅..... 380
 絲草..... 381
 尋風藤..... 381
 登相..... 381
 登粟..... 381
 彘顛..... 381
 開口劍..... 381
 開屏鳳毛..... 381
 悶陀羅..... 381

十三畫

瑞蓮..... 381
 瑞聖奴..... 381
 塘葛菜..... 381
 勤母..... 381
 勤孃子..... 381
 幹蔗..... 381
 楔..... 381
 椿..... 381
 * 煤..... 381
 椹..... 382
 楠..... 382
 檳榔..... 382
 榎..... 382
 榎榆..... 382
 榎棗..... 382
 楷木..... 382
 楨..... 382
 楨木..... 382
 * 楊柳..... 382
 楊桐..... 383
 楊桃..... 383
 椴..... 383
 椴..... 383
 榿..... 383
 榿楠..... 383
 榆錢樹..... 383

* 搖車..... 383	* 蔥菜..... 390	蒲棒..... 396
梭..... 384	* 薜草..... 390	蒲楊..... 396
楓..... 384	菽蔞..... 390	蒲蘆..... 396
楓子樹..... 384	蒙山茶..... 390	蓀..... 396
楓木..... 384	蒙華..... 390	兼..... 396
楓香..... 384	蒙花..... 390	蒴藿..... 396
楓宸..... 384	蒙陰茶..... 391	蒴葫..... 396
* 楓柳..... 384	蒙頂茶..... 391	* 藿..... 396
楓柳..... 384	蓬朮..... 391	蕝香..... 396
楓樹上寄生..... 384	* 蓬莪..... 391	蒴頭..... 396
槎丫..... 384	蓬莪茂..... 391	菡藺..... 397
* 楸..... 384	蓬莪莖..... 391	務..... 397
* 降躩..... 385	蓬萊花..... 391	蓀..... 397
酪奴..... 385	* 蓬萊草..... 391	禁生..... 397
酪酥..... 385	* 蓬萊紫..... 392	款凍..... 397
碎米柴..... 385	蓬蒿..... 392	* 楚..... 397
* 碎剪羅..... 385	蓬蒿菜..... 392	楚子..... 397
聖僧..... 386	* 蓬藁..... 392	楚崧..... 397
菽..... 386	蓬藁..... 393	楚葵..... 397
蒜蔥..... 386	蒼藪..... 393	* 楚葵..... 397
* 蒜腦薯..... 386	蒿..... 393	楚蘅..... 398
蒜頭草..... 386	蒿菜..... 393	雷丸草..... 398
* 菁..... 386	* 菰..... 393	雷公頭..... 398
菁草..... 387	菰..... 393	* 零榆..... 398
蓮子草..... 387	菰子..... 393	雹莢..... 398
蓮草..... 387	菰青..... 393	虞刺..... 398
蓮華..... 387	* 菰莢..... 393	虞蓼..... 398
尊苴..... 387	* 菰醬..... 394	睡香..... 398
* 蔦..... 387	莠翁菜..... 394	* 睢..... 399
蔦麻..... 388	蓑..... 394	暗麝..... 399
蘆荑..... 388	蓄..... 394	* 蜈蚣萍..... 399
* 蓬..... 388	蕒..... 394	蛾眉豆..... 399
* 蓬殤..... 388	蒲公丁..... 394	骰栢楠..... 399
蒔蘿椒..... 389	* 蒲公英..... 394	當陸..... 400
* 葷撥..... 389	蒲柳..... 395	當道..... 400
葷拔梨..... 389	* 蒲桃..... 395	當藥..... 400
* 缺益..... 389	蒲移..... 395	* 署豫..... 400
蒨..... 389	蒲陶..... 396	* 蜀羊泉..... 400
蒨草..... 389	蒲黃..... 396	蜀芥..... 400
蒨藤..... 390	蒲萄..... 396	蜀柳..... 400

蜀秫..... 401
 蜀桑..... 401
 * 蜀堇..... 401
 蜀椒..... 401
 * 蜀棗..... 401
 * 蜀黍..... 402
 蜀漆..... 402
 園荑..... 402
 圓眼..... 402
 矮桃..... 402
 矮樟..... 402
 稜..... 402
 * 稗子..... 402
 微莖..... 403
 鉢怛羅香..... 403
 鈴兒草..... 403
 * 鉤..... 403
 鉤瓢..... 403
 飽飯花..... 403
 搏苴..... 403
 獅頭參..... 403
 鳩酸草..... 404
 鳩摩羅什樹..... 404
 解毒..... 404
 解毒..... 404
 解毒子..... 404
 解倉..... 404
 * 解離..... 404
 * 解蠶..... 404
 節花..... 405
 * 節華..... 405
 堯公英..... 405
 堯苾..... 405
 堯茨..... 405
 堯葵..... 405
 鼠矢..... 405
 鼠矢..... 405
 鼠耳..... 406
 * 鼠耳草..... 406
 鼠豆..... 406

鼠莽..... 406
 鼠梓..... 406
 鼠黏..... 406
 鼠莫..... 406
 鼠櫨..... 406
 * 會及..... 406
 愛老..... 407
 愛韭..... 407
 詹香..... 407
 新夷..... 407
 新羅松..... 407
 慎火..... 407
 慎火草..... 407
 粘..... 407
 滇白前..... 407
 溪客..... 407
 梗..... 407
 棄杖草..... 407
 * 慈謀勒..... 407
 塞鼻力迦..... 408
 窟莽..... 408
 * 廉薑..... 408
 遠客..... 408
 辟火..... 408
 辟芷..... 408
 預知子..... 408
 綏..... 408
 締絡草..... 408

十四畫

穀..... 408
 穀桑..... 409
 靜客..... 409
 堀芒..... 409
 榛..... 409
 榛子..... 409
 構..... 409
 楠木..... 409
 榼子..... 409
 榼藤..... 409

* 榎..... 409
 * 榷子草..... 409
 * 槐藍..... 410
 檄..... 410
 榭櫨..... 410
 糊榆..... 410
 * 酸母..... 410
 酸母草..... 411
 酸尖菜..... 411
 酸杖..... 411
 酸味草..... 411
 酸草..... 411
 酸迷迷草..... 411
 酸斑莧..... 411
 酸莧..... 411
 酸稗..... 411
 酸桶..... 411
 酸桶笋..... 411
 酸棗..... 411
 酸酸草..... 411
 酸箕..... 412
 * 酸餃..... 412
 酸餃草..... 412
 酸楮..... 412
 酸漿..... 412
 酸漿..... 412
 酸漿草..... 412
 豨苓..... 412
 豨首..... 412
 豨莶..... 412
 撇藍..... 412
 碧玉草..... 413
 碧竹子..... 413
 碧蟬花..... 413
 碧鳳花..... 413
 碧蟾蜍..... 413
 * 聚藻..... 413
 * 嘉草..... 413
 * 嘉慶子..... 414
 * 臺..... 414

臺芎..... 414
 壽庭木..... 414
 蓴..... 415
 瑣麻..... 415
 * 蕓..... 415
 蕓..... 415
 藍..... 415
 蔓華..... 415
 蔓菁..... 415
 * 蕓..... 415
 蔑荊..... 416
 * 藺..... 416
 菰藨..... 416
 蔦..... 416
 * 蔥苒..... 416
 蔥莢..... 417
 蔥葵..... 417
 * 葎菜..... 417
 * 葎菜..... 417
 葎..... 418
 * 蔴蕉..... 418
 蔴蓀..... 418
 蔴菜..... 418
 * 蔚..... 418
 蔣..... 419
 蔣草..... 419
 蔣荻..... 419
 蔘芽菜..... 419
 蔘合..... 419
 * 蔘萁..... 419
 蔘蒿..... 420
 * 蔘葵..... 420
 趙李..... 420
 鬍邊嬌..... 420
 駁節茶..... 420
 對叉草..... 420
 對節菜..... 420
 嗽藥..... 420

稷..... 420
 程..... 420
 * 稱星樹..... 420
 熏渠..... 421
 僕公英..... 421
 僕公罌..... 421
 僕壘..... 421
 * 銅芸..... 421
 鋌..... 421
 銚芎..... 421
 * 銀筍..... 421
 銀條菜..... 422
 * 銀條菜..... 422
 銀絲芥..... 422
 領石..... 422
 狸豆..... 422
 獾子薑..... 422
 獐耳細辛..... 422
 * 管仲..... 422
 鼻斫草..... 423
 鼻涕團..... 423
 魁實..... 423
 * 鳳尾草..... 423
 鳳尾草..... 424
 鳳尾草..... 424
 * 鳳尾菜..... 424
 鳳尾蕉..... 424
 * 鳳尾蕉..... 424
 鳳頸草..... 425
 鳳翼..... 425
 辣母藤..... 425
 辣米菜..... 425
 辣角..... 425
 辣茄..... 425
 辣菜..... 425
 辣蓼菜..... 425
 * 韶..... 425
 端..... 426
 * 端正木..... 426
 漢麻..... 426

漢椒..... 426
 * 滿天星..... 426
 滿天星..... 427
 滿冬..... 427
 * 滿條紅..... 427
 漆姑..... 427
 * 漆莖..... 427
 漂搖草..... 428
 滸臺..... 428
 滴滴金..... 428
 * 滴露..... 428
 漏蔻..... 428
 漏蔻..... 428
 漏蘆..... 428
 漏蘆..... 428
 鄭馨..... 428
 福桑..... 428
 膏涼薑..... 428
 齊廬..... 428
 齊頭蒿..... 428
 * 齊噉..... 429
 齊噉果..... 429
 齊噉樹..... 429
 熒..... 429
 榮目..... 429
 榮桐..... 429
 賓門..... 429
 賓門藥錢..... 429
 蜜父..... 429
 蜜甘..... 429
 蜜果..... 429
 蜜果..... 430
 蜜草..... 430
 蜜草..... 430
 * 蜜香..... 430
 蜜香..... 430
 蜜香..... 430
 蜜香樹..... 430
 蜜桶藤..... 430
 蜜脾..... 430

蜜蜂草..... 431
 蜜筍..... 431
 蜜羅柑..... 431
 蜜蘭..... 431
 實棗兒樹..... 431
 實撥梨力叉..... 431
 廣木香..... 431
 廣茂..... 431
 瘡帚..... 431
 瘦客..... 431
 瘙檀..... 431
 編苳..... 431
 * 隨軍茶..... 431
 隨風子..... 431
 綫菜..... 432
 綽菜..... 432
 綿瓜..... 432
 綿黃耆..... 432
 綸布及綸..... 432
 綠天..... 432
 綠白..... 432
 綠葉綠花草..... 432
 綠節..... 432
 墮胎花..... 432
 翠羽草..... 432
 翠娥眉..... 432
 翠蝴蝶..... 432
 屢析草..... 432

十五畫

* 赭魁..... 432
 * 楠..... 433
 檫樸..... 433
 * 檣..... 433
 * 樞..... 433
 樞木..... 434
 * 檀..... 434
 檀..... 434
 檀子..... 434
 樓臺草..... 434

榭子..... 434
 榭子木..... 435
 橡..... 435
 橡子樹..... 435
 橡櫟..... 435
 榭..... 435
 榭楸..... 435
 櫟木..... 435
 * 樣藜..... 435
 橄欖..... 435
 橄欖子..... 435
 橄欖子..... 435
 踴豆..... 435
 * 醋母草..... 435
 醋啾啾..... 436
 醋漿..... 436
 醉魚兒草..... 436
 醉草..... 436
 豬牙草..... 436
 豬矢草..... 436
 豬耳..... 436
 豬耳朵..... 436
 豬肝赤..... 436
 豬麻..... 436
 * 豬椿..... 436
 * 豬腰子..... 437
 豬鼻孔..... 437
 豬遼參..... 437
 撫芎..... 437
 播羅師..... 437
 鴉銜草..... 438
 熱草..... 438
 蕘..... 438
 菝葜..... 438
 蕙葵..... 438
 蕨菀..... 438
 蕨菀..... 438
 蕨縷..... 438
 * 蕤李子..... 438
 蕨薇菜根..... 438

蕨攔..... 438
 蕘..... 438
 蔞根..... 438
 * 蔞..... 438
 * 蕈..... 439
 蕈蒿..... 439
 蕪姑..... 439
 蕪萸..... 439
 蕪精..... 440
 蕪..... 440
 蕎..... 440
 蕉子..... 440
 葛..... 440
 萸..... 440
 覆..... 440
 蕪..... 440
 * 蕃柿..... 440
 蕃荷菜..... 440
 蔞子..... 440
 蕪英..... 440
 蕪弘..... 440
 蕪宏..... 440
 董..... 441
 董節..... 441
 蕪..... 441
 蕪..... 441
 蕪..... 441
 蕪..... 441
 蕪麻..... 441
 蕪縷..... 441
 * 蕪縷..... 441
 蕪鉅..... 441
 蕪菰..... 441
 蕪楓..... 441
 蕪鷄..... 441
 蕪梅..... 442
 賜紫櫻桃..... 442
 * 蕪菜..... 442
 * 蝴蝶花..... 442
 蝴蝶菊..... 443

薯..... 457	獲..... 462	龍珠..... 467
薯蕷..... 457	獨行根..... 462	龍華..... 467
薯藥..... 457	獨茅..... 462	龍芻..... 467
* 薇..... 457	獨茅根..... 462	龍船花..... 467
薇草..... 458	獨帚..... 462	龍蛋瓜..... 467
薇蕪..... 458	獨活..... 462	龍棗..... 467
臙苴..... 458	獨荷草..... 462	龍蜜瓜..... 467
亂..... 458	獨脚蓮..... 462	龍膽草..... 467
檠..... 458	獨滑..... 462	* 龍鬚..... 467
薜蔚..... 458	獨搖..... 462	* 龍鬚..... 468
薜造..... 458	獨搖..... 462	龍鬚草..... 468
蒼荀..... 458	獨搖草..... 463	龍鬚..... 468
簾..... 458	* 獨搖草..... 463	澤芬..... 469
簾..... 458	錢葵..... 463	澤芝..... 469
稜..... 458	錦西風..... 463	澤姑..... 469
資..... 458	錦帶..... 463	澤蓼..... 469
薄苛..... 458	錦被花..... 463	澤敗..... 469
蕩..... 458	錦被花..... 463	澤蒜..... 469
* 蕭..... 458	錦荔支..... 463	澤葛..... 469
薈田蔗..... 459	* 錦荔枝..... 463	澤蘭..... 469
薈秧泡..... 459	鋸子草..... 464	澤蘭..... 469
薩闍羅婆香..... 459	雕菰..... 464	* 澤蘭..... 469
蕨蕒..... 459	雕胡..... 464	澹竹葉..... 470
薜..... 459	筍..... 464	糖樹..... 470
棗吾..... 459	鴛鴦藤..... 464	糠..... 470
豎木..... 459	諫果..... 464	燈草..... 470
嚙婁..... 459	* 謖草..... 464	燈籠兒..... 470
鴨爪稗..... 459	龍木..... 464	燈籠草..... 470
鴨舌草..... 459	* 龍牙草..... 464	糜..... 470
* 鴨兒嘴..... 460	龍爪豆..... 465	* 壅菜..... 470
鴨屎草..... 460	* 龍爪豆..... 465	燙燙青..... 470
鴨脚..... 460	* 龍爪粟..... 465	* 營實..... 470
* 鴨脚子..... 460	龍爪稷..... 466	* 還魂草..... 471
鴨掌稗..... 460	龍目..... 466	還魂草..... 471
鴉蘿..... 460	* 龍舌..... 466	壁蝨胡麻..... 471
* 盧都子..... 461	* 龍舌草..... 466	彊忍..... 471
盧鬼木..... 461	* 龍沙..... 466	彊靱..... 471
盧會..... 461	龍尾..... 467	縉雲草..... 471
* 盧橘..... 461	龍抱柱..... 467	縑絲草..... 471
* 檫..... 461	龍修..... 467	

十七畫

檉	471	薰桑	476	豈豆	480
檉河柳	471	薰芟	476	甕菜	480
檉	472	薺根	476	糜	480
檬子樹	472	薺菜	477	療愁	481
檜	472	蒟	477	療愁花	481
* 檉	472	藏棗	477	賽牡丹	481
檉	472	藻	477	賽牡丹	481
* 檉	472	蕒草	477	牆麻	481
聯步	473	蕒	477	牆薇	481
聯珠果	473	蕒梁	477	牆靡	481
躡豆	473	擊迷	477	槩木	481
鞠華	473	* 擊迷	477	* 縮砂	481
舜	473	* 翳子草	477	縮砂密	481
礁筆	473	翳木	478	嫻汁草	481
槃菜	473	戴星草	478	嫻花草	481
* 藉姑	473	戴椹	478	嫻草	482
臺	473	* 螺犀草	478	嫻孩兒	482
臺芥	473	購	478		
臺菜	473	顆凍	478		
臺菜	473	顆凍	478		
蕒	474	點椒	478		
* 藍	474	闌天竹	478		
藍	474	優曇鉢	478		
藍(子)	474	鮮支	479		
藍天竺	474	鮫淚	479		
* 藍田竹	474	黏刺	479		
藍狗屎花	475	黏糊菜	479		
藍姑草	475	繁露	479		
* 藍菜	475	爵耳	479		
* 藍實	475	* 爵麻	479		
葵姑	476	爵麥	479		
葵姑	476	* 爵犀	479		
藺蒿	476	鐵	480		
藺	476	鴻蒼	480		
藺	476	鴻藏	480		
藺苻	476	鴻頭	480		
藺蘭	476	* 鴻藹	480		
* 藺豆	476	濕臺	480		
		濮瓜	480		
		齋	480		

十八畫

榼	482
* 櫚木	482
棉	482
轉心蓮	482
覲	482
藕	482
藕蔬菜	482
蕒	482
藹	482
藹子	482
貌	483
藤天蓼	483
藤花菜	483
藤兒菜	483
藤菜	483
藤梨	483
藤葵	483
藤蘿	483
薊	483
藟蔗	483
藟蕒	483

藟薯..... 483
 藟..... 483
 藟..... 483
 藟子..... 483
 藟..... 483
 藟菜..... 483
 藩籬草..... 483
 藟..... 483
 藟..... 483
 藟實..... 483
 藟藻..... 484
 藟..... 484
 * 藟..... 484
 藟草..... 484
 翹搖..... 484
 翹搖車..... 484
 翹翹花..... 484
 蠶螟菊..... 484
 覆盆..... 484
 覆盆子..... 484
 覆菹..... 485
 * 覆間..... 485
 醫草..... 485
 駝..... 485
 蟾兒草..... 485
 豐本..... 485
 豐蘆..... 485
 叢菁..... 485
 瞿陵..... 485
 * 嬰子桐..... 485
 蟲蟬..... 486
 鵠穀..... 486
 鵠瀉..... 486
 馥草..... 486
 馥香..... 486
 鵠不食..... 486
 鵠不食草..... 486
 鵠兒腸..... 486
 鵠腸菜..... 486
 鎮頭迦..... 486

翻魂草..... 486
 雙珠草..... 486
 獵沙..... 486
 謹火..... 486
 離支..... 486
 * 離枝..... 486
 離草..... 487
 * 離南..... 487
 離孃草..... 487
 * 灤..... 487
 檀菜..... 488
 * 綵麻..... 488
 綵..... 488
 邊箕萍..... 488
 斷腸花..... 488
 斷腸草..... 488
 斷腸草..... 488
 醬黃木..... 488
 醬瓣草..... 488

十九畫

瓊田草..... 489
 瓊枝..... 489
 櫟..... 489
 櫟樞子..... 489
 櫟..... 489
 櫟楫..... 489
 * 鵠不踏..... 489
 鵠豆..... 489
 * 鴉白..... 489
 * 鴉麻..... 490
 顛茄..... 490
 顛勒..... 490
 麩..... 490
 醮..... 490
 醮石..... 490
 醮醮流..... 490
 蔣田蔗..... 490
 蔣..... 490
 蔣蒿..... 490

藟蕭..... 490
 藟..... 491
 * 藟香..... 491
 藟..... 491
 藟..... 491
 藟菓..... 491
 藟婆..... 491
 藟婆果..... 491
 * 蘧麥..... 491
 蘧蔬..... 492
 蘧..... 492
 * 蘧..... 492
 蘧子..... 492
 蘧巴..... 492
 蘧芒..... 492
 蘧葩..... 492
 蘧蕈..... 492
 蘧粟..... 492
 蘧蔥..... 492
 蘧稜..... 493
 蘧草..... 493
 蘧菜..... 493
 蘧薇香..... 493
 蘧..... 493
 蘧..... 493
 蘧胡..... 493
 * 蘧..... 493
 * 蘧方木..... 493
 蘧枋..... 494
 蘧..... 494
 蘧草..... 494
 蘧菰蕈..... 494
 蘧蒿..... 494
 蘧古..... 494
 蘧草..... 494
 蘧葛..... 494
 * 蘧..... 494
 蘧..... 495
 蘧草..... 495
 * 蘧..... 495

攀枝花..... 495
 * 麗春..... 495
 麗草..... 496
 * 蹲鴟..... 496
 蠍虎草..... 496
 蟾蜍蘭..... 496
 蟻垤..... 496
 蟻尊..... 496
 梟..... 496
 羅服..... 496
 羅浮..... 496
 羅鬼菜..... 496
 羅蔔..... 496
 * 穉麥..... 496
 雛..... 497
 雛..... 497
 鏡面草..... 497
 臘菜..... 497
 臘梅..... 497
 簪..... 497
 簸箕柳..... 497
 蟹殼草..... 497
 識美..... 497
 * 麒麟菜..... 497
 懶人菜..... 498
 懶婦箴..... 498
 懷..... 498
 懷..... 498
 懷風..... 498
 蔞麻..... 498
 * 癢見消..... 499
 癩穀茴香..... 499
 繩毒..... 499
 繡木團..... 499
 * 繡毬..... 499

二十畫

櫛花..... 499
 櫪..... 499
 * 櫟..... 499

櫟..... 500
 櫟木..... 500
 * 櫟柳..... 500
 櫟樹..... 500
 * 櫟..... 500
 櫟..... 501
 櫟..... 501
 * 櫟..... 501
 麵木..... 501
 * 麵櫛..... 501
 * 飄拂草..... 502
 飄羹樹..... 502
 * 蓋草..... 502
 夔舌..... 503
 繁..... 503
 繁..... 503
 * 蕭..... 503
 蕤草..... 503
 蘭..... 503
 蘭草..... 503
 蘭草..... 503
 蘭香..... 504
 蘭香草..... 504
 蘭華..... 504
 蘭澤..... 504
 蘭澤草..... 504
 蔞藤..... 504
 擊..... 504
 * 蠟菜..... 504
 鶻孫頭草..... 504
 嬰子粟..... 504
 懸刀..... 504
 懸石..... 504
 懸瓜..... 504
 懸莞..... 504
 懸菟..... 504
 獼猴桃..... 505
 獼猴梨..... 505
 臙脂子..... 505
 臙脂豆..... 505

臙脂花..... 505
 臙脂菜..... 505
 鰓草..... 505
 護火..... 505
 * 護生草..... 505
 護花草..... 505
 護羌使者..... 505
 糯..... 505
 糯秫..... 505
 糯粟..... 506
 寶鼎香..... 506
 寶劍草..... 506
 蓼..... 506

二十一畫

櫟..... 506
 * 櫟木..... 506
 * 鷓..... 506
 藏..... 507
 藏草..... 507
 蔓..... 507
 蕪..... 507
 霸王..... 507
 露仁麥..... 507
 露甲..... 507
 露葵..... 507
 * 露葵..... 507
 播..... 507
 蠟樹..... 507
 蠟櫻..... 508
 髮華..... 508
 曩伽結..... 508
 鐵木..... 508
 鐵色草..... 508
 * 鐵色箭..... 508
 鐵胡蜂..... 508
 鐵指甲..... 508
 鐵連草..... 508
 鐵馬豆..... 508
 * 鐵掃帚..... 508

鐵脚梨..... 509
 鐵塔草..... 509
 鐵綫夏枯草..... 509
 * 鐵樹..... 509
 鐵燈心..... 509
 鐵籬笆..... 509
 * 鐵籬笆..... 509
 鐺柚..... 510
 * 鷄山香..... 510
 鷄木兒..... 510
 鷄毛菜..... 510
 鷄爪菜..... 510
 鷄爪粟..... 510
 * 鷄公柴..... 510
 鷄心菜..... 511
 * 鷄矢果..... 511
 鷄舌草..... 511
 鷄舌香..... 511
 * 鷄血藤..... 511
 鷄足..... 512
 * 鷄兒腸..... 512
 鷄骨升麻..... 512
 鷄骨香..... 512
 鷄骨常山..... 512
 鷄冠莧..... 513
 鷄屎草..... 513
 鷄棲子..... 513
 鷄茵..... 513
 * 鷄甜菜..... 513
 鷄脚芥..... 513
 * 鷄脚刺..... 513
 鷄脚菜..... 514
 鷄項草..... 514
 鷄墩..... 514
 鷄距子..... 514
 鷄距草..... 514
 鷄痾黏..... 514
 鷄腸..... 514
 鷄腸..... 514
 鷄腸草..... 514

* 鷄腿兒..... 514
 鷄腿根..... 514
 * 鷄腿蘑菰..... 515
 * 鷄齊..... 515
 鷄雍..... 515
 鷄墩菜..... 515
 * 鷄墩草..... 515
 * 鷄頭..... 516
 鷄頭盤..... 516
 鷄頭實..... 516
 鷄膝風..... 516
 鷄膠莽..... 516
 鷄膠菜..... 516
 懼內草..... 516
 爛腸草..... 517
 鶴頂草..... 517
 鶴翎草..... 517
 鶴蝨..... 517
 癩葡萄..... 517
 續骨木..... 517
 續根草..... 517

二十二畫以上

觀音芋..... 517
 * 觀音豆..... 517
 觀音柳..... 517
 觀音蓮..... 517
 攝..... 517
 攝..... 517
 樨子..... 517
 藹..... 518
 藹..... 518
 藹蕪..... 518
 蘿..... 518
 蘿昞昞..... 518
 蘿蒿..... 518
 藾..... 518
 藾火冬..... 518
 藾冬..... 518
 驚羊花..... 518

* 穰香..... 518
 穰香..... 518
 穰..... 519
 穰..... 519
 藤蕪..... 519
 蕪..... 519
 蠹心寶..... 519
 囊子..... 519
 * 靈芝草..... 519
 靈通..... 519
 靈眼..... 519
 靈楓..... 519
 靈壽木..... 520
 * 鹽蓬..... 520
 鹽麸子..... 520
 鹽麸樹..... 520
 鹽霜柏..... 520
 曆子菜..... 520
 驪珠..... 520
 驢織子..... 520
 驕槐..... 520
 籛..... 520
 籛菜..... 520
 鸚鵡菜..... 520
 鯤母..... 520
 * 甌母..... 521
 * 髮菜..... 521
 * 鬣葵..... 521
 鑿子木..... 522
 鑿頭木..... 522
 鷲鷲花..... 522
 鷲鷲藤..... 522
 疊羅金..... 522
 巖桂..... 522
 穉麥..... 522
 鑽凍..... 522
 籠鼓..... 522
 鬱金..... 522
 鬱臭草..... 522
 鬱臭苗..... 522

讓木..... 523
 * 鷓鴣菜..... 523
 蠲忿..... 523
 樂華..... 523

* 蠻瓜..... 523
 * 蠻薑..... 524
 蠻植..... 524
 蠻夷..... 524

彎葉樹..... 524
 縻..... 524
 鷹爪稗..... 524

一畫

【一丈紅】蜀葵(錦葵科) *Althaea rosea* (L.) Cavan. 《廣群芳譜》卷四六：“蜀葵一名戎葵，一名吳葵，一名一丈紅。”詳見戎葵條。

【一帆青】蜘蛛抱蛋(百合科) *Aspidistra elatior* Bl. 名見《質問本草》。詳見飛天蜈蚣條。

【一朵芙蓉花】錦地羅(茅膏菜科) *Drosera burmanni* Vahl 名見《生草藥性備要》。詳見怎地羅條。

【一把抓】倒提壺(紫草科) *Cynoglossum amabile* Stapf et Drumm. 名見《滇南本草》。一把抓，是因其果實成熟後，其錨狀刺易鈎入毛絨或衣服中而附着不易脫落。詳見牛舌頭花條。

【一枝香】毛大丁草(菊科) *Gerbera piloselloides* (L.) Cass. 毛大丁草又稱小一枝箭、白頭翁。《植物名實圖考》卷九一枝香：“一枝香生廣信。鋪地生葉，如桂葉而柔厚，面光綠，背淡有白毛。”毛大丁草學名中的 *Gerbera* 來自人名 T. Gerber (德)；*piloselloides* 意指像 *Pi-*




一枝香(毛大丁草)

losella 的 (*Pilosella* 為菊科中的一屬)。毛大丁草是多年生草本。根狀莖肥厚，密生白色綿毛；葉基生，多少具柄，矩圓形或倒卵形，長 5~10 厘米，寬 2.5~4.5 厘米，先端圓，基部楔形，全緣，幼時上面具柔毛，而老時常變禿淨，下面密生灰白色綿毛；花莖單生，長 15~40 厘米，頭狀花序頂生，直徑約 3.5 厘米，總苞片 2 層，花雜性，舌狀花白色，雌性，筒狀花兩性，雄蕊 5，藥合生；瘦果條狀披針形，具縱肋。生於向陽地、山坡、路邊、田邊。分佈於江蘇、浙江、四川、廣西、廣東等地。根或全草供藥用。

【一綫香】綬草(蘭科) *Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames 一綫香名見《質問本草》。詳見鷓鴣條。

【一瓣蓮】海芋(天南星科) *Alocasia macrorrhiza* (L.) Schott 海芋又稱隔河仙、觀音蓮、羞天草、天荷、旱金蓮、觀音芋等。《花鏡》卷六：“一瓣蓮，一名旱金蓮，又名觀音芋。葉大如芋。秋間開白花，只一大瓣，狀如蓮花；其大瓣中花小，遠視之，頗類佛像，故有觀音之稱。”海芋



一瓣蓮(海芋)

學名中的 *Alocasia* 意為海芋屬；*macrorrhiza* 意指大根的或根狀莖的。海芋是多年生常綠草本。具匍匐根莖；地上莖直立粗壯，莖高程度差別較大，有不到 10 厘米的，也有高達 3~5 米的，粗 10~

30 厘米，基部長出不定芽條；葉聚生莖頂，卵狀戟形，長 15~90 厘米；總花梗長 10~30 厘米，佛焰苞全長 10~20 厘米，肉穗花序稍短於佛焰苞；漿果紅色，卵狀，長 8~10 毫米，粗 5~8 毫米；種子 1~2 顆。產於我國南部及印度和菲律賓。生山谷、水溝邊或村莊附近。根莖藥用，對腹痛、疝氣、霍亂等有良效。

二 畫

【二至花】海濱柳穿魚(玄參科) *Linaria japonica* Miq. 海濱柳穿魚又稱柳穿魚、金魚草、如意花等。《花鏡》卷五柳穿魚：“柳穿魚，一名二至花。葩甚細而色微紺，謂之柳穿魚者，以其枝柔葉細似柳，而花似魚也。其花發於夏至，斂於冬至，故名二至花，又名如意花。”海濱柳穿魚學名中的 *Linaria* 來自希臘語的 *linon* (亞麻的名字)；*japonica* 意為日本的。海濱柳穿魚為多年生草本，莖上昇，高可達 15~40 厘米。葉對生或輪生，葉卵形、倒卵形，無柄，葉頂端近於急尖；頂生總狀花序，苞片與葉同形，花冠黃色透亮，蒴果球狀，種子腎形；花期 8 月份。喜生於海邊沙地。主要分佈於朝鮮、日本及俄羅斯遠東地區。我國遼寧省有此類植物。



二至花(海濱柳穿魚)

【十大功勞】枸骨(冬青科) *Ilex cornuta* Lindl. 名見《本經逢原》，並曰：“味苦甘平，有補中安五臟，養精神，除百病之功。皆指枸骨而言。”詳見貓兒刺條。

【十樣錦】莧(莧科) *Amaranthus tricolor* L. 《花鏡》卷六十樣錦：“十樣錦一名錦西風。葉似莧而大，枝頭亂葉叢生，有紅紫黃綠相兼；因其雜色出，故名十樣錦。”詳見雁來紅條。

【丁子香】紫丁香(木犀科) *Syringa oblata* Lindl. 《廣群芳譜》卷一〇〇丁香：“《夢溪筆談》……按《齊民要術》云，鷄舌香世以其似丁子，故一名丁子香，即今丁香是也。”詳見百結條。

【丁公藤】湖北胡椒(胡椒科) *Piper wallichii* Hand. 名見《開寶本草》、《本草拾遺》。詳見南藤條。

【丁香茄】牽牛(旋花科) *Pharbitis nil* (L.) Choisy 《植物名實圖考》卷二二牽牛子：“又一種子可蜜煎，俗謂之天茄。《救荒本草》謂之丁香茄。李時珍以為即牽牛子之白者，花、葉固無異也。”詳見盆甌草條。

【丁香柿】君仙子(柿科) *Diospyros lotus* L. 名見《廣群芳譜》卷五八軟柿條和《日用本草》。詳見榿棗條、軟棗條。

【丁翁】木通(木通科) *Akebia quinata* (Thunb.) Decne. 《名醫別錄》：“甘，無毒……一名丁翁，生石城山谷及山陽，正月採枝陰乾。”《吳普本草》亦有一名丁翁，附支之語。詳見通草條。

【丁藤】葶藶(十字花科) *Draba nemorosa* L. 《名醫別錄》葶藶：“苦，大寒，無毒。下膀胱水，伏留熱氣，皮間邪水上出，面目浮腫，身暴中風，熱癩癢，利小腹，久服令人虛。一名丁藤，一名葶藶，生藁城平澤及田野。”詳見葶藶條。

【七星蓮】匍莖堇菜(堇菜科) *Viola diffusa* Ging. 《植物名實圖考》卷一六：

“七星蓮生長沙山石上。鋪地引蔓，與石吊蘭相似，而葉闊薄有白脉。本細，末團圓，齒亂，根如短髮。又從葉下生蔓，四面傍引，從蔓上生葉，葉下復生根、鬚。一叢居中，六叢環外。根既別植，蔓仍牽帶，故有七星之名。俚醫以治紅、白痢。”
 匍莖堇菜學名中屬名 *Viola* 為植物原名；種加詞 *diffusa* 意為鋪散的。匍莖堇菜為一年生草本，全體有或無毛。花期生出地上匍匐枝，匍匐枝先端具蓮座狀葉叢，通常生不定根，根狀莖短，具多條白色細根及纖維狀根；基生葉多數，叢生呈蓮座狀，或於匍匐枝上互生，葉片卵形或卵狀長圓形，長 1.5~3.5 厘米，寬 1~2 厘米，先端鈍或稍尖，基部寬楔形或截形，明顯下延於葉柄，邊緣具鈍齒及綠毛，幼葉密被白色柔毛，葉柄長 2~4.5 厘米，具明顯的翅，通常有毛；花較小，淡紫色或淺黃色，具長梗，生於基生葉或匍匐枝葉叢的葉腋間，花梗纖細，萼片披針形，5 枚，花瓣 5，側方花瓣倒卵形或長圓狀倒卵形，長 6~8 毫米，下方花瓣具距，共長 6 毫米，較短，距極短，長僅 1.5 毫米，子房無毛；蒴果長圓形，直徑約 3 毫米，長約 1 厘米，無毛，頂端常具宿存的花柱。成熟時 3 瓣裂。花期 3~5 月，果期 5~8 月份。生於山地林下、林緣、草坡、溪谷旁、巖石縫隙中。產浙江、臺灣、四川、雲南、西藏等地。全草入




七星蓮(匍莖堇菜)

藥，能清熱解毒；外用可消腫、排膿。匍莖堇菜變種——短鬚毛匍莖堇菜與原變種極相似，僅側方花瓣里面基部有明顯的鬚毛，分佈於華北、華中、華南及華東、西南等地。用途與原變種相同。

【卜地蜈蚣】蒲公英(菊科) *Taraxacum mongolicum* Hand. - Mazz. 名見《草木便方》。詳見蒲公英條。

【八月芒】芒(禾本科) *Miscanthus sinensis* Anderss. 名見《詩毛氏傳疏》。詳見筓茅條。

【八月春】秋海棠(秋海棠科) *Begonia evansiana* Andr. 秋海棠又稱思想草、斷腸花、斷腸草。《花鏡》卷六秋海棠：



八月春(秋海棠)

“秋海棠一名八月春，為秋色中第一。”又伊欽恒校注：“別名思想草，斷腸花。”秋海棠學名中的 *Begonia* 來自人名 M. Begon. 秋海棠是多年生草本，有球形塊莖，莖高 60~100 厘米，葉腋間生珠芽。葉片寬卵形，長 8~20 厘米，寬 6~18 厘米，漸尖頭，基部心臟形，偏斜，邊緣呈尖波狀，有細尖牙齒，下面和葉柄都帶紫紅色，葉柄長 5~12 厘米；聚傘花序腋生；花大，淡紅色，直徑 2.5~3.5 厘

米,雄花被片 4,雌花被片 5;蒴果長 1.5~3 厘米,有 3 翅,其中一翅通常較大。生陰濕地方,野生和栽培。分佈於長江以南各省區,北至山東、河北。全草及塊莖藥用。

【八月蘭】建蘭(蘭科)*Cymbidium ensifolium* (L.) Sw. 名見《分類草藥性》。詳見墨蘭條。

【八仙花】繡毬(虎耳草科)*Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. 繡毬又稱紫繡毬等。《植物名實圖考》卷二六八仙花:“《花鏡》:八仙花即繡毬之類也,因其一蒂八蕊,簇成一朵,故名八仙。其花白,瓣薄而不香。蜀中紫繡毬即八仙花。”繡毬學名中的 *Hydrangea* 來自[希]hydor(水)+angeion(容器),此為繡毬屬;*macrophylla* 意為大葉的。繡毬是落葉灌木。莖基多分枝,形成一簇灌叢,枝粗壯,有明顯的皮孔與葉迹;葉對生,葉片稍大近革質,倒卵形或闊橢圓形,長 7~20 厘米,寬 4~10 厘米,先端驟尖,具短尖頭,葉緣中上部具粗齒;傘房狀聚傘花序近毬形,直徑 8~20 厘米,花密集,多數不育,萼 4 片,白色、粉紅色或變為藍色;蒴果長陀螺狀。野生於山谷或山疏林。全國各地園林中有栽培。花用於觀賞,花和葉含八仙花苷,有清熱抗瘡作用,也可治心臟病。



八仙花(繡毬)

【八仙草】茜草(茜草科)*Rubia cordifolia* L. 名見《綱目拾遺》。詳見茹蕙條。

【八字草】小葉三點金(豆科)*Desmodium microphyllum* (Thunb.) DC. 小葉三點金又稱碎米柴等。《植物名實圖考》卷一五:“八字草產建昌。小草蔓生,莖細如髮……”小葉三點金學名中的 *Desmodium* 源於希臘語 desma(紐帶),現為山螞蝗屬屬名;*microphyllum* 意為小葉的。小葉三點金為多年生草本。根粗,木質;莖纖細,多分枝,直立或平臥,常為紅褐色,近無毛;葉為羽狀三出復葉,或有時僅為單小葉,托葉披針形,有緣毛,小葉薄紙質,全緣;總狀花序頂生或腋生,被黃褐色開展柔毛,有花 6~10 朵,花小,長約 5 毫米,苞片卵形,被黃褐色柔毛,花冠粉紅色,雄蕊二體,子房綫形,被毛;莢果長 12 毫米,寬 3 毫米,通常有莢節 3~4,有時 2 或 5,有網脈。花果期 5~11 月份。生於荒地草叢中或灌木林中,海拔 150~2500 米。產長江以南各省區,西藏、臺灣也有分佈。根供藥用,有清熱解毒、止咳、祛痰之效。



八字草(小葉三點金)

【八角大茴】八角(木蘭科)*Illicium verum* Hook. f. 《本草求真》:“余細嚼審八角茴味,其香雖有,其味甚甘,其性溫

而不烈，較之吳茱萸、艾葉等味，更屬不同，若是八角大茴甘多之味，而謂能除沉寒痼冷，似於理屬有礙。”詳見八角茴香條。

【八角金盤】八角楓(八角楓科) *Alangium chinense* (Lour.) Harms《本草從新》：“八角金盤，其氣猛悍，能開通壅塞，痛淋(痛麻)立止，虛人慎之。樹高二三尺，葉如臭梧桐而八角，秋開白花細簇。”詳見刺楓條。

【八角茴香】八角(木蘭科) *Illicium verum* Hook. f. 八角又稱茴香、蘘香、八角珠、大茴香、舶茴香、八角大茴等。《本草綱目》卷二六蘘香：“自番舶來者，實大如柏實，裂成八瓣，一瓣一核，大如豆，黃褐色，有仁，味更甜，俗呼舶茴香，又曰八角茴香(廣西左右江峒中亦有之)，形色與中國茴香迥別，但氣味同爾。”八角學名中的 *Illicium* 來自[拉] *illicio*，誘惑的，此為八角屬；*micranthum* 意為小花的。八角是喬木。莖高 10~15 米，樹冠塔形，樹皮深灰色；葉革質，不整齊互生，倒披針形或橢圓形，長 5~15 厘米，寬 2~5 厘米；花單生於葉腋或近頂生，花被 7~12 片，粉紅色至深紅色；蓇葖果呈八角形，星狀體徑 2.5~3.0 厘米，紅棕色；種子扁卵形，棕色。喜陰濕山地。產福



八角茴香(八角)

建、廣東、廣西、雲南、臺灣等地。果是調味品，亦入藥，溫陽散寒。

【八角茶】枸骨(冬青科) *Ilex cornuta* Lindl. 名見《本草從新》，並曰：“生津止渴，用葉代茶甚妙，祛風。”詳見貓兒刺條。

【八角珠】八角(木蘭科) *Illicium verum* Hook. f. 名見《本草綱目》。詳見八角茴香條、茴香條。

【八角烏】款冬(菊科) *Tussilago farfara* L. 名見《植物名實圖考》。詳見菟奚條。

【八角盤】八角蓮(小檗科) *Dysosma versipellis* (Hance) M. Cheng 名見《本草綱目》。詳見九白條、爵犀條。

【八寶草】八寶(景天科) *Hylotelephium erythrostictum* (Miq.) H. Ohba《植物名實圖考》卷一一景天：“景天，《本經》上品，宋《圖經》敘述極詳。今俗呼火燄草，京師謂之八寶，亦名佛指甲，盆盛養於屋上……雩婁農曰：景天名甚麗，如蘇頌言，即八寶草，南、北種於屋上以辟火，此不待訪詢而知也。”詳見景天條。

【人字草】鷄眼草(豆科) *Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl. 名見《本草求原》，並曰：“治跌打撲腫，解毒。”詳見掐不齊條。

【人柳】檉柳(檉柳科) *Tamarix chinensis* Lour.《本草綱目》卷三五檉柳：“漢武帝苑中有柳，狀如人，號曰人柳，一日三起三眠。”詳見雨師條。

【九子萍】浮萍(浮萍科) *Lemnaceae* spp.《廣群芳譜》卷九一萍：“一夕生九子，故名九子萍。”多指紫萍和浮萍。詳見紫背浮萍條、青萍條。

【九白】八角蓮(小檗科) *Dysosma versipellis* (Hance) M. Cheng《本草綱目》卷一七鬼白：“[釋名]九白、天白、鬼藥、解毒、爵犀、馬目毒公、害母草、羞天花、

术律草、瓊田草、獨脚蓮、獨荷草、山荷葉、旱荷、八角盤、唐婆鏡[弘景曰]鬼白根如射干，白而味甘，九白相連，有毛者良，故名。”詳見爵犀條。

【九英】蠟梅(蠟梅科) *Chimonanthus praecox* (L.) Link 《廣群芳譜》蠟梅：“《梅譜》云，子種不經接，花小香淡，其品最下，謂之狗蠟梅，後訛為九英。”詳見黃梅花條。

【九英菘】蕪菁(十字花科) *Brassica rapa* L. 《本草綱目》卷二六蕪菁條引陳藏器曰：“蕪菁北人名蔓菁。今並、汾、河朔間燒食其根，呼為蕪根，猶是蕪菁之號。蕪菁南北之通稱也。塞北、河西種者，名九英蔓菁，亦曰九英菘。”詳見葑條。

【九英蔓菁】蕪菁(十字花科) *Brassica rapa* L. 名見《本草綱目》。詳見葑條、九英菘條。

【九真藤】何首烏(蓼科) *Polygonum multiflorum* Thunb. 《廣群芳譜》卷九八何首烏：“李時珍曰：……赤者能消腫毒，外科呼為瘡帚，紅內消。《門門方》云：取根若獲九數者服之，乃仙，故名九真藤。”詳見馬肝石條。

【九節蓮】蕺菜(三白草科) *Houttuynia cordata* Thunb. 名見《嶺南採藥錄》，並曰：九節蓮“葉敷惡毒大瘡，能消毒；煎服能去濕熱，治痢疾。”詳見魚腥草條。

【九節蘭】建蘭(蘭科) *Cymbidium ensifolium* (L.) Sw. 名見《綱目拾遺》。詳見墨蘭條。

【九里明】千里光(菊科) *Senecio scandens* Buch. - Ham. 千里光又稱千里及、千里急等。《植物名實圖考長編》卷一〇千里及：“按千里及，江西、湖南隨處有之。俗呼千里光，一名九里明。”千里光學名中的 *Senecio* 來自[拉] *senex*，老人之意，此為千里光屬；*scandens* 意為攀援的。千里及是多年生草本。莖細長呈攀

援狀，上部多分枝，長2~5米，直徑2~3毫米；葉互生，橢圓狀三角形或卵狀披針形，長達12厘米，寬達10厘米；頭狀花序生於枝端，排列成傘房狀，舌狀花黃色，約8~9個，長約10毫米，筒狀花多數；瘦果圓柱形，有縱溝，被短毛。分佈於我國中部和南部各地，日本、印度也產。生長在路邊荒野。全草入藥，性寒、味苦，功能解毒、明目，主治皮膚濕疹、疥瘡腫毒、沙眼、目赤腫痛等症。



九里明(千里光)

【九里明】山柳菊(菊科) *Hieracium krameri* Fr. et Sav. 山柳菊又稱黃花母。《植物名實圖考》卷九山柳菊：“山柳菊一名九里明，一名黃花母。南贛山中皆有之。”山柳菊學名中的 *Hieracium* 來自[希] *hierax*，鷹。山柳菊是多年生草本，高60~90厘米。基生葉綫狀長橢圓形，長約30厘米，寬1.5~2厘米，花莖上的葉互生，無柄，狹披針形或綫形；頭狀花序由花莖頂端葉腋抽出，具長梗，數個排列成傘房狀，每一頭狀花序的總苞長約1.3厘米，圓柱狀，苞片長披針形，先端尖，背面有黑色條紋；花序內全為舌狀花，有10餘朵，花冠黃色，舌片先端截平，有5齒裂；瘦果長圓形，頂端有淡褐色的冠毛。花期9月份。生於山麓、原野、溝邊有積水或潮濕的地方。分佈江

西等地。全草供藥用。



九里明(山柳菊)

【九里香】木犀(木犀科) *Osmanthus fragrans* Lour. 《植物名實圖考長編》卷一九木樨：“《墨莊漫錄》：木樨花，江、浙多有之……湖南呼九里香，江東曰嚴桂，浙人曰木樨，以木紋理如犀也。”詳見檜條。

【九層塔】羅勒(唇形科) *Ocimum basilicum* L. 名見《嶺南採藥錄》。詳見翳子草條、香花子條。

【九頭獅子草】馬齒莧(馬齒莧科) *Portulaca oleracea* L. 名見《本草綱目》。詳見馬莧條。

【九蟲根】百部(百部科) *Stemona japonica* (Bl.) Miq. 名見《分類草藥性》。詳見野天門冬條。

【九叢根】百部(百部科) *Stemona japonica* (Bl.) Miq. 名見《草木便方》。詳見野天門冬條。

【乃東】夏枯草(唇形科) *Prunella vulgaris* L. 名見《神農本草經》卷中。詳見夕句條。

【刀鞘豆】刀豆(豆科) *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC. 名見《陸川本草》。詳見挾劍豆條。

三 畫

【三百兩銀藥】馬兜鈴(馬兜鈴科) *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc. 名見《本草綱目》。詳見土青木香條、都淋藤條。

【三秀】靈芝屬(多孔菌科) *Ganoderma* spp. 名見《楚辭》。詳見靈芝草條。

【三角尖】楓香樹(金縷梅科) *Liquidambar formosana* Hance 名見《嶺南採藥錄》。詳見三角楓條、香楓條。

【三角楓】楓香樹(金縷梅科) *Liquidambar formosana* Hance 名見《嶺南採藥錄》，並曰：“治風濕……疼痛及癰疽腫毒。”詳見香楓條。

【三角酸】酢漿草(酢漿草科) *Oxalis corniculata* L. 三角酸名見於《本草綱目》。詳見三葉酸條、醋母草條。

【三枝九葉草】淫羊藿(小檗科) *Epimedium grandiflorum* Morr. 名見《本草圖經》。詳見放杖草條、剛前條。

【三庚草】青蒿(菊科) *Artemisia carvifolia* Buch. - Ham. ex Roxb. 名見《履巉巖本草》。詳見邪蒿條。

【三春柳】檉柳(檉柳科) *Tamarix chinensis* Lour. 《本草衍義》云：“赤檉木，又謂之三春柳，以其一年三秀也。”詳見雨師條。

【三柰】山柰(薑科) *Kaempferia galanga* L. 名見《本草綱目》。詳見三賴條。

【三柰子】山柰(薑科) *Kaempferia galanga* L. 《海上方》麝香一字散：“三柰子二錢，麝香半錢。爲細末，每用三字，口噙溫水，隨牙痛處一邊鼻內嚙之，漱水吐去，便可。”詳見三賴條。

【三眠柳】檉柳(檉柳科) *Tamarix chinensis* Lour. 名見《本草綱目》卷三五和《本草衍義》。詳見赤楊條、雨師條。

【三葉草】截葉鐵掃帚(豆科)*Lespedeza cuneata* (Dum. - Cours.) G. Don 名見《滇南本草》。詳見鐵掃帚條。

【三葉酸】酢漿草(酢漿草科)*Oxalis corniculata* L.《本草綱目》卷二〇酢漿草：“[釋名]：酸漿、三葉酸、三角酸、酸母、醋母、酸箕、鳩酸、雀兒酸、雀林草、小酸茅、赤孫施：此小草三葉酸也，其味如醋。與燈籠草之醋漿，名同物異。唐《慎微本草》以此草之方收入彼下，誤矣。閩人鄭樵《通志》言，福人謂之孫施。則蘇頌《圖經》赤孫施生福州，葉如浮萍者，即此也。孫施亦酸箕之訛耳。今併爲一。”詳見醋母草條。

【三葉酸草】酢漿草(酢漿草科)*Oxalis corniculata* L. 名見《千金方》。《本草綱目》卷二〇酢漿草：“[附方]赤白帶下，三葉酸草，陰乾爲末，空心溫酒服三錢匕。《千金方》。”詳見醋母草條。

【三葉酸漿】酢漿草(酢漿草科)*Oxalis corniculata* L.《植物名實圖考》卷一六：“酢漿草，《唐本草》始著錄，即三葉酢漿。生山石間，葉大如錢。”詳見醋母草條。

【三稜草】香附子(莎草科)*Cyperus rotundus* L.《植物名實圖考長編》卷一二莎草條：“河南及淮南下濕地即有，名水莎，隴西謂之地賴草，蜀郡名續根草，亦名水巴戟，今涪都最饒，名三稜草……”詳見莎草條。

【三廉】陽桃(酢漿草科)*Averrhoa carambola* L. 陳祈暢《異物誌》：“三廉大實，實不但三(原注：雖名‘三廉’，或有四五六枝)。食之多汁，味酸且甘。藏之尤好，與衆菓相參。”詳見五斂子條。

【三蔓草】巴戟天(茜草科)*Morinda officinalis* How 巴戟天又稱不凋草。《唐本草注》：“巴戟天苗，俗方名三蔓草。葉似茗，經冬不枯，根如連珠，多者良，宿根青色，嫩根白紫，用之亦同。”巴戟天學

名中的 *Morinda* 巴戟天屬；*officinalis* 藥用的意思。巴戟天是藤本植物。根肉質，多少收縮成串珠狀；枝被粗毛；葉對生；頭狀或由 3 至多個頭狀花序組成傘形花序，花冠白色；聚合果近毬形。生於疏林下或林緣，也有栽培。分佈於廣東、廣西、福建等地。以根入藥，具有補腎虛，壯筋骨，祛風濕之功能，治陽痿、小腹冷痛、小便不禁、子宮虛冷、風寒濕痹、腰膝酸痛。



三蔓草(巴戟天)

【三賴】山柰(薑科)*Kaempferia galanga* L. 山柰又稱三柰、三賴、三柰子、山辣、沙薑等。《本草綱目》卷一四山柰：“[釋名]山辣、三柰[時珍曰]山柰俗訛爲三柰，又訛爲三賴，皆土音也。或云：本名三辣，南人舌音呼山爲三，呼辣如賴，故致謬誤。其說甚通。”三賴之名始載於《本草品匯精要》，後世訛爲山柰。山柰學名中的 *Kaempferia* (德) 人名 E. kaempfer, 山柰屬；*galanga* 來自印度馬拉巴的土名。山柰是多年生宿根草本。塊狀根莖，單生或數枚相連，淡綠色或綠白色，芳香，根粗壯；無地上莖；葉 2 枚，幾無柄，近地面生長，近圓形，長 8~14 厘米，寬 5~10 厘米，先端漸尖，質薄，葉

面有紅色小點，脉 10~12 條；穗狀花序半藏於葉鞘中，花 4~12 朵，苞片披針形，花白色，有香味；蒴果。喜陽和溫濕氣候。臺灣、兩廣、雲南有栽培。根莖是健胃藥。



三賴(山奈)

【三斂子】陽桃(酢漿草科) *Averrhoa carambola* L.《嶺南雜記》：“羊桃，一名三斂子，一名五斂子，以其觚稜而分也。色青黃，味甘酸，內有小核，能解肉食之毒。”詳見五斂子條。

【三賴】山奈(薑科) *Kaempferia galanga* L. 名見《南越筆記》。詳見三賴條。

【土人參】金鐵鎖(石竹科) *Psammosilene tunicoides* W. C. Wu et C. Y. Wu 名見《植物名實圖考》。詳見昆明沙參條。

【土三七】落地生根(景天科) *Bryophyllum pinnatum* L. f. Oken 落地生根又稱葉生、葉爆芽。《植物名實圖考》卷九：“土三七生廣西。莖、葉俱似景天而不甚高，厚葉，有汁無紋，周圍有圓齒，伏日撥置赫曦中，經月不槁，無花實。摘葉種之即生，亦名葉生。”落地生根學名中的 *Bryophyllum* 指落地生根屬；*pinnatum* 意指羽狀的。落地生根為多年生肉質草本植物。莖直立，高達 1 米；葉對生，單葉或復葉，聚傘花序着生於枝頂或葉腋內，花兩性，苞片 2 枚，萼管膨大呈

筒狀，花冠瓮狀；蓇葖果 4 枚，種子多數。生於陰濕的地方。分佈於廣東、廣西、福建、臺灣、雲南等地。全草或根入藥，具有涼血、止血、消腫、解毒之功效，治吐血、刀傷出血、胃病、關節痛、咽喉腫痛、乳癰、疔瘡、潰瘍、燙傷等。



土三七(落地生根)

【土三七】三七草(菊科) *Gynura segetum* (Lour.) Merr. 三七草又稱天青地紅、散血草、和血丹、澤蘭、葉下紅、見腫消、乳香草、爛草。《植物名實圖考》卷九土三七：“此草今處處種之盆中，俚醫以葉面青，背紫，隱其名曰天青地紅。”又：“《辰谿縣誌》：“澤蘭一名土三七，一名葉下紅……”《簡易草藥》“散血草即和血丹，土名三七……”三七草學名中的 *Gynura* 來自(希)gyne(雌蕊)與 oura(尾)；*segetum* 意指谷田的。三七草是多年生直立草本，高 50~110 厘米。葉互生，長達 20 厘米，羽狀分裂，上面深綠色，下面紫綠色，裂片頂端漸尖，邊緣有不規則鋸齒，葉柄長約 2 厘米，莖上部葉近無柄；

頭狀花序排成傘房狀，苞片 2 層，花兩性，花冠筒狀，黃色，5 裂；瘦果綫形，冠毛多數，白色。生於山野或荒地草叢中。分佈江蘇、浙江、河北、湖南、四川等地。根、葉或全草供藥用。



土三七(三七草)

【土大黃】羊蹄(蓼科) *Rumex japonicus* Houtt. 《滇南本草圖說》：“羊蹄根，一名土大黃——即秃葉，一名天王葉。氣味甘滑，性寒無毒。”詳見遂條。

【土瓜】蕪菁(十字花科) *Brassica rapa* L. 土瓜之名見《本草綱目》。詳見葑條。

【土瓜】諸葛菜(十字花科) *Orychophragmus violaceus* L. 土瓜之名見《本草綱目》。詳見薺菜條。

【土瓜】王瓜(葫蘆科) *Trichosanthes cucumeroides* (Ser.) Maxim. 《本草經》：“王瓜，味苦，寒。主治消渴內癆，瘀血月閉，寒熱酸疼，益氣愈聾。一名土瓜。”《本草綱目》卷一八王瓜：[釋名]土瓜等，引：“[頌曰]……而土瓜自謂之藤姑，又名鉤蕪，則菟瓜別是一物也。又曰：苐，

菲。亦謂之土瓜。別是一物，非此土瓜也，異類同名，不可不辨。”詳見鉤條。

【土芋】陽芋(茄科) *Solanum tuberosum* L. 陽芋又稱土卵、黃獨、土豆、山藥蛋等。《本草綱目》卷二七土芋：“[釋名]土卵、黃獨、土豆。[藏器曰]土芋蔓生，葉如豆，其根圓如卵。鴉鳩食後彌吐，人不可食。又云：土卵蔓生，如芋，人以灰汁煮食之。”古稱“蔓生”，當指地上莖柔弱，或指有匍匐莖。陽芋學名中的 *Solanum* 來自[希]solamen 鎮靜，此為茄屬；*tuberosum* 是多塊莖的。陽芋是草本植物。地上莖柔弱，具匍匐莖；地下莖塊狀，扁圓形或長圓形，莖高 30~80 厘米，有毛或無；單數羽狀復葉，小葉 6~8 對，常大小相間，卵形或矩圓形，兩面被疏柔毛；傘房花序頂生，後側生，花白色或藍紫色，花萼鐘形，徑約 1 厘米，外被疏柔毛，花冠輻狀，徑約 2.5~3 厘米，5 淺裂；漿果圓毬形，綠或紫褐色；種子扁圓形，黃色。性喜冷涼高燥，對土壤適應性強。我國各地均有栽培。塊莖可食或作工業原料。



土芋(陽芋)

【土芝】芋(天南星科) *Colocasia esculenta* (L.) Schott. 《名醫別錄》：“芋，味辛，平，有毒。主寬腸胃，充肌膚，滑中；

一名土芝。”詳見蹲鴟條。

【土杏】杜衡(馬兜鈴科) *Asarum forbesii* Maxim. 《史記·司馬相如列傳·索隱》引《博物誌》：“杜衡一名土杏，其根一似細辛，葉似葵。”詳見馬蹄香條。

【土豆】陽芋(茄科) *Solanum tuberosum* L. 《農政全書》：“香芋形如土豆，味甘美。土芋，一名土豆，一名黃獨，蔓生，葉如豆，根圓如鷄卵，肉白皮黃……”詳見土芋條。

【土貝】假貝母(葫蘆科) *Bolbostemma paniculatum* (Maxim.) Franquet 名見於清《百草鏡》，並曰：“能散癰毒，化膿行滯，解廣瘡結毒，除風濕，利痰，敷惡瘡斂瘡口。”詳見蝨條。

【土貝母】假貝母(葫蘆科) *Bolbostemma paniculatum* (Maxim.) Franquet 名見《本草從新》，並曰：“治外科痰毒。”《本草綱目拾遺》：“陽和湯加土貝母五錢煎服。”治乳巖。詳見蝨條。

【土貝母】浙貝母(百合科) *Fritillaria thunbergii* Miq. 貝母在《本草綱目》以前的歷代文獻，並未明確分立川貝、浙貝和土貝，至明朝《本草正》始另立土貝母條，係指本品。至清朝《本草從新》於貝母條下，分別附述象山貝母與土貝母，此土貝母應是葫蘆科的假貝母。清朝《本草求真》貝母：“大者為土貝母，大苦大寒，如浙江貝母之類。”詳見象貝條。

【土卵】黃獨(薯蕷科) *Dioscorea bulbifera* L. 名見《唐本草》。詳見山慈姑條。

【土卵】陽芋(茄科) *Solanum tuberosum* L. 名見《本草綱目》。詳見土芋條。

【土青木香】馬兜鈴(馬兜鈴科) *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc. 馬兜鈴又稱木香、青木香、天仙藤、都淋藤、獨行根、雲南根、三百兩銀藥等。《本草圖經》：“亦有葉如山芋，而開紫花者。不拘時月，採根芽為藥。以其形如枯骨者良。

江、淮間亦有此種，名土青木香，不堪入藥用。”馬兜鈴學名中的 *Aristolochia* [希] *aristos* (最好的) + *locheia* (催生藥)，此是馬兜鈴屬；*debilis* 意指柔弱的。馬兜鈴是草質藤本。根圓柱形，外皮黃褐色；莖弱、纏繞、暗紫或綠色；葉互生，紙質，卵狀三角形，長圓狀卵形或戟形，長3~8厘米，寬2~4厘米，頂端漸尖或鈍，基部心形；花單生或2朵聚生，花冠暗紫色，喇叭狀，長3~4厘米，基部毬形，上部花被一側擴展；蒴果近毬形，徑約4厘米，6瓣開裂。生山坡、溝旁、灌叢陰濕處。分佈於黃河以南至長江流域。果、莖、根皆入藥。同屬植物北馬兜鈴(*A. contorta* Bge.)的莖葉，在有些地區亦同等入藥。



土青木香(馬兜鈴)

【土茜】茜草(茜草科) *Rubia cordifolia* L. 《救荒本草》：“土茜苗，今北土處處有之，名土茜。”詳見茹蘆條。

【土茴香】茴香(傘形科) *Foeniculum vulgare* Mill. 《救荒本草》：“茴香，一名藿香子，北人呼為土茴香，茴、藿聲相近，故云爾。”詳見藿香條。

【土恒山】杜莖山(紫金牛科) *Maesa ja-*


ponica (Thunb.) Moritzi《本草綱目》卷一七常山條[附錄]:“土紅山:[頌曰]葉,甘,苦,微寒,無毒……生福州及南恩州山野中。大者高七八尺。葉似枇杷而小,無毛。”又:“[時珍曰]杜莖山即土恒山,土紅山又杜莖山之類,故並附之。”杜莖山學名中的 *Maesa* 源於阿拉伯語 *maass*, 為植物原名,現為杜莖山屬屬名;*Japonica* 意為日本的。杜莖山為常綠灌木,高1~3米。少分枝,有時攀援狀,枝無毛;葉互生,草質,長橢圓形或狹橢圓形,長5~15厘米,寬2~5厘米,幾全緣或中部以上具疏鋸齒,無毛;總狀花序或圓錐花序,單1或2~3個腋生,花黃白色,花冠5裂,長鐘形;果毬形,直徑4~5毫米。多生於常綠闊葉林下。分佈於長江中、下游至福建、廣東、廣西等地。果可食,微甜,全株可入藥,有祛風寒、消腫之效。



土恒山(杜莖山)

【土馬鬃】大金髮蘚(金髮蘚科) *Polytrichum commune* Hedw.《嘉祐本草》:“土馬鬃治骨熱,敗煩熱,毒壅,血鼻。”大金髮蘚學名中 *Ploytrichum* 來源於希臘文,意為毛髮多的意思;*commune* 意為普通的。大金髮蘚為草本,高10~30厘米,叢生。莖直立,單一,常扭曲。

下部密生假根,上部深色,老時呈棕紅色或黑棕色;葉叢生於上部,向下葉漸小而漸疏,上部葉較大,具長卵形明顯鞘部,葉片驟狹,長披針形,尖端捲曲,邊緣具密銳齒,中肋強,突出成刺狀,背面前部中央具微齒,腹面具多數櫛片;雌雄異株,雄株稍短,頂生雄器,狀如花苞,雌株較高大,頂生孢蒴,蒴柄強勁,長達10厘米,棕紅色,孢蒴部直立,成熟時平列或垂傾,棕紅色,四稜短方形,蒴帽覆蓋全蒴,具棕黃色毛,蒴蓋扁平具短喙;孢子小圓形,黃色,平滑。生山野陰濕地坡。分佈我國南北部多地。全草入藥,有滋陰補虛之效,治肺病咳嗽、吐血、盜汗。



土馬鬃(大金髮蘚)

【土柴胡】牡蒿(菊科) *Artemisia japonica* Thunb.《陸川本草》土柴胡:“驅風發散,解表退熱。治感冒身熱頭痛。”詳見蔚條。

【土柴胡】地膽草(菊科) *Elephantopus scaber* L. 名見《生草藥性備要》。詳見天芥菜條。

【土黃連】黃連(毛茛科) *Coptis chinensis* Franch.《植物名實圖考》卷七:“黃連,《本經》上品。今用川產,其江西山中所產者,謂之土黃連。”詳見王連條。

【土萆薢】土茯苓(百合科) *Smilax gla-*

bra Roxb. 土茯苓又稱刺豬苓、山豬糞、草禹餘糧、仙遺糧、冷飯團、硬飯、山地栗。《廣群芳譜》卷九八土茯苓：“（《本草綱目》）土茯苓，一名土草薺，一名刺豬苓，一名山豬糞，一名草禹餘糧，一名仙遺糧，一名冷飯團，一名硬飯，一名山地栗。”土茯苓學名中的 *Smilax* 來自[希] *smilax*，菝葜的古名；*glabra* 意指無毛的。土茯苓是攀援狀灌木。根狀莖粗厚，塊狀，常由匍匐莖相連接；莖無刺；單葉互生，革質，披針形至橢圓狀披針形，長 6~15 厘米，寬 1~7 厘米，先端漸尖，基部圓形，全緣，下面有時帶蒼白色，葉鞘先端常變成 2 條捲鬚；傘形花序腋生，花單性，雌雄異株，綠白色，雄花的雄蕊 6，雌花的退化雄蕊綫形；漿果毬形，熟時紫黑色。生於山坡、荒山及林邊的半陰地。分佈甘肅和長江以南各省區。根狀莖供藥用。




土草薺(土茯苓)

【土鹵】杜衡(馬兜鈴科) *Asarum forbesii* Maxim. 《植物名實圖考》卷八杜衡：“杜衡，《別錄》中品，《山海經》有之。《爾雅》：杜，土鹵。注：杜衡也，似葵而香。”《本草綱目》卷一三杜衡：“[頌曰]《爾雅》，杜又名土鹵，然杜若亦名杜衡，或疑是杜若，而郭璞注云，似葵，當是杜衡

也。”詳見馬蹄香條。

【土參】大葉三七(五加科) *Panax pseudo-ginseng* Wall. var. *japonicus* (C. A. Mey.) Hoo & Tseng 大葉三七又稱神草、土精、血參。《花鏡》卷五土參：“土參，一名神草，一名土精，一名血參，產於南浙。”大葉三七學名中的 *Panax* 來自 *panax*，萬能藥。大葉三七是多年生草本。根狀莖竹鞭狀或串珠狀，或兼有竹鞭狀和串珠狀，根通常不膨大，纖維狀；地上莖單生，高約 40 厘米；掌狀復葉，3~5 枚輪生於莖端；小葉通常 5 片，中央



土參(大葉三七)

小葉片闊橢圓形、橢圓形、橢圓狀卵形至倒卵狀橢圓形、先端漸尖或長漸尖，邊緣有細鋸齒、重鋸齒或缺刻狀鋸齒；傘形花序單個頂生；花黃綠色，萼杯狀，邊緣有 5 個三角形的齒，花瓣 5，雄蕊 5，子房 2 室，花柱 2。產於森林下或灌叢草坡中，海拔 1200~4000 米。分佈甚廣。根狀莖可代三七供藥用。

【土細辛】杜衡(馬兜鈴科) *Asarum*

forbesis Maxim. 名見《本草綱目》。詳見馬蹄香條。

【土細辛】九頭獅子草(爵牀科) *Peristrophe japonica* (Thunb.) Bremek. 名見《植物名實圖考》。詳見接骨草條。

【土酥】蘿蔔(十字花科) *Raphanus sativus* L. 王禎《農書》：“老圃云，蘿蔔一種而四名：春曰破地錐，夏曰夏生，秋曰蘿蔔，冬曰土酥。”杜甫有詩云：“長安冬菹酸且綠，金城土酥淨如練。”詳見菲條。

【土筋】黃茅(禾本科) *Heteropogon contortus* (L.) Beauv. 《本草綱目》卷一三地筋條：“[釋名]菅根，土筋。”詳見菅根條。

【土鼓】爬山虎(葡萄科) *Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch. 《植物名實圖考長編》卷一〇：“‘常春藤’小兒取其藤，於地打作鼓聲，故名土鼓。”詳見地錦條。

【土鼓藤】爬山虎(葡萄科) *Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch. 《植物名實圖考》卷一二：“常春藤即土鼓藤，《本草拾遺》始著錄。”詳見地錦條。

【土萼撥】萼葉(胡椒科) *Piper betle* L. 名見《本草綱目》。詳見蒟醬條。

【土蛹】甘露子(脣形科) *Stachys sieboldii* Miq. 名見《餘冬錄》。詳見滴露條。

【土當歸】紫花前胡(傘形科) *Angelica decursiva* (Miq.) Franch. et Sav. 《植物名實圖考》卷二五土當歸：“土當歸，江西、湖南山中多有之，形狀詳《救荒本草》。惟江湖產者花紫。”紫花前胡學名中的 *Angelica* 意指神聖的；*decursiva* 意指下延的。紫花前胡是多年生草本，高1~2米。根圓錐狀，棕黃色至棕褐色，味濃香，莖常為紫色，根生葉和莖生葉，有長柄，葉片三角形至卵圓形，一回至二回羽狀全裂，一回裂片3~5片，再3~5裂，葉軸翅狀，頂生裂片和側生裂片，基


部連合，基部下延成翅狀，最終裂片狹卵形或長橢圓形，有尖齒，莖上部葉簡化成葉鞘；復傘形花序，傘幅10~22，總苞片1~3，小總苞片3~8，花深紫色；雙懸果橢圓形。生於山地林下。分佈於山東以南各省區。根稱前胡，入藥，果實可提制芳香油。



土當歸(紫花前胡)

【土竭力】赤脛散(蓼科) *Polygonum runcinatum* Buch. - Ham. 《植物名實圖考》卷一〇：“赤脛散生寶慶山中……滇南生者尤長大，開粉紅花如蓼，土呼土竭力。”赤脛散學名中的 *Polygonum* 源於希臘語 *Polys*(多的) + *gonia*(關節)，現為蓼屬屬名；*runcinatum* 意為倒向羽裂的。赤脛散為多年生草本，高30~50厘米。根狀莖細長，黃色，鬚根黑棕色；莖細弱，直立或斜上，紫色具縱溝紋，有節，被柔毛或近無毛；葉有柄，卵形或三角狀卵形，基部截形，無毛或有柔毛，托葉鞘筒狀膜質；頭狀花序，小形，常數個生於枝條頂端，總花梗有腺毛，花白色或淡紅色，花被5深裂；瘦果卵形，有3稜，黑色，有小點。花期6~8月份。喜生於山谷林下，溪旁濕地。分佈於我國陝西、甘肅、河南、湖北、湖南、貴州等地。全草均

可入藥，根狀莖有舒筋活血、消腫、止痛之效。



土竭力(赤脛散)

【土精】大葉三七(五加科) *Panax pseudo-ginseng* Wall. var. *japonicus* (C. A. Mey.) Hoo & Tseng 名見《花鏡》。詳見土參條。

【土質汗】益母草(唇形科) *Leonurus artemisia* (Lour.) S. Y. Hu《本草綱目》卷一五茺蔚：“近效方謂之土質汗。林億云：質汗出西番，乃熱血合諸藥煎成，治金傷折傷。益母亦可作煎，治折傷，故名爲土質汗也。”詳見蕪條。

【土薯】薯蕷(薯蕷科) *Dioscorea opposita* Thunb.《本草綱目》卷二七薯蕷：“[釋名]薯蕷、土薯、山薯、山芋、山藥、玉延。”詳見薯蕷條。

【土檀】具柄冬青(冬青科) *Ilex pedunculosa* Miq. 名見《爾雅注》。詳見凍青條、柵子條。

【土藟】薯蕷(薯蕷科) *Dioscorea opposita* Thunb.《名醫別錄》：“秦楚名玉延，鄭越名土藟，生嵩高山谷。”詳見薯蕷條。

【土蟲草】甘露子(唇形科) *Stachys sieboldii* Miq.《陸川本草》：“土蟲草，滋

養強壯，清補肺金，功類冬蟲草。治身體羸瘦，虛勞咳嗽，小兒疳疾。”詳見滴露條。

【下馬仙】大戟(大戟科) *Euphorbia pekinensis* Rupr. 大戟又稱印巨、印鉅、蕎等。《本草綱目》卷一七大戟：“[時珍曰]其根辛苦，戟人咽喉，故名。今俚人呼爲下馬仙，言利人甚速也。”大戟學名中的 *Euphorbia* 爲人名 Euphorbus(羅馬)，是摩利達尼亞王 Juba 的醫生，此爲大戟屬； *pekinensis* 意指北京的。大戟是多年生草本，高 30~80 厘米；根紡錘形至圓



下馬仙(大戟)

錐形，黃褐色；莖直立，單一，無毛，帶紫色，全株含白色乳汁；單葉互生，長圓形或披針形，長 3~8 厘米，寬 5~13 毫米，全緣，下面稍被白粉；杯狀聚傘花序，通常 5 枝，排列成復傘形；蒴果三稜狀球形，表面具疣狀突起；種子卵形，光滑。分佈於我國各地。生於山坡、路旁、荒地、草叢、林緣及疏林下。根入藥，可瀉水飲，利二便，主治水腫脹滿、痰飲積聚等症。

【大一枝箭】忽地笑(石蒜科) *Lycoris aurea* Herb.《滇南本草》大一枝箭：“大一枝箭，味甘，微苦，性[溫]陰也。”詳見

鐵色箭條。

【大力子】牛蒡(菊科) *Arctium lappa* L. 名見《本草綱目》。詳見鼠黏條、惡實條。

【大弋豆】刀豆(豆科) *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC. 名見《本草求原》。詳見挾劍豆條。

【大札】益母草(脣形科) *Leonurus artemisia* (Lour.) S. Y. Hu 名見《本草經》。詳見菴條、菴蔚條。

【大芥】芥菜(十字花科) *Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss. 名見《方言》。詳見芥條、皺葉芥條。

【大貝母】假貝母(葫蘆科) *Bolbostemma paniculatum* (Maxim.) Franquet《姚希周經驗方》：“大貝母、核桃楸、金銀花、連翹各三錢。酒、水煎服。”治乳巖已破。詳見蠱條。

【大皂莢】皂莢(豆科) *Gleditsia sinensis* Lam.《千金方》治卒中風口喎：用大皂莢一兩(去皮、子，研末下篩)，醋調外塗。詳見烏犀條。

【大青】蓼藍(蓼科) *Polygonum tinctorium* Ait.《本經逢原》：“《本經》取用藍實，乃大青之子，是即所謂蓼藍也。”詳見藍實條。

【大苦】黃獨(薯蕷科) *Dioscorea bulbifera* L. 名見《廣群芳譜》。詳見山慈姑條。

【大茴香】八角(木蘭科) *Illicium verum* Hook. f.《本草求真》：“大茴香，據書所載，功專入肝燥腎……”詳見八角茴香條。

【大風茅】香茅(禾本科) *Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf 名見《嶺南採藥錄》，並曰：“散跌打傷瘀血，通經絡。頭風痛，以之煎水洗。將茅香與米同炒，加水煎飲，止水瀉。”詳見香菅條。

【大活血】大血藤(木通科) *Sargentodoxa cuneata* (Oliv.) Rehd. et Wils. 名見《植物名實圖考》。詳見血藤條。

【大室】葶藶(十字花科) *Draba nemorosa* L.《本草經》：“亭歷，味辛，寒。主治癥瘕積聚結氣，飲食寒熱，破堅逐邪，通利水道。一名大室，一名大適。生平澤及田野。”詳見葶條。

【大紅花】朱槿(錦葵科) *Hibiscus rosa-sinensis* L. 名見《漢英韻府》。詳見扶桑條。

【大紅袍】臭牡丹(馬鞭草科) *Clerodendrum bungei* Steud. 臭牡丹又稱臭楓根、臭八寶等。《植物名實圖考》卷一五：“臭牡丹，江西、湖南田野、廢圃皆有之。一名臭楓根，一名大紅袍。”臭牡丹名中的 *Clerodendrum* 臭牡丹屬。臭牡丹為落葉灌木。莖高約 1~2 米，葉對生，廣卵形，有臭氣；花紅色，有芳香，為頂生密集的頭狀聚傘花序，花萼細小，漏斗形，先端 5 裂，外面密佈短毛及腺點，花冠下部合生成蕊 4 枚，花絲與花柱均伸出，子房上位，卵圓形；核果，外圍有宿存的花萼，花期 7~8 月份，果期 9~10 月份。生長於濕潤的林邊、山溝及屋旁，亦有栽培。在我國中南部廣泛分佈。莖、葉及根均可入藥，有活血散瘀、消腫解毒之功效。治癰疽、疔瘡、乳腺炎、關節炎、濕疹、牙痛等。



大紅袍(臭牡丹)

【大紅繡球】馬纓丹(馬鞭草科) *Lantana camara* L. 名見《南越筆記》。詳見山大丹條。

【大桂】肉桂(樟科) *Cinnamomum cassia* Presl《唐本草》：“其小枝皮薄捲及二三重者，或名茵桂，或名筒桂。其牡桂嫩枝皮，名爲肉桂，亦名桂枝；其老者名木桂，亦名大桂，得人參等良。”詳見桂條。

【大菊】瞿麥(石竹科) *Dianthus superbus* L.《爾雅》：“大菊，蘧麥。”詳見蘧麥條。

【大萍】蘋(蘋科) *Marsilea quadriifolia* L.《詩傳》云：“蘋，大萍也。”詳見四葉菜條。

【大麥苺】插田泡(薔薇科) *Rubus coreanus* Miq. 名見《花鏡》西國草條。詳見烏蘆條、藪葢條。

【大救駕】石胡荽(菊科) *Centipeda minima* (L.) A. Br. et Aschers. 名見《植物名實圖考》卷一六。詳見鵝不食草條、天胡荽條。

【大眼桐】臭椿(苦木科) *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle 名見《本草綱目》。詳見樗條。

【大巢菜】救荒野豌豆(豆科) *Vicia sativa* L. 名見《廣群芳譜》。詳見薇條。

【大葉冬藍】馬藍(爵牀科) *Strobilanthes cusia* (Nees) O. Kuntze 名見《爾雅》。詳見板藍條。

【大葉楊】山楊(楊柳科) *Populus davidiana* Dode《植物名實圖考》卷三五白楊：“白楊，《唐本草》始著錄。北地極多，以爲梁棟，俗呼大葉楊。”詳見白楊條。


【大葉櫟】柞櫟(殼斗科) *Quercus dentata* Thunb.《本草綱目》卷三〇櫟實：“櫟有二種：一種叢生小者名枹(音孚)，見《爾雅》。一種高者名大葉櫟。樹、葉俱似栗，長大粗厚，冬月凋落。三四月開花亦如栗，八九月結實似橡子而稍短小，其

蒂亦有斗。其實僵澀味惡，荒歲人亦食之。”詳見樸櫟條。

【大椒】花椒(芸香科) *Zanthoxylum bungeanum* Maxim.《爾雅》：“檓，大椒。”郭注云：“今椒樹，叢生實大者，名爲檓。”陶弘景云：“秦椒今從西來，形似椒而大，色黃黑，味亦頗有椒氣，或呼爲大椒。”詳見檓條。

【大棗】棗(鼠李科) *Ziziphus Jujuba* Mill.《本草經》：“大棗，味甘，平。主治心腹邪氣，安中養脾，助十二經，平胃氣，通九竅，補少氣少津液，身中不足，大驚，四肢重。”詳見木蜜條。

【大順筋藤】白背牛尾菜(百合科) *Smilax nipponica* Miq. 白背牛尾菜又稱牛尾菜。《植物名實圖考》卷二一大順筋藤：“大順筋藤生長沙嶽麓。綠莖赭節，弱蔓細圓。長葉寸許，本寬腰細，近梢長勻出尖，面黃綠，背青白，有直紋數縷。”白背牛尾菜學名中的 *Smilax* 來自[希] *smilax*，菝葜的古名；*nipponica* 意指日本



大順筋藤(白背牛尾菜)

的。白背牛尾菜是多年生草本，攀援狀。莖長20~100厘米，中空，無刺；葉卵形，長圓狀卵形至卵狀披針形，長4~20厘米，寬2~14厘米，先端漸尖，基部淺心形或近圓形，下面蒼白色常具微柔毛，葉柄基部至近中部具捲鬚2根；花序傘形，腋生，花被6片，綠黃色或白色，盛開時向外反折，雄花有雄蕊6，雌花有退化雄蕊，子房毬形，柱頭3裂；漿果毬形，黑色。生於山坡、林緣或林內。我國大部分地區均有分佈。根狀莖用來作舒筋活血的草藥。

【大蒜】蒜(百合科) *Allium sativum* L. 《植物名實圖考》卷三蒜：“蒜，《別錄》下品；葫，《別錄》下品。小蒜爲蒜，大蒜爲葫，諸家說同。”詳見葫條。

【大椿】南天竹(小檗科) *Nandina domestica* Thunb. 《花鏡》卷三南天竹：“南天竹一名大椿。吳楚山中甚多。”詳見藍田竹條。

【大肚子】檳榔(棕櫚科) *Areca catechu* L. 《植物名實圖考》卷三二檳榔：“檳榔，《別錄》中品，大肚子。《開寶本草》始著錄，皆一類而大腹，皮入藥。”詳見仁頻條。

【大蓼】紅蓼(蓼科) *Polygonum orientale* L. 《本草綱目》卷一六葍草：“陳藏器解云：天蓼即水葍，一名游龍，一名大蓼。”詳見鴻藹條。

【大適】葍蘆(十字花科) *Draba nemorosa* L. 名見《本草經》。詳見葍條、大室條。

【大葍】葍(十字花科) *Thlaspi arvense* L. 《本草經》：“葍子，味辛，微溫，無毒。主明目，目痛淚出，除痹補五臟，益精光。久服輕身不老。一名葍葍，一名大葍，一名馬辛。生山澤。”詳見遏藍菜條。

【大薊】薊(菊科) *Cirsium japonicum*

Fisch. ex DC. 《植物名實圖考長編》卷九小薊：“陶隱居云：大薊是虎薊，小薊是貓薊，葉並多刺相似……大薊根甚療血，亦有毒。”詳見鷄脚刺條。

【大樹波羅】木波羅(桑科) *Artocarpus heterophyllus* Lam. 名見《花鏡》卷四波羅蜜。詳見波羅蜜條。

【大頭菜】芥菜(十字花科) *Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss. 《植物名實圖考》卷三芥：“然老圃所常藝者兩種耳：其科(棵)大根小曰辣菜，根大葉瘦曰芥圪答，亦曰大頭菜。”詳見芥條。

【大澤蘭】佩蘭(菊科) *Eupatorium fortunei* Turcz. 《本草綱目》卷一四蘭草：[釋名]大澤蘭等，並曰：“雷斅《炮炙論》所謂大澤蘭，即蘭草也；小澤蘭，即澤蘭也。”詳見蘭條。

【大薺】薺(十字花科) *Thlaspi arvense* L. 《爾雅》：“薺，大薺。”郭璞注：“似薺細葉，俗呼曰老薺。”《名醫別錄》：“無毒，療心腹腰疼。一名大薺，生咸陽山澤及道旁。”詳見遏藍菜條。

【大翹】連翹(木犀科) *Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl. 連翹又稱異翹、蘭華等。《唐本草》：“連翹有兩種，大翹，小翹。大翹葉狹長，如水蘇，花黃可愛，生下濕地，著子似精實之未開者，作房翹出衆草。其小翹生崗原之上，葉花實皆似大翹而小細，山南人並用之。今京下惟用大翹子，不用莖花也。”《本草圖經》：“連翹，今近京及河中、江寧府、澤、潤、淄、兗、鼎、宏、利州，南康軍皆有之。有大翹、小翹兩種。(大翹)生下濕地或山崗上。葉青黃而狹長。莖赤色，高三四尺許。花黃可愛，秋結實似蓮，作房翹出衆草，以此得名。”連翹學名中的 *Forsythia* 爲連翹屬；*suspensa* 意指懸垂的，意指連翹枝懸垂狀。連翹爲落葉灌木。莖中空；單葉或三出復葉對生；花先葉開放，黃色；蒴果，種子多數。生於山野荒

坡。全國大部分地區有分佈。全草均入藥。



大翹(連翹)

【大藍】馬藍(爵牀科) *Strobilanthes cusia* (Nees) O. Kuntze 名見劉禹錫《傳信方》。詳見板藍條。

【大藍】菘藍(十字花科) *Isatis indigotica* Fortune 《救荒本草》卷一大藍：“大藍，生河內平澤，今處處有之。人家園圃中多種，苗高尺餘……其子黑色，本草謂菘藍，可以為靛染青，以其葉似菘菜故名菘藍。”詳見藍條。

【大蟲杖】虎杖(蓼科) *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. 名見《本草綱目》。詳見苦杖條。

【大顛茄】洋金花(茄科) *Datura metel* L. 名見《生草藥性備要》。詳見曼陀羅條。

【大蘭】瞿麥(石竹科) *Dianthus superbus* L. 名見《名醫別錄》。詳見蘧麥條。

【丈菊】向日葵(菊科) *Helianthus annuus* L. 《植物名實圖考》卷二九丈菊：“丈菊一名迎陽花，莖長丈餘，幹堅粗如竹，葉類麻多直生，雖有傍枝，只生一花，大如盤盂……按此花向陽，俗間遂通呼向日葵。”詳見西蕃葵條。

【上黨人參】黨參(桔梗科) *Codonopsis*

pilosula (Franch.) Nannf. 黨參又稱黃參、獅子頭參等。《本經逢原》：“上黨人參，雖無甘溫峻補之功，却有甘平清肺之力，亦不似沙參之性寒專泄肺氣也。”黨參學名中的 *Codonopsis*，黨參屬，來自希臘語 *kodon*(鐘)和 *opsis*(模樣)，意指黨參的花似鐘形；*pilosula*，疏柔毛的，意指該植物具柔毛。黨參是多年生草本植物。根長圓柱形，直徑1~1.5厘米，頂端有膨大的根頭；具多數瘤狀的痕，外皮乳黃色至淡灰棕色，有縱橫皺紋；莖纏繞，長而多分枝；葉對生、互生或假輪生；花單生，具細花梗；蒴果圓錐形，有宿存花萼，種子褐色，有光澤。生於山地灌木叢及林緣，分佈於東北及河北、河南、山西、陝西、甘肅、內蒙古、青海等地。根入藥，具有補中、益氣、生津之功效。



上黨人參(黨參)

【山大丹】馬纓丹(馬鞭草科) *Lantana camara* L. 馬纓丹又稱大紅繡毬、珊瑚毬、龍船花。《植物名實圖考》卷三〇馬纓丹：“《南越筆記》，馬纓丹，一名山大丹……”又：“有以大紅繡毬名之者。又以其瓣落而枝矗起槎枒，甚與珊瑚柯條相似，又名珊瑚毬。”又：“按馬纓丹又名龍船花。以花盛開時值競渡，故名。”馬纓丹學名中的 *Lantana* 來自莢蒾屬植物的

種加詞；*camara* 意指馬纓丹。馬纓丹是直立或蔓性的灌木，有強烈氣味。莖枝均呈四方形，稍被毛，通常有短而倒鈎狀刺；單葉對生，卵形至卵狀長圓形，長3~9厘米，寬1.5~5厘米，先端短漸尖，基部闊楔形，邊緣有鈍齒，表面有粗糙的皺紋和短刺毛，頭狀花序稠密，花冠粉紅色，紅色、黃色或橙紅色，長約1厘米，雄蕊4；核果球形，成熟時紫黑色，野生於村落旁或栽培於庭園。分佈廣東、廣西、福建等地。花美麗供觀賞，根、葉、花亦供藥用。



山大丹(馬纓丹)

【**山大豆根**】越南槐(豆科) *Sophora tonkinensis* Gagnep. 名見《經驗方》。詳見山豆根條。

【**山大黃**】酸模(蓼科) *Rumex acetosa* L. 《本草拾遺》：“酸模葉酸美，小兒折食其英。根主暴熱腹脹，生搗絞汁服，當下痢，殺皮膚小蟲。葉似羊蹄，是山大黃，一名當藥。”詳見酸母條。

【**山五甲**】白芎(五加科) *Acanthopanax trifoliatum* (L.) Merr. 名見《草木便方》。詳見五加條。

【**山牛蒡**】薊(菊科) *Cirsium japonicum* Fisch. ex DC. 名見《日華本草》。詳見馬薊條、鷄脚刺條。


【**山丹**】渥丹(百合科) *Lilium concolor*

Salisb. 名見《廣群芳譜》。詳見中庭花條。

【**山玉竹**】玉竹(百合科) *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce 名見《鐵嶺縣誌》。詳見葳參條。

【**山石榴**】金櫻子(薔薇科) *Rosa Laevigata* Michx. 名見《廣群芳譜》。詳見金櫻子條。

【**山石榴**】杜鵑花(杜鵑花科) *Rhododendron simsii* Planch. 杜鵑花又稱山躑躅、映山紅、紅躑躅等。《廣群芳譜》卷三九杜鵑：“[本草]杜鵑花，一名紅躑躅，一名山石榴，一名映山紅，一名山躑躅。處處山谷有之。”杜鵑花學名中的 *Rhododendron* 來自[希]rhodon(紅色)+dendron(樹木)，此為杜鵑花屬；*simsii* 指[英]J. sims 氏的。杜鵑花是半常綠或落葉灌木，高2米左右。枝條細而直，分枝多，密被亮棕色或褐色平伏硬毛；葉紙質，卵狀橢圓形或倒卵形，長2~6厘米，寬1~3厘米；花2~6朵簇生枝端，花冠闊漏斗形，鮮紅色、玫瑰色或深紅色；蒴果卵圓形，長5~8毫米，密被硬毛。產於我國長江以南各地。生丘陵地疏灌叢中、山坡上或栽培於庭園內，是一種美麗而常見的觀賞植物。根和莖葉供藥用，有清熱解毒、止血和血、祛風止痛等功



山石榴(杜鵑花)

用。

【**山地栗**】土茯苓(百合科) *Smilax glabra* Roxb. 名見《本草綱目》。詳見土革藤條。

【**山芋**】薯蕷(薯蕷科) *Dioscorea opposita* Thunb. 《本草綱目》卷二七薯蕷：“[吳普曰]薯蕷，一名藟薯，一名兒草，一名修脆。齊、魯名山芋，鄭、越名土藟，秦、楚名玉延。”詳見薯蕷條。

【**山西胡麻**】亞麻(亞麻科) *Linum usitatissimum* L. 《植物名實圖考》卷二：“山西胡麻：胡麻，山西、雲南種之爲田。”詳見鴉麻條。

【**山羊蹄**】酸模(蓼科) *Rumex acetosa* L. 《本草綱目》卷十九酸模：“[釋名]：山羊蹄、山大黃、飡蕪、酸母、菝、當藥。[時珍曰]飡蕪乃酸模之音轉，酸模又酸母之轉，皆以味而名，與三葉酸母草同名。掌禹錫以飡蕪爲蔓菁菜，誤矣。”詳見酸母條。

【**山豆根**】越南槐(豆科) *Sophora tonkinensis* Gagnep. 越南槐又稱黃結、解毒、中藥、山大豆根等。《本草綱目》卷一八山豆根條：“山豆根”又稱“解毒、黃結、中藥。[頌曰]其蔓如大豆，因以爲名”。



山豆根(越南槐)

越南槐學名中的 *Sophora* 爲阿拉伯語 *sophera* 的植物原名，現爲槐屬屬名；*tonkinensis* 意爲東京的(指越南)。越南槐爲灌木，直立或平卧，高 1~2 米。根黃褐色；莖圓柱形，有毛，具溝槽；單數羽狀復葉，互生，小葉 11~17 枚，卵形或矩圓狀卵形，長 1~2.5 厘米，全緣，被短毛；總狀花序頂生，萼鐘狀被毛，蝶形花冠，黃白色，子房密生柔毛；莢角紫黑色，長 2~5 厘米，串珠狀；種子 3~5 枚。生於石山脚下或巖縫中。我國南部有分佈。根藥用，有清熱解毒、消腫止痛之效。

【**山茄子**】洋金花(茄科) *Datura metel* L. 名見《廣群芳譜》。詳見曼陀羅條。


【**山粉榆**】大果榆(榆科) *Ulmus macrocarpa* Hance 《說文》云：“榎，山粉榆也，有束莢可爲蕪蕒者。”詳見莢蕒條。

【**山金柑**】金豆(芸香科) *Fortunella venosa* (Champ. ex Benth.) Huang 名見《本草綱目》。詳見山金橘條。

【**山金柑**】金橘(芸香科) *Fortunella margarita* (Lour.) Swingle 《植物名實圖考長編》卷一六金橘：“韓彥直《橘譜》云：又有山金柑，一名山金橘，俗名金豆，木高尺許，實如櫻桃，內止一核，俱可蜜漬，香味甚美。以上諸說，皆指今之金橘，但有一類數種之異耳。”詳見盧橘條。

【**山金橘**】金豆(芸香科) *Fortunella venosa* (Champ. ex Benth.) Huang 金豆又稱山金柑。《本草綱目》卷三〇金橘條在集解中記：“又有山金柑，一名山金橘，俗名金豆。木高尺許，實如櫻桃，內止一核。”金豆學名中的 *Fortunella* 來自英國人名 Fortune+[拉]-ella 小形字尾，此爲金橘屬；*venosa* 意爲有脉的。金豆是小灌木。莖高不超過 1 米，枝幹上有長刺，花枝上有短刺；葉橢圓形，長 4 厘米左右，寬 1~1.5 厘米；單花腋生，常位於葉柄與刺之間，花萼杯狀，5 或 4 裂，淡

綠色，花瓣白色，5數；果圓形或橢圓形，橫徑6~9毫米，果皮熟時橙紅色；種子闊卵形或扁圓形。花期4~5月份，果期11月至翌年1月份。金豆為野生種，生山地，植株矮小，二年生苗高不過30厘米。分佈於福建、江西、湖南（北緯 $25^{\circ}50'$ ~ $27^{\circ}50'$ ）等地。



山金橘(金豆)

【山草】黃茅(禾本科) *Heteropogon contortus* (L.) Beauv. 《植物名實圖考》卷八黃茅條：“黃茅生山崗……河南通呼曰山草，亦曰荒草。”詳見菅根條。

【山茵陳】豬毛蒿(菊科) *Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. 《本草綱目》卷一五：“今山茵陳二月生苗，其莖如艾。其葉如淡色青蒿而背白，葉歧緊細而扁整。九月開細花黃色，結實大如艾子，花實並與庵蒿花實相似，亦有無花實者。”詳見白蒿條。

【山胡椒】草珊瑚(金粟蘭科) *Sarcandra glabra* (Thunb.) Nakai 名見《陸川本草》。詳見接骨木條。

【山扁豆】苳芒決明(豆科) *Cassia sophera* L. 《救荒本草》卷六：“山扁豆生田野中，小科苗高一尺許……”《本草綱目》卷一六決明條：“決明有兩種，一種馬蹄決明……一種苳芒決明，《救荒本草》所

謂山扁豆是也。”苳芒決明學名中的 *Cassia* 源於希臘語 *kassia*，用於樟科的肉桂，後轉用於山扁豆屬名；*sophera* 意為槐狀的。苳芒決明為灌木或半灌木，高1~2米。羽狀復葉，小葉6~10對，卵形至披針形，急尖或漸尖；傘房狀總狀花序有少數花，腋生或頂生；萼片5，花冠黃色；莢果近圓筒形，長7~9厘米，疏生毛；種子卵形，稍扁。生於山坡路旁。我國長江以南各省區有分佈，北部也有栽培。嫩苗葉可食，種子能清熱，根能強壯利尿。含羞草決明(豆科) *Cassia mimosoides* L. 也有山扁豆之稱。



山扁豆(苳芒決明)

【山萆】藁本(傘形科) *Ligusticum sinense* Oliv. 名見《植物名實圖考長編》。詳見山園荜條。

【山萆菜】牛膝(莧科) *Achyranthes bidentata* Bl. 《救荒本草》卷一：“山萆菜，本草名牛膝，一名百倍，俗名脚斯蹬，又名對節菜。”詳見百倍條。

【山荷葉】八角蓮(小檗科) *Dysosma versipellis* (Hance) M. Cheng 名見《本草綱目》。詳見九白條、爵犀條。

【山桂】天竺桂(樟科) *Cinnamomum ja-*


ponicum Sieb. 天竺桂又稱月桂。《本草綱目》卷三四天竺桂：“[集解][珣曰]天竺桂生南海山谷，功用似桂。其皮落，不甚辛烈。[宗奭曰]皮與牡桂相同，但薄耳。[時珍曰]此即今閩、粵、浙中山桂也，而臺州天竺最多，故名。大樹繁花，結實如蓮子狀。天竺僧人稱爲月桂是矣。詳月桂下。”天竺桂學名中的 *Cinnamomum* [希] Kino (卷) + amomos (香味)，是肉桂原名；*japonicum* 日本的。天竺桂是常綠喬木。莖高 10~15 米，枝細弱，圓柱形，紅色，具香氣；葉對生或枝上部互生，卵圓狀長圓形至長圓狀披針形，革質、光亮；圓錐花序腋生，花被筒短錐形，短小，花被裂片 6，卵圓形；果長圓形；果長圓形，長約 7 毫米，寬約 5 毫米，果托淺杯狀。生低山近海林中。分佈江蘇、安徽、福建、臺灣。是香料植物。



山桂(天竺桂)

【山烏龜】金綫吊烏龜(防己科) *Stephania cepharantha* Hayata 金綫吊烏龜又稱白藥等。《植物名實圖考》卷二一金綫吊烏龜：“金綫吊烏龜，江西、湖南皆有之，一名山烏龜。蔓生，細藤微赤。葉如小荷葉而後半不圓，末有微尖，長梗在葉中，似金蓮花葉。附莖開細紅白花，結長圓實，如豆成簇，生青，熟紅黃

色。根大如拳。”金綫吊烏龜學名中的 *stephania* [希] Stephanos 王冠，此爲千金藤屬；*cepharantha* 頭狀花序。金綫吊烏龜是草質落葉藤本。塊根圓錐狀，褐色；莖通常 1~2 米，葉紙質，互生，三角狀近圓形，徑 2~6 厘米，有凸尖，基部近平截，柄長 2~7 厘米，盾狀着生；花單性、雌雄異株，頭狀花序，雄花萼 6~8，花瓣 3~4，雌花萼 1，花瓣 2 或 4；核果闊倒卵形，熟時紅色。生陰濕山坡。分佈於西北至漢中及江南各省。根入藥，清熱解毒，消腫止痛。



山烏龜(金綫吊烏龜)

【山黃楊】黃楊(黃楊科) *Buxus sinica* (Rehd. et wils.) Cheng 名見《履巉巖本草》。詳見黃楊木條。

【山菜】北柴胡(傘形科) *Bupleurum chinense* DC. 名見《廣群芳譜》。詳見地蕪條。

【山梔子】梔子(茜草科) *Gardenia jasminoides* Ellis《植物名實圖考》卷三六山梔子：“滇山梔子生雲南山中。”詳見越桃條。

【山葡萄】蘼蕪(葡萄科) *Vitis adstricta* Hance《唐本草》：“蘼蕪、山葡萄，並堪爲酒。”詳見野葡萄條。

【山蔥】蒼蔥(百合科)*Allium victorialis* L. 蒼蔥又稱隔蔥、鹿耳蔥、野蔥等。《救荒本草》卷八：“山蔥，一名隔蔥，又名鹿耳蔥，生輝縣太行山山野中。葉似玉簪，葉微團，葉中攏葶似蒜，葶甚長而澀，梢頭結葶莖似蔥葶莖，微小，開白花，結子黑色，苗味辣。”蒼蔥學名中的 *Allium*, [拉]植物原名，蔥屬；*victorialis* 勝利的。蒼蔥是多年生草本。具根狀莖，鱗莖近圓柱形，單生或數枚聚生，外皮黑褐色，網狀纖維質；葉 2~3 枚，長 8~20 厘米，寬 3~10 厘米，披針狀矩圓形至寬橢圓形；花葶圓柱狀，高 20~80 厘米，具葉鞘，總苞 2 裂，宿存，傘形花序繖狀，多花，花梗等長，花白色或帶綠色，稀帶紅色，花被 6 片，長 4~6 毫米，橢圓形，子房具 3 圓稜。生於高山陰濕林下、草地、溝邊。分佈於我國東北、華北、四川、湖北、浙江等地。嫩葉可食。



山蔥(蒼蔥)

【山蔥】藜蘆(百合科)*Veratrum nigrum* L. 《植物名實圖考長編》卷一四藜蘆：“《別錄》：苦，微寒，有毒。療咳逆，喉痹不通，鼻中息肉，馬刀爛瘡，不入湯用。一名蔥莖，一名山蔥。”詳見蔥莖條。

【山棘】野薔薇(薔薇科)*Rosa* spp. 名見《本草綱目》。詳見牛勒條、營實條。

【山棗】酸棗(鼠李科)*Ziziphus jujuba* Mill var. *Spinosa* Hu ex H. F. Chou 《本草綱目》卷三六酸棗：“[釋名] 棗、山棗 [藏器曰]……山棗樹如棘，其子如生棗，其核如骨，其肉酸滑好食，山人以當果。”詳見棗棘條。

【山棗】韶子(無患子科)*Nephelium chryseum* Bl. 名見沈懷遠《南越誌》。詳見韶條、石榆子條。

【山棗樹】酸棗(鼠李科)*Ziziphus jujuba* Mill var. *spinosa* Hu ex H. F. Chou 《名醫別錄》：“酸棗生河東川澤。八月採實，陰乾，四十日成。陶隱居云：今出東山間，云即山棗樹……”詳見棗棘條。

【山絲苗】大麻(桑科)*Cannabis sativa* L. 《救荒本草》卷七山絲苗：“本草有麻賁，一名麻勃，一名苧，一名麻母，生泰山川谷，今皆處處有之。”詳見火麻條。

【山蒜】薤白(百合科)*Allium macrostemon* Bunge 《植物名實圖考》卷三山蒜：“山蒜，《爾雅》：薤，山蒜，《本草拾遺》始著錄，《救荒本草》：澤蒜，又曰小蒜。黃帝登嵩山得蒜，其說近創，然京口之山，以蒜得名，則軒轅所歷，無妨以薤名矣。”詳見薤條。

【山蒲桃】蓼莢(葡萄科)*Vitis adstricta* Hance 《本草拾遺》：“蓼莢是山蒲桃，砍斷藤吹氣出一頭如通草。”詳見野葡萄條。

【山椿】臭椿(苦木科)*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle 名見《本草拾遺》。詳見樗條。

【山榆】大果榆(榆科)*Ulmus macrocarpa* Hance 《廣雅》：“山榆，母姑也。”詳見苾莢條。

【山園蓼】藁本(傘形科)*Ligusticum sinense* Oliv. 藁本與數種同屬植物又稱

藁芩、鬼卿、地新、微莖、山茛、葎香。
 《植物名實圖考長編》卷一二藁本：“《救荒本草》：藁本今衛輝輝縣栲栳圈山谷間有之。俗名山園芩。苗高五七寸。”
 《廣雅疏證》：山茛，葎香，藁也。”藁本學名中的 *Ligusticum* 意指地名古代意大利 Liguria 利古里亞地方；*sinense* 意指中國的。藁本是多年生草本，高達 1 米。根狀莖發達，具膨大的結節；莖直立，中空，表面有縱直溝紋；基生葉具長柄，柄長可達 20 厘米，葉片三角形，長 8~15 厘米，二回三出式羽狀全裂，最終裂片 3~4 對，卵形，上面葉脈上有乳頭狀突起，邊緣具不整齊的羽狀深裂，莖上部的葉具擴展的葉鞘；復傘形花序，總苞片羽狀細裂，傘幅 14~30，小苞片綫形，較小傘梗為短，花白色；雙懸果廣卵形，稍側扁。生於溝邊草叢中。分佈於河南、陝西、甘肅、江西、湖南、湖北、四川等省。根莖及根供藥用。



山園芩(藁本)

【山裏果】山楂(薔薇科) *Crataegus pinnatifida* Bge. 名見《廣群芳譜》。詳見猴棗條。

【山裏紅】山楂(薔薇科) *Crataegus pinnatifida* Bge. 王璆《百一選方》：“山裏紅

果，俗名酸棗，又名鼻涕團。正合此義矣。”詳見猴棗條。

【山慈姑】黃獨(薯蕷科) *Dioscorea bulbifera* L. 黃獨又稱金綫吊蝦蟆、土卵、黃藥子、木藥子、大苦、赤藥、紅藥子、黃藥。《植物名實圖考》卷一九山慈姑：“山慈姑，江西、湖南皆有之，非花葉不相見者。”又：“建昌土醫呼為金綫吊蝦蟆



山慈姑(黃獨)

……”黃獨學名中的 *Dioscorea* 來自人名 A. D. Dioscorides(希), *bulbifera* 意指生有鱗莖的。黃獨是纏繞草質藤本。塊莖卵圓形或梨形，直徑 4~10 厘米，棕黑色，表面密生鬚根，莖左旋，葉腋內有紫棕色，毬形或卵圓形珠芽；單葉互生，葉片寬心狀卵形，頂端尾狀漸尖，邊緣全緣或微波狀，兩面光滑無毛；雄花序穗狀下垂，常數個叢生於葉腋，花基部有卵形苞片 2 枚，花被 6 片，紫色，雄蕊 6 枚，雌花序與雄花序相似，雌花有退化雄蕊 6 枚；蒴果反折下垂，三稜狀長圓形。生於山谷、河岸、路旁。分佈於西南、華南、華中、華東、臺灣、陝西。塊莖、珠芽供藥用。

【山慈菰】山慈姑(百合科) *Iphigenia*

indica Kunth 名見《花鏡》。詳見金燈花條。

【山辣】山柰(薑科) *Kaempferia galanga* L. 名見《本草綱目》。詳見三賴條。

【山韶子】韶子(無患子科) *Nephelium chryseum* Bl. 《植物名實圖考》卷三二韶子：“韶子，《本草拾遺》始著錄，《虞衡誌》謂之山韶子。俗呼毛荔支，謂荔支子變種，味酸。”詳見韶條。

【山精】蒼朮(菊科) *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC. 名見《本草綱目》。詳見赤朮條。

【山漆】三七(五加科) *Panax pseudo-ginseng* Wall. var. *notoginseng* (Burkill) Hoo & Tseng 三七又稱金不換。《本草綱目》卷一二三七：“[時珍曰]彼人言其葉左三右四，故名三七，蓋恐不然。或云本名山漆，謂其能合金瘡，如漆黏物也，



山漆(三七)

此說近之。金不換，貴重之稱也。”三七學名中的 *Panax* 來自[拉] *panax*，萬能藥，此為人參屬。三七是多年生草本，高達30~60厘米。根莖短，具有老莖殘留痕迹；根粗壯肉質，長2~5厘米，直徑1~3厘米；莖綠色或帶多數紫色縱條紋；掌狀復葉，3~4枚輪生於莖端，小葉3~7片，小葉片長圓形至倒卵狀長圓形；傘形花序有80~100朵或更多的花；花萼5齒裂，花瓣5，黃綠色，雄蕊5，子房下位，2室，花柱2枚；核果漿果狀，熟時紅色。栽培或野生於山坡林陰下，栽培於雲南、廣西。根、葉、花供藥用。

【山樗】野鴉椿(省沽油科) *Euscaphis japonica* (Thunb.) Dippel 名見《本草綱目》。詳見樗條。

【山豬糞】土茯苓(百合科) *Smilax glabra* Roxb. 名見《本草綱目》。詳見土草薺條。

【山薑】杜若(鴨跖草科) *Polia japonica* Thunb. 名見《本草綱目》、《圖經本草》。詳見若芝條。

【山薤】毬序韭(百合科) *Allium thunbergii* G. Don 毬序韭又稱天薤、山薤、野薤、野薑頭、勤等。《本草綱目》卷二六薤條中提及山薤：“《爾雅》云：勤，山薤也。生山中，莖葉與家薤相類，而根差長，葉差大，僅若鹿蔥，體性亦與家薤同。”毬序韭學名中的 *Allium* [拉]，植物原名，葱屬；*thunbergii* 來自瑞典 C. P. Thunberg 氏。毬序韭是多年生草本。鱗莖常單生，卵形至狹卵形，外皮污黑或黑褐色，紙質，內皮膜質，有時帶淡紅色；葉條形，中空，具三稜，短於或略長於花葶；花葶圓柱形，中空，高30~70厘米，總苞單側開裂或2裂，宿存，毬形傘狀花序，多花，花紅色至紫色，花被片橢圓形至卵狀橢圓形，先端鈍圓，花絲等長，錐形，無齒，子房倒卵狀毬形。本種與薑頭(*A. chinense*)外形相似，但薑頭花序葶側生，

葉具3~5稜。生山坡、林緣。古代入藥，今人少用。



山薤(球序韭)

【山薯】薯蕷(薯蕷科) *Dioscorea opposita* Thunb. 名見《本草綱目》。詳見薯蕷、土薯條。

【山薊】蒼朮(菊科) *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC. 名見《本草綱目》。詳見赤術條。

【山橘】金橘(芸香科) *Fortunella margarita* (Lour.) Swingle 名見《北戶錄》。詳見盧橘條。

【山鞠藭】川芎(傘形科) *Ligusticum chuanxiong* Hort. 川芎又稱芎藭、香果、胡藭、苕藭、藤蕪、江離、薇蕪、藭菜、坎菜、馬銜芎藭、雀腦芎、京芎、西芎、臺芎、撫芎等。《廣群芳譜》卷九五：“芎藭，一名香果，一名山鞠藭。”川芎學名中的 *Ligusticum*，來自地名，古代意大利 *liguria* 利古里亞地方，此為藭本屬。川芎是多年生草本。根狀莖呈不規則的結節狀拳形團塊，黃褐色；莖直立，圓柱形，中空，上部分枝，基部的節膨大成盤狀，中部以上的節不膨大；葉互生，2~3回單數羽狀復葉，小葉3~5對，邊緣成不整

齊羽狀全裂或深裂；復傘形花序生於分枝頂端，花瓣5，橢圓形，白色；雙懸果卵形，有銳稜。分佈於四川、雲南、貴州、陝西、甘肅等省。多為栽培。根莖入藥，治風冷頭痛旋暈、難產、月經不調、肋痛腹疼、癰疽瘡瘍等症。



山鞠藭(川芎)

【山斂】陽桃(酢漿草科) *Averrhoa carambola* L. 名見《南越筆記》。詳見洋桃條、五斂子條。

【山藥】薯蕷(薯蕷科) *Dioscorea opposita* Thunb. 《爾雅翼》：“唐代宗諱預，故呼薯蕷。至本朝，又諱上字，故今人呼為山藥。”詳見薯蕷條。

【山藥蛋】陽芋(茄科) *Solanum tuberosum* L. 《植物名實圖考》卷六陽芋：“山西種之為田，俗呼山藥蛋，尤碩大，花色白。聞終南山岷，種植尤繁，富者歲收數百石云。”詳見土芋條。

【山瞿麥】瞿麥(石竹科) *Dianthus superbus* L. 名見《千金方》。詳見蓮麥條。

【山蘄】當歸(傘形科) *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels 《植物名實圖考長編》卷一一當歸：“《廣雅》曰：山蘄，當歸也。當歸今似蘄而蘄大。”《廣群芳譜》卷九五當歸：“當歸，一名文無……一名山蘄。”詳見文無條。

【山躑躅】杜鵑花(杜鵑花科) *Rhododendron simsii* Planch. 《本草綱目》卷一七山躑躅：“[時珍曰]處處山谷有之。……一名紅躑躅，一名山石榴，一名映山紅，一名杜鵑花。”詳見山石榴條。

【山鷄茶】草珊瑚(金粟蘭科) *Sarcandra glabra* (Thunb.) Nakai 名見《陸川本草》，並曰：“接骨，破積，止痛。治跌打骨折，損傷腫痛，風濕骨痛，爛瘡，毒蛇咬傷。”詳見接骨木條。

【山薺】毬序韭(百合科) *Allium thunbergii* G. Don 名見《爾雅翼》。詳見山薺條、薺條。

【千心妓女】地膚(藜科) *Kochia scoparia* (L.) Schrad. 名見《土宿本草》和《植物學大辭典》。《本草綱目》卷一六地膚：“[時珍曰]地膚、地麥，因其子形似也。地葵，因其苗味似也。鴨舌因其形似也。妓女，因其枝繁頭多也。益明，因其子功能明目也。子落則老，莖可為帚，故有帚、蓍諸名。”詳見地葵條。

【千年艾】綿毛鹿茸草(玄參科) *Monochasma savatieri* Franch. 綿毛鹿茸草又稱千重塔。《植物名實圖考》卷一六鹿茸草：“鹿茸草生山石上。高四五寸，柔莖



千年艾(綿毛鹿茸草)

極嫩，白茸如粉，四面生葉，攢密上抱，葉纖如小指甲。春開四瓣桃紅花，三瓣似海棠花，微尖下垂，一瓣上翕，兩邊交掩，黃心全露。”又《廬山誌》：“千年艾，觸油即萎。此草色白如艾，是矣。”綿毛鹿茸草學名中的 *Monochasma*，鹿茸草屬，來自希臘語 *monos*(單一的)和 *chasme*(開口)，意指綿毛鹿茸草的蒴果僅背面單向室背開裂。綿毛鹿茸草是二年生草本植物。高 15~30 厘米，全株具銀白色柔毛，莖叢生；葉片披針形；花淡紅色；蒴果。生於巖石上或乾爽地區。分佈於長江以南各地。全草入藥，治感冒、咳嗽等疾病。

【千年健】大血藤(木通科) *Sargentodoxa cuneata* (Oliv.) Rehd. et Wils. 名見《簡易草藥》。詳見血藤條。

【千年棗】海棗(棕櫚科) *Phoenix dactylifera* L. 《本草綱目》卷三一無漏子：“[釋名]千年棗、萬年棗、海棗、波斯棗、番棗、金果、木名海棕、鳳尾蕉[時珍曰]無漏，名義未詳。千年、萬歲，言其樹性耐久也。”詳見無漏子條。

【千年矮】黃楊(黃楊科) *Buxus sinica* (Rehd. et Wils.) Cheng 名見《分類草藥性》。詳見黃楊木條。

【千年潤】石斛屬(蘭科) *Dendrobium* spp. 《本草綱目》卷二〇：“石斛叢生石上。其根糾結甚繁，乾則白軟。其莖葉生皆青色，乾則黃色。開紅花。節上自生根鬚。人亦折下，以砂石載之，或以物盛挂屋下，頻澆以水，經年不死，俗稱千年潤。石斛短而中實，木斛長而中虛，甚易分別。處處有之，以蜀中者為勝。”詳見石薺條。

【千里及】千里光(菊科) *Senecio scandens* Buch. — Ham. 《植物名實圖考》卷二〇：“千里及，《本草拾遺》始著錄。《圖經》千里光、千里及，形狀如一。李時珍併之，良是。”詳見九里明條。

【千里急】千里光(菊科) *Senecio scandens* Buch. - Ham. 《植物名實圖考長編》卷一〇千里及：“李時珍以千里光、千里急併為一種，極確。”詳見九里明條。

【千兩金】續隨子(大戟科) *Euphorbia lathyris* L. 名見《日華本草》。詳見千金子條、菩薩豆條。


【千兩金】淫羊藿(小檗科) *Epimedium grandiflorum* Morr. 《本草綱目》卷一二淫羊藿：“[時珍曰]豆葉曰藿，此葉似之，故亦名藿。仙靈脾、千兩金、放杖、剛前，皆言其功力也，鷄筋、黃連祖，皆因其根形也。”詳見剛前條。

【千金子】續隨子(大戟科) *Euphorbia lathyris* L. 《廣群芳譜》卷九七續隨子：“[本草綱目]續隨子，一名千金子，一名千兩金，一名菩薩豆，一名拒冬，一名聯步。”詳見菩薩豆條。

【千金草】佩蘭(菊科) *Eupatorium fortunei* Turcz. 《本草綱目》卷一四蘭草：[釋名]千金草等，並曰：“惟虛谷方回考證，極言古之蘭草即今之千金草，俗名孩兒菊者，其說可據。”詳見蘭條。

【千金菜】萵苣(菊科) *Lactuca sativa* L. 萵苣又稱萵菜、萵笋、金盞花。《植物名實圖考長編》卷五萵苣：“《清異錄》：高國使者來漢，隋人求得菜種，酬之甚厚。故因名千金菜，今萵苣也。”萵苣學名中的 *Lactuca*，[拉] *Lac* (乳汁)，此為萵苣屬；*sativa* 栽培的。萵苣是一年生或二年生草本。莖直立，高 30~100 厘米，嫩時棒狀，肥大如笋；基生葉叢生，長橢圓形或舌形，全緣或邊緣皺折，莖生葉互生，橢圓形或三角狀卵形，基部心形抱莖；頭狀花序生莖枝頂端，排成傘房狀圓錐花序，舌狀花黃色，舌片先端 5 裂；瘦果卵形，扁平，每面有多條縱稜，灰色、肉紅色與褐色，喙細長，冠毛白色。全國廣為栽培，亦有野生。變種很多，如生菜

(var. *romana* Hort.)，古稱白苣、石苣，今又稱勝菜。全草及種子入藥，通乳、利小便等。




千金菜(萵苣)

【千重塔】綿毛鹿茸草(玄參科) *Monochasma savateiri* Franch. 《植物名實圖考》卷一六千層塔：“千重塔，江西山中近石處皆有之。細莖密葉，叢生，高五六寸。葉微似落帚而短，稍寬。土人云：同蝶蚌肉煎水服，治咳嗽。”詳見千年艾條。

【千歲子】落花生(豆科) *Arachis hypogaea* L. 《南方草木狀》：“千歲子，有藤蔓出土，子在根下……”詳見長生菓條。

【千歲藥】葛藟(葡萄科) *Vitis flexuosa* Thunb. 葛藟又稱藟、纒、苣瓜、巨苣、推藟、推藥、藥蕪、巨荒、常春藤等。《詩經·周南》：“南有樛木，葛藟纒之。”《本草綱目》卷一八千歲藥：“[釋名]藥蕪、苣瓜[藏器曰]此藤冬只凋葉，大者盤薄，故曰千歲藥。”葛藟學名中的 *Vitis* 是指藤蔓，葡萄屬；*flexuosa* 蜿蜒狀的。葛藟是木質藤本。莖細長，圓柱形，幼枝有繡色絨毛，後變無毛；葉互生，闊卵形或三角形卵形，長 5~10 厘米，寬 4~9 厘米，先端尖，基部心形，緣有不等的波狀淺齒；圓錐花序細長，長 5~14 厘米，花小，花瓣 5，黃綠色，花冠作帽狀脫落；漿果毬形，黑色，



千歲藥(葛藟)

直徑約 8 毫米，種子 2~3 粒。生山地灌叢及林緣。分佈在雲南、四川、陝西、湖南、湖北、安徽、江西、浙江、廣西、廣東、山東等地。根、莖、果藥用，治關節酸痛，種子可榨油。

【千層塔】羅勒(唇形科) *Ocimum basilicum* L. 名見《嶺南採藥錄》。詳見翳子草條、香花子條。

【千鍼草】薊(菊科) *Cirsium japonicum* Fisch. ex DC. 名見《本草綱目》。詳見馬薊條、鷄脚刺條。

【千鍼草】刺兒菜(菊科) *Cirsium setosum* (Willd.) MB. 名見《救荒本草》。詳見刺薊菜條、小薊條。

【川椒】花椒(芸香科) *Zanthoxylum bungeanum* Maxim. 名見《本草綱目》。詳見檉條、蜀椒條。

【川草花】萱草(百合科) *Hemerocallis fulva* L. 《救荒本草》卷一萱草花：“俗名川草花，本草一名鹿葱，謂生山野花名宜男。”詳見謏草條。

【川烏】烏頭(毛茛科) *Aconitum carmichaeli* Debx. 名出《金匱要略》。《本草綱目》卷一七：“烏頭有兩種，出彰明者即附子之母，今人謂之川烏頭是也。”詳見

烏喙條。

【川強羅】山丹(百合科) *Lilium pumilum* DC. 名見《通誌》。詳見紅百合條。

【川彈子】龍眼(無患子科) *Dimocarpus longan* Lour. 名見《清異錄》。詳見益智條。

【夕句】夏枯草(唇形科) *Prunella vulgaris* L. 夏枯草又名乃東、燕面、麥穗夏枯草、麥夏枯、鐵綫夏枯草、鐵色草等。《神農本草經》卷中：“夏枯草，味苦辛寒。主治寒熱瘰癧，鼠瘻頭瘡，破症，散癭結氣，脚腫濕痺。輕身。一名夕句，一名乃東。生川谷。”夏枯草的學名中 *Prunella* 來自於德文，意為小扁桃腺炎；種加詞 *vulgaris* 意為普通的。夏枯草為多年生上昇草本。莖高 10~30 厘米，被稀疏的糙毛或近無毛，鈍四稜形，紫紅色；葉柄長 0.7~2.6 厘米，葉片卵狀短圓形或卵形，長 1.5~6 厘米。頂生輪傘花序密集排列成長 2~4 厘米的假穗狀花序，苞片心形，具驟尖頭，花萼鐘狀，長 10 毫米，二唇形，上唇扁平，頂端幾截平，有 3 個不明顯的短齒，中齒寬大，下唇 2 裂，裂片披針形，果時花萼由於下唇 2 齒斜伸而閉合，花冠紫、藍紫或紅紫色，長約 13 毫米，下唇中裂片寬大，邊緣具流蘇狀小裂片，上唇近圓形，為下唇約 2 倍，花絲



夕句(夏枯草)

二齒，一齒具藥；小堅果黃褐色，長圓狀卵珠形，長 1.8 毫米，寬約 0.9 毫米，微具溝紋。花期 4~6 月份，果期 7~10 月份。生於荒坡、草地、溪邊及路旁等濕潤地上。幾產全國各地。全株入藥，治目珠夜痛、消散癰癤、手足周身節骨酸疼。

【勺藥】芍藥(毛茛科) *Paeonia lactiflora* Pall. 《本草經》：“芍藥，味苦。主治邪氣腹痛，除血痺，破堅積寒熱疝瘕，止痛，利小便，益氣。”詳見將離條。

【及地果】落花生(豆科) *Arachis hypogaea* L. 名見《植物名實圖考》。詳見長生菓條。

【及瀉】東方澤瀉(澤瀉科) *Alisma orientale* (Sam.) Juz. 《名醫別錄》：澤瀉“一名及瀉。生汝南池澤，五、六、八月採根，陰乾。”詳見水瀉條。

【女里】知母(百合科) *Anemarrhena asphodeloides* Bge. 名見《名醫別錄》。詳見甌母條。

【女青】地梢瓜(蘿摩科) *Cynanchum thesioides* (Freyn) K. Schum. 地梢瓜又稱雀瓢、老鶴瓢等。《本草經》：“女青，味辛，平。主治蠱毒，逐邪惡氣，殺鬼溫瘡，辟不祥，一名雀瓢。”地梢瓜學名中的



女青(地梢瓜)

Cynanchum [希]Kyon(狗)+anchone(絞殺)，此為牛皮消屬；*thesioides* 如百蕊草的。地梢瓜是多年生草本，近半灌木。地下莖單軸橫生，莖直立或斜上，多分枝，密被柔毛，有白色乳汁；葉對生或近對生，條形至綫形，長 3~5 厘米，寬 2~5 毫米，葉背中脉高起；傘形聚傘花序腋生，花萼 5 深裂，被柔毛，花小，綠白色，花冠鐘形，5 裂，副花冠杯形，5 裂；膏莢果紡錘形，先端漸尖，中部膨大，長 6 厘米，徑 2 厘米左右；種子扁平，暗褐色，具絹質種毛。生路旁、荒地。分佈東北、內蒙、華北、西北及安徽、江蘇等地。莖含橡膠、幼果可食。全草及果入藥。

【女兒茶】鼠李(鼠李科) *Rhamnus davurica* Pall. 名見《救荒本草》。詳見牛李條。

【女兒香】土沉香(瑞香科) *Aquilaria sinensis* (Lour.) Gilg 名見《綱目拾遺》。詳見蜜香條。

【女草】玉竹(百合科) *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce 名見《酉陽雜俎》。詳見葳參條。

【女華】菊花(菊科) *Dendranthema morifolium* (Ramat.) Tzvel. 《救荒本草》卷四：“菊花，一名節華，一名日精，一名女節，一名女華，一名女莖，一名更生，一名周盈，一名傅延年，一名陰成。生雍州川澤及鄧、衡、齊州田野，今處處有之。”詳見節華條。

【女莖】菊花(菊科) *Dendranthema morifolium* (Ramat.) Tzvel. 名見《名醫別錄》。詳見女華條、節華條。

【女萎】玉竹(百合科) *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce 《本草綱目》卷一二萎蕤條：“《本經》女萎，乃《爾雅》委萎二字，即《別錄》萎蕤也，上古鈔寫訛為女萎爾。”詳見葳參條。

【女葳】凌霄(紫葳科) *Campsis grandiflora*

flora (Thunb.) Schum. 名見《廣群芳譜》。詳見紫葳條。


【女楨】女貞(木犀科)*Ligustrum lucidum* Ait. 名見《山海經注》。詳見貞木條、楨木條。

【女雷】知母(百合科)*Anemarrhena asphodeloides* Bge. 名見《名醫別錄》。詳見兒草條、甌母條。

【女節】菊花(菊科)*Dendranthema morifolium* (Ramat.) Tzvel. 名見《名醫別錄》。詳見女華條、節華條。

【女蘭】佩蘭(菊科)*Eupatorium fortunei* Turcz. 《本草綱目》卷一四蘭草:[釋名]女蘭等,並曰:“其葉似菊,女子、小兒喜佩之,則女蘭、孩菊之名,又或以此也。”詳見蘭條。

【女蘿】松蘿(松蘿科)*Usnea longissima* Ach. 松蘿又稱松上寄生、藤蘿等。《植物名實圖考》卷二二:“《本草》:松蘿一名女蘿,草木同名,相沿甚多。古詩‘菟絲附女蘿’,此女蘿自是松蘿,非菟絲之一名女蘿也。”松蘿學名中的 *Usnea* 來自阿拉伯語的 *Oshnah*(苔蘚的名字); *longissima* 意為極長的,意指松蘿植物體較長。松蘿植物體呈絲狀,長可達 100 厘米,不分歧,但有細而短的側枝,基部着生於樹皮上,向下垂;全體呈灰綠色,外



女蘿(松蘿)

皮部質粗松,中心質較堅密;子器較少,皿狀,生於枝先端;春秋采收。全國各地均有分佈。多生於山林中陰濕地方,附生於針葉樹上。植物體可入藥,具清肝、化痰、止血、解毒功效,可治療頭痛、目赤、咳嗽、瘧疾、白帶、崩漏、癰腫、毒蛇咬傷等症。此種不是松寄生科的松寄生 [*Taxillus caloreas* (Diels) Danser], 亦不是旋花科的菟絲子 (*Cuscuta chinensis* Lam.)。菟絲子一名女蘿,系傳誤。


【小一枝箭】毛大丁草(菊科)*Gerbera piloselloides* (L.) Cass. 《滇南本草》小一枝箭:“小一枝箭,一名白頭翁。”詳見一枝香條。

【小木奴】金橘(芸香科)*Fortunella margarita* (Lour.) Swingle 《廣群芳譜》卷六五金橘:“一名小木奴。”詳見盧橘條。

【小芒草】狼尾草(禾本科)*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng. 名見《植物名實圖考》。詳見茺草條、稂條。

【小牡丹】朱槿(錦葵科)*Hibiscus rosa-sinensis* L. 名見《兩粵瑣語》。詳見扶桑條。

【小辛】細辛(馬兜鈴科)*Asarum sieboldii* Miq. 細辛又稱細草、少辛等。《本草經》(草部上品):“細辛,味辛,小溫。主治咳逆,頭痛腦動,百節拘攣,風濕痺痛死肌,明目,利九竅。久服輕身延年。一名小辛。生山谷。”細辛學名中的 *Asarum* 來自[希]a(無)+saron(枝),此為細辛屬;*sieboldii* 為[德]Ph. Fr. von Siebold 氏的。細辛是多年生草本。根狀莖直立或橫走,有多條鬚根;葉通常 2 枚,生於莖端,葉片心形或卵狀心形,長 7~14 厘米,寬 4.5~13.5 厘米,先端漸尖或急尖,兩面疏生短柔毛;單花頂生,暗紫色,花被管鐘狀,裂片 3;蒴果肉質,近球形,直徑約 1.5 厘米,棕黃色。分佈在安徽、浙江、江西、湖北和湖南等地。生於山谷間、溪邊



小辛(細辛)

和林下陰濕處。全草入藥，治風冷頭痛、鼻淵、齒痛、痰飲咳逆、風濕痹痛等。細辛屬的其他幾種，例如遼細辛、雙葉細辛等，在形態與功能上均與細辛大同小異，古代典籍中未作具體區別。

【**小青**】鴨跖草(鴨跖草科) *Commelina communis* L.《花鏡》卷五：“淡竹葉，一名小青，一名鴨跖草。”詳見竹葉菜條。

【**小栳**】君遷子(柿科) *Diospyros lotus* L.《廣誌》：“榿棗小栳也，肌細而厚，少核，可以供御。”詳見軟棗條。

【**小苦耽**】苦蕒(茄科) *Physalis angulata* L. 名見《本草綱目》。詳見黃蔞條。

【**小荆**】牡荆(馬鞭草科) *Vitex negundo* L. var. *cannabifolia* (Sieb. et Zucc.) Hand. - Mazz.《本草經》：“蔓荆實，味苦，微寒。主治筋骨間寒熱，濕痹拘攣，明目堅齒，利九竅，去白蟲。久服輕身耐老。小荆實亦等。”《新修本草》：“小荆實，今人呼為牡荆子者是也。”詳見楚條。

【**小草**】遠志(遠志科) *Polygala tenuifolia* Willd.《本草綱目》卷一二遠志：“[時珍曰]此草服之能益智強志，故有遠志之稱。《世說》載郝隆譏謝安云：

處則為遠志，出則為小草。《記事珠》謂之醒心杖。”詳見細草條。

【**小茴香**】茴香(傘形科) *Foeniculum vulgare* Mill.《千金方》：蛇咬久潰“小茴香搗末敷之”。詳見蘘香條。

【**小茴香**】蒔蘿(傘形科) *Anethum graveolens* L. 名見《本草綱目》卷二六蒔蘿條。詳見慈謀勒條。

【**小紅綠豆**】赤小豆(豆科) *Vigna umbellata* (Thunb.) Ohwi et Ohashi. 名見《陸川本草》。詳見赤豆條。

【**小桃紅**】鳳仙花(鳳仙花科) *Impatiens balsamina* L. 鳳仙花又稱海蔘、旱珍珠、染指甲草、好女兒花、羽客、菊婢、急性子、金鳳花、夾竹桃等。《本草綱目》卷一七鳳仙：“[時珍曰]其花頭翹尾足，俱翹翹然如鳳狀，故以名之。女人採其花及葉包染指甲，其實狀如小桃，老則迸裂，故有指甲、急性、小桃諸名。”鳳仙花學名中的 *Impatiens* [希] 意為急躁、不能忍耐，此為鳳仙花屬。鳳仙花是一年生草本，高 40~100 厘米。莖粗壯，肉質，直立；葉互生，披針形，長 4~12 厘米，寬 1~3 厘米，邊緣有銳鋸齒；花兩性，單生或數枚簇生葉腋，花大，粉紅色、紅色、紫色、白色或雜色，單瓣或重瓣；蒴果紡錘形，密被茸毛；種子多數，毬形，黑色。我國大部分地區均有分佈。多栽植於庭院



小桃紅(鳳仙花)

作觀賞用。全草及種子入藥，有活血散瘀、利尿解毒等功能，種子可榨油。

【**小黃楊**】黃楊（黃楊科）*Buxus sinica* (Rehd. et Wils.) Cheng 名見《分類草藥性》。詳見黃楊木條。

【**小萍子**】浮萍（浮萍科）*Lemnaceae* spp. 名見《本草拾遺》。《本草拾遺》：“小萍子是溝渠間者。”詳見紫背浮萍條、青萍條。

【**小茄**】茄（茄科）*Solanum melongena* L. 名見《廣群芳譜》。詳見落蘇條、崑崙瓜條。

【**小甜水茄**】堇堇菜（堇菜科）*Viola japonica* Langsd. 名見《植物名實圖考》。詳見箭頭草條、紫金鎖條。

【**小魚仙草**】石薺萼（脣形科）*Mosla scabra* (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li 石薺萼又稱鬼香油。《植物名實圖考》卷二五石薺萼：“石薺萼，《本草拾遺》始著錄。方莖對節，正似水蘇，高僅尺餘，葉大如指甲，有小毛，滇南呼為小魚仙草。”石薺萼學名中的 *Mosla* 來自（印）植物原名，*scabra* 意指粗糙的。石薺萼是一年生草本，高 20~100 厘米。莖四稜形，被有向下的毛；葉對生，卵形或卵狀披針形，長 1.5~4 厘米，寬 0.8~2 厘米，先



小魚仙草(石薺萼)

端急尖或鈍，基部楔形，邊緣有淺鋸齒，兩面均有金黃色腺點；輪傘花序 2 花，集成間斷的總狀花序，頂生，花萼鐘形，有脈 10 條，花冠粉紅色，長 4~5 毫米，上唇直立，先端微凹，下唇 3 裂，雄蕊 4，前對退化，花柱相等 2 淺裂；小堅果近於圓形，黃褐色。生於山坡樹叢下及溝旁。分佈山西、山東、江蘇、四川、福建等地。全草供藥用。

【**小巢菜**】硬毛果野豌豆（豆科）*Vicia hirsuta* (L.) S. F. Gray 名見《本草綱目》。詳見翹搖條、搖車條。

【**小葉薄荷**】牛至（脣形科）*Origanum vulgare* L. 牛至又稱香薷。《植物名實圖考》卷二五小葉薄荷：“小葉薄荷生建昌。細莖小葉，葉如枸杞葉而圓，數葉攢生一處……”牛至學名中的 *Origanum* 來自（希）oros（山）與 ganos（美麗的），*vulgare* 意指一般的。牛至是多年生草本，芳香，直立，高 20~60 厘米。莖多少帶紫色，四稜形，具細絨毛；葉對生，卵圓形，長 1~4 厘米，寬 0.4~1.5



小葉薄荷(牛至)

厘米，先端鈍，基部圓形或寬楔形，全緣或有遠離的小鋸齒，兩面均有腺點和細毛，葉柄長 2~7 毫米；花兩性，密集成

頂生的穗狀傘房花序，花萼鐘狀，具 5 齒，花冠紫紅、淡紅至白色，2 層，上層直立，先端 2 淺裂，下層開張，3 裂，雄蕊 4，着生於冠筒喉部，花柱先端不相等 2 淺裂；小堅果 4 枚，褐色，無毛。生於路旁、山坡、林下及草地。分佈我國大部分地區。全草供藥用，又可提芳香油。

【小棘】榛(樺木科) *Corylus heterophylla* Fisch. ex Trautv. 高誘《淮南注》：“小桌小棘曰榛”。詳見亲條。

【小筆管菜】玉竹(百合科) *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce 名見《盛京通誌》。詳見葳參條。

【小蒜】薤白(百合科) *Allium macrostemon* Bunge 《救荒本草》卷八：“澤蒜又名小蒜，生田野中，今處處有之。生山中者名蒿，苗似細韭葉，中心擲葶，開淡粉紫花。根似蒜而甚小，味辛，性溫，有小毒。”詳見蒿條。

【小楊】垂柳(楊柳科) *Salix babylonica* L. 名見《本草綱目》。詳見楊柳條。

【小桌】榛(樺木科) *Corylus heterophylla* Fisch. ex Trautv. 桌，古栗字。詳見亲條、小棘條。

【小酸苗】酢漿草(酢漿草科) *Oxalis corniculata* L. 小酸苗名見於《品匯精要》。詳見醋母草條。

【小酸茅】酢漿草(酢漿草科) *Oxalis corniculata* L. 名見《唐本草》。詳見醋母草條。

【小薊】刺兒菜(菊科) *Cirsium setosum* (Willd.) MB. 刺兒菜又稱貓薊、青刺薊、千鍼草、刺薊菜等。《唐本草》：“大、小薊皆能破血，但大薊兼療癰腫，而小薊專主血，不能消腫也。”刺兒菜學名中的 *Cirsium* 源於希臘語 *kirsos*，意為脹大的血管，現為薊屬屬名；*setosum* 意為有多剛毛的。刺兒菜為多年生草本。根狀莖



小薊(刺兒菜)

長，莖直立，高 30~80(100~120)厘米；基生葉和中部莖葉橢圓形或橢圓狀倒披針形，上部莖葉漸小，橢圓形或披針形或綫狀披針形，葉緣有針刺，兩面無毛；頭狀花序單生莖端，雌雄異株，總苞片多層，花紫紅色；瘦果橢圓形或長卵形，冠毛羽狀。生於山坡、河旁、田間。我國廣佈。嫩莖葉可作豬飼料，並可藥用，為利尿及止血劑，有涼血、散瘀等效。

【小龍牙】蛇含萎陵菜(薔薇科) *Potentilla kleiniana* Wight et Arn. 《本草綱目》卷一六蛇含：“其葉似龍牙而小，背紫色，故俗名小龍牙，又名紫背龍牙。”詳見蛇全條。

【小澤蘭】硬毛地笋(唇形科) *Lycopus lucidus* Turcz. var. *hirtus* Regel 《雷公炮炙論》：小澤蘭“澤蘭，須細銼之，用絹袋盛懸於屋南畔角上，令乾用”。詳見地瓜兒苗條。

【子午花】午時花(梧桐科) *Pentapetes phoenicea* Linn. 午時花又稱金錢花、毘尸沙、翦金花、夜落金錢、日中金錢等。《花鏡》卷六：“夜落金錢一名子午花。午間開花，子時自落。”午時花學名中的 *Pentapetes* 來自[希] *pente* (五個) + *petalon* (花瓣)，此為午時花屬；*phoenicea* 意為紫毛的。午時花是一年生草本。莖高




子午花(午時花)

50~100 厘米,散生星狀柔毛;葉條狀披針形,長 5~11 厘米,寬 5~20 毫米,邊緣有鋸齒;花 1~2 朵生於葉腋或頂生,花直徑 2.5~3 厘米,花瓣 5,紅色,午時開放,翌晨即閉,花冠常整個脫落;蒴果近圓球形,直徑約 1.2 厘米,密被星狀毛。原產亞洲熱帶地區。我國廣東、雲南南部、廣西等地多有栽培,以供觀賞。

【子午蓮】睡蓮(睡蓮科) *Nymphaea tetragona* Georgi 睡蓮又稱茈碧花、瑞蓮等。《綱目拾遺》:“子午蓮,《綱目》水草部人蘋,以為此即大葉之蘋也……今浙人呼為子午蓮。”睡蓮學名中的 *Nymphaea* 源於希臘語 *Nympha*(神話中居住在河海、草地、森林的女神名),現為睡蓮屬屬名;*tetragona* 意為四稜角的。睡蓮為多年生水生草本。根狀莖具綫狀黑毛,短粗;葉紙質,心狀卵形或卵狀橢圓形,長 5~12 厘米,寬 3.5~9 厘米,基部具深彎缺,上面光亮,下面帶紅色或紫色,兩面均無毛,葉柄長達 60 厘米;花直徑 3~5 厘米,花梗細長,萼基部四稜形,萼片革質,花瓣白色;漿果毬形,直徑 2~2.5 厘米,為宿存萼片包裹;種子橢圓形,黑色。花期 6~8 月份,果期 8~10 月份。生於池沼中。我國廣佈。根狀莖

含澱粉,供食用或釀酒。全草可作綠肥。



子午蓮(睡蓮)

【子母草】龍芽草(薔薇科) *Agrimonia pilosa* Ldb. 名見《植物名實圖考》。詳見瓜香草條。

【子菜】甘紫菜(紅毛菜科) *Porphyra tenera* Kjellm《漳州府誌》:“紫菜一名索菜,以其子月生,故亦謂之‘子菜’。”詳見紫菜條。

四 畫

【王瓜草】菝葜(百合科) *Smilax china* L. 名見《日華子本草》。詳見菝葜條。

【王母珠】酸漿(茄科) *Physalis alkekengi* L. 《花鏡》卷六:“王母珠,一名酸漿,一名苦葳,俗名燈籠草,所在有之。”詳見酢醬條。

【王母簪】燈心草(燈心草科) *Juncus effusus* L. var. *decipiens* Buchen. f. *utilis* Mark. 《本草綱目》卷一五:“龍鬚、王母簪,因其形也。”詳見龍鬚條。

【王帚】地膚(藜科) *Kochia scoparia* (L.) Schrad. 名見《爾雅注》。詳見地膚條、王薺條。

【王連】黃連(毛茛科) *Coptis chinensis* Franch. 黃連又稱支連、土黃蓮等。《本草經》(草部上品):“黃連,味苦,無毒。

主治熱氣，目痛皆傷泣出，明目，腸澼腹痛下痢，婦人陰中腫痛。久服令人不忘。一名王連。生川谷。”黃連學名中的 *Coptis* 來自[希]kopto 切割，此為黃連屬；*chinensis* 意為中國的。黃連是多年生草本。根狀莖黃色，常分枝，密生多數鬚根；葉基生，葉片稍帶革質，卵狀三角形，寬達 10 厘米，三全裂，中央裂片卵狀菱形，長 3~8 厘米，寬 2~4 厘米，裂片再作羽狀深裂，邊緣具銳鋸齒；二歧或多歧聚傘花序有 3~8 朵花；蓇葖果長 6~8 毫米，有細柄。種子 7~8 粒，長橢圓形，長約 2 毫米，寬約 0.8 毫米，褐色。分佈於四川、貴州、湖南、湖北、浙江和陝西南部。生於山地林中陰濕處，亦有栽培。根狀莖為著名中藥“黃連”，可治急性結膜炎、急性細菌性痢疾、急性腸胃炎等症。同屬植物三角葉黃連、雲南黃蓮、峨眉黃蓮等，其形態與黃蓮相似，根莖藥用亦相同，古代典籍中未作區別。



王連(黃連)

【王薺】地膚(藜科) *Kochia scoparia* (L.) Schrad. 《說文解字注》：“薺，王薺也。《釋草》字作薺。郭云：似藜，可為薺。按凡物呼王者，皆謂大。”詳見地葵條。

【王蒸】木槿(錦葵科) *Hibiscus syriacus* Linn. 名見《花鏡》。詳見日給條、日及條。

【王薺】地膚(藜科) *Kochia scoparia* (L.) Schrad. 《植物名實圖考長編》卷七地膚子：“《爾雅》：薺，王薺。《注》：王薺也。似藜，其樹可以為掃薺，江東呼之曰落薺。”詳見地葵條。

【王壇】黃皮(芸香科) *Clausena lansium* (Lour.) Skeels 《齊民要術》卷一○果蔬：“王壇子，如棗大，其味甘。出侯官，越王癸太一壇邊有此果。無知其名，因見生處，遂名‘王壇’。其形小於龍眼，有似木瓜。”詳見黃皮子條。

【井口邊草】井欄邊草(風尾蕨科) *Pteris multifida* Poir. 名見《本草拾遺》。詳見風尾草條。

【井欄草】井欄邊草(風尾蕨科) *Pteris multifida* Poir. 名見《植物名實圖考》卷一六。詳見風尾草條。

【夫須】香附子(莎草科) *Cyperus rotundus* L. 《廣群芳譜》卷八九莎條：“臺夫須，夫須莎草也。”《爾雅翼》：“莎草可為衣以禦雨，今人謂之蓑衣，名曰夫須，蓋匹夫所須。”詳見莎草條。

【夫須】彎囊臺草(莎草科) *Carex dispalata* Boott 《詩疏》：“臺，夫須。”因臺和莎草都能制做蓑衣，故都有夫須的古稱。詳見臺條。

【夫煙樹】鹽膚木(漆樹科) *Rhus chinensis* Mill. 名見《田居蠶室錄》。詳見枯鹽其條、拂煙樹條。

【夫漏樹】海棗(棕櫚科) *Phoenix dactylifera* L. 《御覽》卷九六○夫漏：“夫漏樹，野生。三月華，五六月成子，如術有(按：如棗)。煮着豬肉、鷄、鴨羹中，好，可食。亦中鹽藏。”詳見無漏子條。

【天王葉】羊蹄(蓼科) *Rumex japonicus* Houtt. 名見《滇南本草圖說》。詳見

土大黃條、蓬條。

【**天仙藤**】馬兜鈴(馬兜鈴科) *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc. 《本草求真》：“天僊藤，觀書所論主治，止屬妊娠子腫、腹痛、風癆等症，而於他症則未及焉。”詳見土青木香條。

【**天瓜**】瓠子(葫蘆科) *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. var. *hispida* (Thunb.) Hara 《植物名實圖考》卷四瓠子：“瓠子，方書多不載，而《唐本草》所謂似越瓜，頭尾相似，則即今瓠子，非匏瓠也。《滇本草》：瓠子又名龍蛋瓜，又名天瓜，味甘，寒。”詳見扁蒲條。


【**天瓜**】栝樓(葫蘆科) *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 《廣群芳譜》卷九八：“栝樓，一名果羸，一名瓜蔓，一名天瓜，一名黃瓜，一名地樓，一名澤姑，所在有之。”詳見地樓條。

【**天吊瓜**】絲瓜(葫蘆科) *Luffa cylindrica* (L.) Roem. 名見《滇南本草》。詳見蠻瓜條。

【**天白**】八角蓮(小檗科) *Dysosma versipellis* (Hance) M. Cheng 《植物名實圖考長編》卷一四鬼白：“《別錄》：微溫，有毒……一名天白，一名解毒。”詳見爵犀條。

【**天芥菜**】地膽草(菊科) *Elephantopus scaber* L. 地膽草又稱鷄屙黏、苦地膽、土柴胡、馬架百興、草鞋底等。《本草綱目》卷二一：“天芥菜，生平野。小葉如芥狀。”地膽草學名中的 *Elephantopus* 源於希臘語 *elephas*(大象)+*pous*(足)，現為地膽草屬屬名；*scaber* 意為粗糙的。地膽草為多年生直立草本，高 20~60 厘米。根狀莖平臥或斜昇，具多數纖維狀根；莖直立，常二歧分枝，粗糙，被白色貼生長硬毛；單葉大部基生，花期生存，蓮座狀，匙形或倒披針狀匙形，邊緣具鋸齒，莖生葉少，倒披針形或長圓狀披針

形；頭狀花序多數，在莖或枝端束生的圓球狀的復頭狀花序，基部被 3 個綠色葉狀革質苞片所包圍，總苞狹，長 8~10 毫米，小花全為管狀，兩性，淡紫色；瘦果有稜，頂端具長硬刺毛 4~6。花期 8~12 月份，果期 11~來年 2 月份。生於山坡、路旁或山谷林緣。產長江以南地區。全草入藥，有清熱解毒、消腫利尿之效。



天芥菜(地膽草)

【**天豆**】石龍芮(毛茛科) *Ranunculus sceleratus* L. 《名醫別錄》：“無毒。平腎胃氣，補陰氣不足，失精。莖冷，令人皮膚光澤，有子。一名石能，一名彭根，一名天豆。”詳見地椹條。

【**天豆**】雲實(豆科) *Caesalpinia sepiaria* Roxb. 雲實又稱員實、雲英、馬豆、羊石子、草雲母、臭草、黏刺、老虎刺尖、水皂角、羊石子草等。《本草綱目》卷一七雲實：“恭曰：雲實大如黍及大麻子等，黃黑似豆，故名天豆。”《本草經》曹元宇輯注雲實：“《別錄》有員實、雲英、天豆之異名。”雲實學名中的 *Caesalpinia* 來自意大利植物學家 Andrea Cesalpino 的名字；*sepiaria* 意為籬邊生的，指此植物可以作為籬笆栽培。雲實為落葉攀援灌

木。枝條多刺；2回羽狀復葉，有羽片6~16枚，小葉12~24對，長橢圓形；花期4月份，總狀花序頂生，花左右對稱亮黃色；果期8~10月份，莢果長橢圓形，近木質扁平，有種子6~9個。分佈於長江以南各省。多生於山坡巖旁或灌叢中以及山澗、河旁等處。樹皮含單寧，種子可榨油，根、根皮、葉均可入藥，具有清熱除濕、殺蟲、解毒、活血通經功效，可治療痢疾、瘧疾、毒蛇咬傷等症。



天豆(雲實)

【天青地紅】三七草(菊科) *Gynura segetum* (Lour.) Merr. 名見《植物名實圖考》。詳見土三七條。

【天苴】芭蕉(芭蕉科) *Musa basjoo* Sieb. et Zucc. 《廣群芳譜》卷八九芭蕉：“蕉，一名甘蕉，一名芭苴，一名天苴，一名綠天，一名扇仙，草類也，葉青色。”詳見甘蕉條。

【天茄】牽牛(旋花科) *Pharbitis nil* (L.) Choisy 名見《植物名實圖考》。詳見丁香茄條、盆甌草條。

【天茄兒】牽牛(旋花科) *Pharbitis nil* (L.) Choisy 《花鏡》卷五牽牛花：“牽牛，一名草金鈴，一名天茄兒，有黑、白二種。”詳見盆甌草條。

【天灸】毛茛(毛茛科) *Ranunculus japonicus* Thunb. 名見《夢溪筆談》。詳見

毛建草條。

【天泡草】酸漿(茄科) *Physalis alkekengi* L. 《廣群芳譜》卷九六酸漿：“[本草綱目]酸漿，一名燈籠草，一名天泡草。”詳見酢醬條。

【天門精】天名精(菊科) *Carpesium abrotanoides* L. 名見《名醫別錄》。詳見玉門精條。

【天胡荽】石胡荽(菊科) *Centipeda minima* (L.) A. Br. et Aschers. 石胡荽又稱鵝不食草、食胡荽、野園荽、鷄腸草、鵝不食、滿天星、沙飛草、地胡椒、大救駕等。《本草綱目》卷二〇：“石胡荽，生石縫及陰濕處小草也。高二三寸，冬月生苗，細莖小葉，形狀宛如嫩胡荽。其氣辛熏不堪食，鵝亦不食之。夏開細花，黃色，結細子。極易繁衍，僻地則鋪滿也。案孫思邈《千金方》云：一種小草，生近水渠中濕處，狀類胡荽，名天胡荽，亦名鷄腸草。即此草也。與繁縷之鷄腸，名同物異。”石胡荽學名中 *Centipeda* 意為百足，形容該屬植物匍匐生長；種加詞



天胡荽(石胡荽)

minima 意為極小的，形容該植物為小草本，小種子。石胡荽為一年生匍匐小草本。莖多分枝，高5~20厘米，微被蛛絲毛或無毛；葉互生，楔狀倒披針形，長7~18毫米，頂端鈍，基部楔形，邊緣有少數

鋸齒；頭狀花序小，扁球形，直徑約 3 毫米，單生於葉腋，無花序梗或極短，總苞半球形，2 層，邊緣膜質，花托平坦，邊緣花雌性，多層，花冠細管狀，淡綠黃色，約 0.2 毫米，盤花兩性，花冠管狀，稍長，淡紫紅色；瘦果橢圓形，長約 1 毫米，具 4 稜，稜上有長毛，無冠狀冠毛。花果期 6~10 月份。生於路旁、荒野陰濕地。產我國東北、華北、華中、華南、西南。本種全草入藥，能通竅散寒、祛風利濕、散瘀消腫，主治鼻炎、跌打損傷等症。

【天南星】①虎掌(天南星科) *Pinellia pedatisecta* Schott 《植物名實圖考》卷二四天南星：“即虎掌，天南星，《本經》下品。”《神農本草經》：“虎掌，味苦，溫，無毒。主治心痛，寒熱，結氣，積聚伏梁，傷筋痿拘緩，利水道。生山谷。”虎掌學名中的 *Pinellia* 來自意大利人名，此為半夏屬；*pedatisecta* 是鳥足狀深裂之意。




天南星(虎掌)

虎掌是多年生草本。塊莖近毬形，根密集，肉質，塊莖旁常生若干小毬莖；葉 1~3 枚，或更多，葉柄淡綠色，葉片鳥足狀分裂，裂片 6~11，披針形，漸尖，基部楔形；花序柄長 20~50 厘米，直立，佛焰

苞淡綠色，管部長圓形，檐部長披針形，銳尖，肉穗花序，雄花序長 5~7 毫米，雌花序長 1.5~3 厘米，附屬器細長約 10 厘米，黃綠色。喜生於林下、山谷陰濕處。各地山區有分佈。虎掌入藥，自李時珍將其與天南星混為一談，當辨識之，真正的天南星見下條。


②天南星(天南星科) *Arisaema heterophyllum* Blu. 《本草圖經》：“天南星，《本經》不載所出州土，云生平澤，今處處有之。”天南星學名中的 *Arisaema* 來自疆南星屬 *Arum* 與[希]haima，此處指天南星屬；*heterophyllum* 是異形葉之意。天南星是多年生草本。塊莖扁毬形，周圍生根，常有若干側生芽眼；葉常單一，葉柄圓柱形，粉綠色，葉片鳥足狀分裂，裂片 13~19，綫狀長圓形，全緣，暗綠色；肉穗花序兩性或雄花序單生，花序柄長 30~55 厘米，從葉鞘筒內抽出，佛焰苞管部圓柱形，粉綠色，檐部卵形或卵狀披針形，綠色，兩性花下部 3 厘米為雌花，上部 2 厘米為疏生雄花，附屬器尾狀，蒼白色，長 10~20 厘米。天南星生於林下、灌叢或草地。除西北、西藏外，



天南星(天南星)

我國大部分省區都有分佈。天南星入藥歷史悠久，能解毒消腫、祛風定驚、化痰散結。另有多種同科植物混稱天南星並入藥。

【天南星】一把傘南星(天南星科) *Arisaema erubescens* (Wall.) Schott. 名見《本草拾遺》。陳藏器曰：“天南星生安東山谷，葉如荷，獨莖，用根。”一把傘南星學名中的 *Arisaema* 來自疆南星屬 *Arum* 與[希]haima，此處指天南星屬；*erubescens* 是呈紅色之意。一把傘南星是多年生草本。塊莖扁球形，表皮黃色，有時淡紅紫色；葉1枚，罕2枚，柄長40~80厘米，中部以下具鞘，鞘部粉綠色，上部綠色，有時具褐色斑塊，葉片放射狀分裂，裂片無定數，幼時3~4片，多年生植株裂片可多達20片，常1片上舉，裂片披針形具綫形長尾或無；花序柄短於葉柄，佛焰苞綠色，管部圓筒狀，檐部通常顏色較深，三角狀卵形，先端漸尖，略下彎，肉質花序單性，雄花序附屬器圓柱狀，有少數中性花，雌花序附屬器棒狀，具多數中性花。生於陰濕林下。我國南方多有分佈。塊莖入藥，與天南星混用。



天南星(一把傘南星)

【天香菜】苦苣菜(菊科) *Sonchus oleraceus* L. 《本草綱目》卷二七苦菜：“[釋名]茶、苦苣、苦蕒、游冬、菹苣、老鶴菜、天香菜。”詳見苦菜條。

【天荷】海芋(天南星科) *Alocasia macrorrhiza* (L.) Schott 《廣群芳譜》卷九七：“海芋，一名觀音蓮，一名羞天草，一名天荷。生蜀中，今亦處處有之。”詳見一瓣蓮條。

【天麻草】益母草(唇形科) *Leonurus artemisia* (Lour.) S. Y. Hu 《本草綱目》卷一五茺蔚：“孫思邈《千金方》云：天麻草，莖如火麻，冬生苗，夏着赤花，如鼠尾花。此皆似以茺蔚、天麻為二物，蓋不知其是一物兩種。凡物花皆有赤白，如牡丹、芍藥、菊花之類是矣。”詳見蕘條。

【天葵】落葵(落葵科) *Basella rubra* L. 《名醫別錄》：“落葵，味酸，寒，無毒。主滑中散熱，實主悅澤人面。一名天葵，一名繁露。陶隱居云：又名承露，人家多種之。”詳見蕘葵條。

【天棘】天門冬(百合科) *Asparagus cochinchinensis* Merr. 《本草綱目》卷一八天門冬：“草之茂者為蕘，俗作門。此草蔓茂，而功同麥門冬，故曰天門冬，或曰天棘。”詳見萬歲藤條。

【天然子】蘋果(薔薇科) *Malus pumila* Mill. 名見《滇南本草》。詳見超凡子條、柰條。

【天絡絲】絲瓜(葫蘆科) *Luffa cylindrica* (L.) Roem. 名見《醫學正傳》。詳見蠻瓜條。

【天絲瓜】絲瓜(葫蘆科) *Luffa cylindrica* (L.) Roem. 名見《本事方》、《本草綱目》。詳見蠻瓜條。

【天蓬草】雀舌草(石竹科) *Stellaria uliginosa* Murr. 《植物名實圖考》卷一五天蓬草：“(二)天蓬草，比前一種莖赤而韌。附莖，對葉，梢開小白花如菊，

根細短。”雀舌草學名中的 *Stellaria* 來自 *stella* 小星星；*uliginosa* 意指沼澤的。雀舌草是二年生草本，高 15~35 厘米，



天蓬草(雀舌草)

全株無毛。莖纖細，下部平卧，上部有稀疏分枝；葉對生，無柄，披針形至長圓狀披針形，長 5~20 毫米，寬 2~4 毫米，頂端漸尖，基部楔形；聚傘花序頂生或腋生，常具 3~5 花，花梗細長，基部有時具 2 披針形苞片；萼片 5，邊緣膜質，花瓣 5，白色，2 深裂幾達基部，雄蕊 5，有時 6~7，子房卵形，花柱 2~3，短綫形；蒴果卵圓形，6 瓣裂；種子腎臟形，褐色，具皺紋狀凸起。生於田間、溪岸或潮濕地區。我國大部地區有分佈。全草藥用。

【天蔓菁】天名精(菊科) *Carpesium abrotanoides* L. 《植物名實圖考長編》卷七天名精：“《本草拾遺》：天名精，《本經》一名麥句薑，蘇云鹿活草也。《別錄》云：一名天蔓菁，南人呼為地菘，與蔓菁相似，故有此名。”詳見玉門精條。

【天蓼】紅蓼(蓼科) *Polygonum orien-*

tale L. 《本草綱目》卷一六葳草：“《別錄》有名未用草部中有天蓼，云一名石龍，生水中。”詳見鴻蒿條。

【天蓼】葛棗獼猴桃(獼猴桃科) *Actinidia polygama* (Sieb. & Zucc.) Maxim. 《本草綱目》卷三六木天蓼：“[時珍曰]其樹高而味辛如蓼，故名。又馬蓼亦名天蓼而物異。”又曰：“天蓼雖有三種，而功用仿佛，蓋一類也。”詳見木天蓼條。

【天蓼木】葛棗獼猴桃(獼猴桃科) *Actinidia polygama* (Sieb. & Zucc.) Maxim. 《聖惠方》天蓼木酒：“天蓼木十斤，秫米一碩，細曲十斤，黑豆二斗。”釀酒飲，補五勞，祛風益氣。詳見木天蓼條。

【天精】枸杞(茄科) *Lycium chinense* Mill. 名見《抱樸子》。詳見枸棘條、枸檉條。

【天精菜】苦苣菜(菊科) *Sonchus oleraceus* L. 《救荒本草》：“苦苣，《本草》云即野苣也。又名徧苣，俗名天精菜，舊不著所出州土，今處處有之。”詳見苦菜條。

【天蕪菁】天名精(菊科) *Carpesium abrotanoides* L. 《植物名實圖考長編》卷七天名精：“《小品方》名天蕪菁，一名天蔓菁，聲並相近。”詳見玉門精條。

【天薤】毬序韭(百合科) *Allium thunbergii* G. Don 《本草綱目》卷二六薤條中引：“王禎《農書》云：野薤俗名天薤。生麥原中，葉似薤而小，味亦辛，亦可供食，但不多有。即《爾雅》山薤是也。”詳見山薤條。

【天燈籠】白英(茄科) *Solanum lyratum* Thunb. 天燈籠名見《綱目拾遺》，並曰：“止白淋，瘡，疝氣。汁滴耳中，止膿不乾。治癰痺，用煮牛肉精者食之。”詳見穀菜條。

【天薺】絲毛飛廉(菊科) *Carduus crispus* L. 名見《名醫別錄》。詳見木禾條、

飛輕條。

【天藕】翻白草(薔薇科) *Potentilla discolor* Bge. 名見《野菜譜》。詳見鷄腿兒條。

【天羅】絲瓜(葫蘆科) *Luffa cylindrica* (L.) Roem. 名見《本草綱目》。詳見蠻瓜條。

【天羅布瓜】絲瓜(葫蘆科) *Luffa cylindrica* (L.) Roem. 名見《婦人良方補遺》。詳見蠻瓜條。

【天羅絮】絲瓜(葫蘆科) *Luffa cylindrica* (L.) Roem. 《廣群芳譜》卷一七絲瓜條：“絲瓜，一名蠻瓜，一名布瓜，一名天羅絮，一名天絲瓜。蔓生，莖綠色，有稜而光，葉如黃瓜葉而大，無刺，深綠色，宜高架，喜背陽向陰，開大黃花。”詳見蠻瓜條。

【天鹽】鹽膚木(漆樹科) *Rhus chinensis* Mill. 名見《靈草篇》。詳見枯鹽其條。

【元及】五味子(木蘭科) *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. 名見《植物名實圖考長編》卷一〇五味子。詳見會及條。

【元胡索】延胡索(罌粟科) *Corydalis yanhusuo* W. T. Wang 延胡索又稱玄胡索等。《廣群芳譜》卷九四：“《本草綱目》延胡索一名元胡索。陳藏器曰，延胡索生奚國，從安東來，根如半夏。李時珍曰，今二茅山西上龍洞種之。”延胡索學名中的 *Corydalis* 來自[希]korydalis 雲雀，此為紫堇屬。延胡索是多年生草本。塊莖毬形，直徑 0.7~2 厘米，高 9~20 厘米，在基部之上生 1 鱗片，其上生 3~4 個葉；葉片三角形，長 7.5 厘米，二回三出全裂，最終裂片綫狀長橢圓形，長 1.2~3 厘米，寬 3.5~8 毫米；總狀花序長 3~6.5 厘米，花瓣紫紅色；蒴果綫型，長約 2 厘米。分佈在浙江、江蘇、河北、山東等地。生於山區、丘陵、草地，或為栽培。塊莖入藥，治心腹腰膝諸痛、痛

經、疝氣、跌打損傷、月經不調等症。



元胡索(延胡索)

【元修菜】硬毛果野豌豆(豆科) *Vicia hirsuta* (L.) S. F. Gray 《植物名實圖考長編》卷五翹搖：“陸游《巢菜詩序》：蜀蔬有兩巢：大巢，豌豆之不實者；小巢，生稻畦中，東坡所賦元修菜是也。吳中絕多，名漂搖草，一名野蠶豆。”詳見搖車條。

【元參】玄參(玄參科) *Scrophularia ningpoensis* Hemsl. 《植物名實圖考長編》卷六元參：“《本經》：元參，味苦，微寒……一名重臺。”詳見重臺條。

【元臺】玄參(玄參科) *Scrophularia ningpoensis* Hemsl. 《植物名實圖考長編》卷六元參：“《別錄》：鹹，無毒……一名元臺，一名鹿腸，一名正馬，一名咸，一名端。”詳見重臺條。

【木八角】八角楓(八角楓科) *Alangium chinense* (Lour.) Harms 《綱目拾遺》：“木八角，木高二三尺，葉如木芙蓉，八角有芒，其葉近蒂處有紅色者佳。”詳見刺楓條。

【木子】中華獼猴桃(獼猴桃科) *Actinidia chinensis* Planch. 名見《開寶本草》。詳見萋楚條、獼猴桃條。

【木子樹】烏柏(大戟科) *Sapium sebiferum* Roxb. 《植物名實圖考》卷三五: “烏臼木,《唐本草》始著錄。俗呼木子樹,子榨油,利甚薄。根解水莽毒,效。”詳見鴉臼條。

【木王】梓(紫葳科) *Catalpa ovata* G. Don 《本草綱目》卷三五梓: “[釋名]木王 [時珍曰]……按陸佃《埤雅》云:梓為百木長,故呼梓為木王。蓋木莫良於梓,故書以梓材名篇,禮以梓人名匠,朝廷以梓



木王(梓)

宮名棺也。羅願云:屋室有此木,則餘材皆不震。其為木王可知。”梓學名中的 *Catalpa* 意為梓樹屬,來自希臘語的 *ku-tuhlpa*(有翼的頭); *ovata* 意為卵形的。梓為落葉喬木。莖高達 10 餘米,幼枝常帶紫色,光滑少被柔毛;單葉對生,闊卵形至近圓形,不分裂或掌狀淺裂;圓錐花序頂生,花冠鐘形,黃白色,雄蕊 5 個,雌蕊 1 個;蒴果綫形,下垂,長 20~30 厘米;種子扁平;花期 5~6 月份,果期 7~8 月份。分佈於東北以及河南、江蘇、陝西等省區。喜生於低山河谷、濕潤土壤。莖、葉、皮可入藥,具利尿、清熱解毒、殺蟲功效,可治療手足痛風、皮膚瘙癢、慢性腎炎、小兒熱瘡等症。

【木天蓼】葛棗獼猴桃(獼猴桃科) *Ac-*

tinidia polygama (Sieb. & Zucc.) Maxim. 葛棗獼猴桃又稱天蓼、天蓼木、藤天蓼等。《唐本草》:“木天蓼,味辛,溫,有小毒。”注:“作藤蔓,葉似柘,花白,子如棗許,無定形。”葛棗獼猴桃學名中的 *Actinidia* 來自[希]aktis,光綫,放綫狀,獼猴桃屬; *polygama* 意指雜性的。葛棗獼猴桃是落葉藤本。莖長達 5 米,老枝無毛,髓白色,實心;葉膜質至薄紙質,卵形或橢圓卵形,長 6~14 厘米,寬 4~8 厘米,先端漸尖,基部寬楔形,緣有細齒;雌雄異株,花序 1~3 花,腋生,花白色芳香,萼 5,花瓣 5;漿果卵珠形,熟時淡橘色,長約 3 厘米,先端喙狀;種子多數,淡褐色。喜生深山灌叢及山林。產黑龍江、吉林、遼寧、甘肅、陝西、河北、河南、山東、湖北、湖南、四川、雲南、貴州等省。枝葉及瘦果入藥,嫩葉入蔬。



木天蓼(葛棗獼猴桃)

【木丹】梔子(茜草科) *Gardenia jasminoides* Ellis 名見《本草綱目》。詳見梔子條、越桃條。

【木禾】絲毛飛廉(菊科) *Carduus crispus* L. 《植物名實圖考長編》卷七飛廉: “《別錄》:無毒……一名漏蘆,一名天薺,一名伏豬,一名伏兔,一名飛雉,一名木禾。”詳見飛輕條。

【木瓜】皺皮木瓜(薔薇科) *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai 名見《本草綱目》。詳見楸條

【木瓜花】皺皮木瓜(薔薇科) *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai 名見《植物名實圖考》。詳見楸條、貼梗海棠條。

【木奴】柑橘(芸香科) *Citrus reticulata* Blanco 柑橘又稱柑子、金實、瑞聖奴、橘等。柑與橘在古代有分別記述的,也有合記的,如《南方草木狀》曰:“柑乃橘之屬。”現代各學派認識不一,有的認為是兩個種,也有的認為柑是橘和橙的雜交種。但二者的染色體數為 $x=9, 2n=18, 27, 36$ 。故記為一種,在古代柑與橘都有“木奴”之稱。《本草綱目》卷三〇柑釋名木奴,並曰:“漢李衡種柑於武陵洲上,號為木奴也。”《廣群芳譜》卷六四橘:“橘一名木奴(詳見後《襄陽耆舊傳》)。”柑橘學名中的 *Citrus* 是柑橘的原名,來自巴勒斯坦南部 Judea 地區 citron 鎮的名字; *reticulata* 在拉丁語中意為網狀的。柑橘為常綠小喬木或灌木。莖高約 3 米,枝柔弱有刺;葉革質互生,單身復葉,翼葉通常狹窄,披針形或卵狀披針形,全緣或具細鋸齒;春末夏初開花,花小白生於葉腋;果期 10~12 月份,果扁圓形,紅色或橙黃色,直徑 5 厘米以



木奴(柑橘)

上,果皮粗厚疏松,肉瓢易剝離,味酸甜不一。主要分佈於長江以南各省。較耐寒。果供生食,種子可榨油制做肥皂、潤滑油等。果皮、核、葉均可入藥,具理氣化痰、活血散結、消腫散毒、生津止渴、醒酒利尿功效,可治療疝氣、腎腰痛等症。

【木奴樹】柯樹(殼斗科) *Lithocarpus glaber* (Thunb.) Nakai 柯樹又稱何樹。《臨海異物誌》:“[柯樹]是木奴樹。”《本草拾遺》:“柯樹……一名木奴。南人用作大舡者也。”《本草綱目》卷三五柯樹:“[釋名]木奴[珣曰]按《廣誌》云:生廣南山谷。波斯家用木為船舫者也。”柯樹學名中的 *Lithocarpus* 來自[希]lithos(石



木奴樹(柯樹)

頭)+karpos(果實),此為石櫟屬; *glaber* 平滑的。柯樹是常綠喬木。莖高 7~15 米,樹皮青灰色,光滑,嫩枝有灰黃色絨毛;葉互生,革質,長橢圓狀披針形,長 7~12 厘米,寬 2.5~4 厘米,先端尾狀鈍尖,基部楔形,全緣,上面深綠,光亮,下面灰白,被有秕鱗,柄長 1~1.5 厘米;花雌雄同株,花序頂生,雄花序穗狀,軸上有短絨毛,長 5~10 厘米,花很密,花被 6 裂,雌花序粗壯,3~5 朵花聚生;堅果卵形,暗赤略被白粉,殼斗淺杯狀,被覆瓦狀細鱗。生山坡叢林。分佈在浙

江、江蘇、湖南、江西、福建、廣東、廣西。樹材用，果含澱粉。

【木耳菜】觀音莧(菊科) *Gynura bicolor* DC. 觀音莧又稱血皮菜。《植物名實圖考》卷六木耳菜：“木耳菜產南安，一名血皮菜。”觀音莧學名中的 *Gynura* 來自[希]gyne(雌蕊)與 oura(尾)；*bicolor* 意指雙色的。觀音莧是多年生草本，高 30~90 厘米。葉互生，倒卵形、橢圓形或倒披針形，長 6~9 厘米，寬 1.5~3 厘米，先端尖，基部漸狹，下延成耳狀，邊緣有不整齊鋸齒，背面常帶紫色，葉柄短，紫紅色，上部葉幾無柄；頭狀花序數個排列成圓錐狀或傘房狀花序，苞片 1 列，綫形，全部管狀花，黃色；瘦果圓柱狀，有數縱肋，冠毛為白色絹毛。生於曠野濕地，或栽培於菜圃。分佈於福建、臺灣、江西、廣東、廣西、四川、雲南等地。根或全草供藥用。




木耳菜(觀音莧)

【木耳菜】落葵(落葵科) *Basella rubra* L. 《植物名實圖考》卷四落葵：“落葵，《別錄》下品。《爾雅》：終葵，繁露。注：承露也，大莖小葉，華紫黃色，即臙脂豆也。湖南有白莖綠葉者，謂之木耳菜，尤滑。”詳見落葵條。

【木血竭】麒麟竭(棕櫚科) *Daemonio-*


rops draco Bl. 《滇南本草》：“麒麟竭，味苦，澀，微香，性溫。出元江界，木高數丈，葉類櫻桃，脂液流樹中，凝紅如血，為木血竭。”詳見血竭條。

【木羊乳】丹參(脣形科) *Salvia miltiorrhiza* Bge. 丹參又稱赤參、鄒蟬草、奔馬草等。《植物名實圖考長編》卷六：“丹參，《本草經》：丹參，味苦，微寒。主心腹邪氣，腸鳴幽幽如走水；寒熱積聚，破癥除瘕，止煩滿，益氣。一名鄒蟬草。《別錄》：無毒。養血，去心腹痼疾、結氣、腰脊強、腳痹、除風邪，留熱。久服利人。一名赤參，一名木羊乳。”丹參學名中的 *Salvia* 來自拉丁語 *Salvare*，治愈的，指丹參可作藥用；*miltiorrhiza* 意指丹參的根為紅色。丹參是多年生草本植物。莖直立，方形，表面有淺槽，高約 30~80 厘米；奇數羽狀復葉，對生；總狀花序頂生或生於葉腋內，花冠脣形；小堅果橢圓形，黑色。生於山野向陽處。分佈於全國各地。以根入藥，具有活血祛瘀、安神寧心、排膿、止痛之功效。



木羊乳(丹參)

【木李】木瓜（薔薇科）*Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne 木瓜又稱木梨、榎櫨、瘡櫨、蠻櫨等。《詩經·衛風》：“投我以木李，報之以瓊玖。”《本草綱目》卷三〇榎櫨：“[釋名]蠻櫨、瘡櫨、木李、木梨[時珍曰]木李生於吳越，故鄭樵《通志》謂之蠻櫨云。俗呼為木梨，則榎櫨蓋蠻櫨之訛也。”木瓜學名中的 *Chaenomeles* [希]chaino(裂開) + melon(蘋果)，此為木瓜屬；*sinensis* 中國的。木瓜是落葉灌木或小喬木。樹皮片狀脫落，小枝無刺，高 5~10 米；單葉互生，葉橢圓卵形或橢圓長圓形，長 5~8 厘米，寬 3.5~5.5 厘米，緣有細銳鋸齒，齒端有腺體，托葉披針形，膜質；花單生、梗短，後葉開放，花徑 3 厘米左右，萼鐘形 5 裂，花瓣倒卵形，淡粉紅色；梨果長橢圓形，長 10~15 厘米，黃色。野生或栽培。分佈陝西、河南及長江以南各省。果入藥。



木李(木瓜)

【木威】烏欖（橄欖科）*Canarium pimela* Leenh. 烏欖又稱木威子、烏橄欖等。顧微《廣州誌》：“木威，樹高大。子如橄欖而堅，剥去皮，以為粽。”烏欖學名中的 *Canarium*，[馬來]橄欖原名，此為屬名。烏欖為常綠大喬木。莖高 10~16 米，有

膠黏性芳香樹脂，樹皮灰褐色，平滑，小枝綠褐；單數羽狀復葉，互生，長 30~60 厘米，具小葉 9~13 枚，小葉對生，具短柄，革質，長圓形至卵狀橢圓形，長 5~15 厘米，寬 3.5~7 厘米；圓錐花序，花序長於復葉，萼杯狀，3~5 裂，花瓣 3~5，分離，長約為萼的 3 倍；核果卵圓形，略呈三角形，兩端鈍，成熟時紫黑色，核木質。生於平原、丘陵、山地密林中，分佈福建、廣東、廣西、雲南等地。果不堪生食，核仁可榨油食用或工業用，材質優良，用於建築和制作家具。



木威(烏欖)


【木威子】烏欖（橄欖科）*Canarium pimela* Leenh. 《本草拾遺》：“木威子，味酸，平，無毒。”《嶺南雜記》：“烏欖一名木威子，乃橄欖之大者，蒂有臭味，大遜橄欖。”詳見木威條。

【木骨】五加（五加科）*Acanthopanax gracilistylus* W. W. Smith 名見《本草圖經》。詳見五佳條、豺漆條。

【木香】沉香（瑞香科）*Aquilaria agallocha* Roxb. 萬震《南州異物誌》：“木香，出日南。欲取，當先斷壞樹着地，積久外自朽爛。其心至堅者，置水則沉，名曰‘沉香’；其次在心白之間，不甚堅精，置

之水中不沉不浮與水平者，名曰‘棧香’；其最小粗白者，名曰‘槩香’。”詳見沉水香條。

【木香】雲木香(菊科) *Aucklandia lappa* Decne. 雲木香又稱五木、五香、蜜香、五木香、廣木香、青木香、南木香、菁



木香(雲木香)

苜香等。《本草經》：“木香，味辛，溫。主治邪氣，辟毒疫溫鬼，強志，主淋露。久服不夢寤癡寐。生山谷。”雲木香學名中的 *Aucklandia*，此為雲木香屬；*lappa* 有芒刺的、牛蒡形的。雲木香是多年生高大草本。主根粗壯，圓柱形，直徑達 5 厘米，外皮褐色；莖不分枝，高 1.5~2 米，上部有短柔毛；基生葉極大，三角形，長 30~100 厘米，寬 15~30 厘米，長葉柄上有翅狀裂片，莖生葉卵形或三角狀卵形；頭狀花序頂生及腋生，花莖高大，總苞 7~10 層，近革質，三角狀披針形，先端長銳，花全為管狀花，暗紫色，先端 5 裂；瘦果綫形，先端平截，具黃色冠毛。


生長於較高的山地。原產印度，我國雲南、四川、廣西有栽培。根入藥，健脾和胃、理氣等。

【木香】土木香(菊科) *Inula helenium* L. 《蜀本草》：“木香，今苑中種之。花黃，苗高三四尺，葉長八九寸，皺軟而有毛。”詳見青木香條。

【木香】馬兜鈴(馬兜鈴科) *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc. 《本草綱目》卷一八馬兜鈴：“[時珍曰]其根吐利人，微有香氣，故有獨行、木香之名。”詳見土青木香條。

【木桂】肉桂(樟科) *Cinnamomum cassia* Presl 《唐本草注》：“古方亦用木桂。或云：牡桂即今木桂，及單名桂者，是也。”詳見桂條。

【木桃】毛葉木瓜(薔薇科) *Chaenomeles cathayensis* (Hemsl.) Schneid. 毛葉木瓜又稱榿、榿子、和圓子等。《詩經·衛風》：“投我以木桃，報之以瓊瑤。”《本草綱目》卷三〇榿子：“[釋名]木桃、和圓子 [時珍曰]木瓜酸香而性脆。木桃酢澀而多渣，故謂之榿，《雷公炮炙論》和圓子即此也。”毛葉木瓜學名中的 *Chaenomeles*



木桃(毛葉木瓜)

[希]chaeno(裂開)+melon(蘋果),此為木瓜屬;*cathayensis* 中國的。毛葉木瓜是落葉灌木至小喬木。莖高2~6米,枝棕褐色,有皮孔,具枝刺;單葉,橢圓狀至倒卵狀披針形,長5~10厘米,寬2~4厘米,先端尖,基部楔形,緣有細鋸齒,托葉革質,腎形;花先葉開放,2~3朵簇生於二年生枝上,花徑2~4厘米,萼筒鐘形5裂片,花瓣5枚,倒卵形,淡紅或白色;梨果卵球形,先端有突起,色黃,味芳香。多為栽培。陝西、甘肅、湖南、湖北、四川、雲南等地有分佈。果入藥,代用木瓜。

【木莓】山莓(薔薇科) *Rubus corchorifolius* L. f. 名見《爾雅注》。詳見樹莓條。


【木菌】木耳(木耳科) *Auricularia auricula* (L. ex Hook.) Underw. 木耳又稱木樞、木縱、樹鷄、木蛾、木樞等。《本草綱目》卷二八木耳條:“[釋名]木樞、木菌、木縱、樹鷄、木蛾。[時珍曰]木耳生於朽木之上,無枝葉,乃濕熱餘氣所生。曰耳曰蛾,象形也。曰縱,以軟濕者佳也。曰鷄曰縱,因味似也。南楚人謂鷄為縱……或曰:地生為菌,木生為蛾。北人曰蛾,南人曰蕈。”木耳學名中的 *Auricularia* 源於拉丁語 *auricula*, 意為小耳朵,現為木耳屬屬名;*auricula* 意為耳形的。木耳的子實體形如人耳,徑約10厘米。內面呈暗褐色,平滑;外面淡褐色,密生柔軟的短毛;濕時為膠質,乾時帶革質。不同大小的子實體簇生一叢,上表面子實層中的擔子分隔,埋於膠質中。喜生於陰濕、腐朽的樹幹上。我國四川、福建等地較多。可食,也可入藥,有涼血、止血之效。

【木梨】木瓜(薔薇科) *Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne 名見《埤雅》和《本草綱目》。詳見木李條。

【木棉】杜仲(杜仲科) *Eucommia ul-*

moides Oliver 《植物名實圖考》卷三三杜仲:“杜仲,《本經》上品。一名木棉。”詳見木綿條。

【木軸子】木竹子(藤黃科) *Garcinia multiflora* Champ. 《本草綱目拾遺》卷八木軸子:“木竹子出廣西,皮色形狀如大枇杷,肉味甘美,秋冬實熟。”木竹子學名中的 *Garcinia*, [法]人名 L. Garcin, 藤黃屬;*multiflora* 多花的。木竹子是常綠喬木。莖高5~15米,樹皮灰白色,枝具縱槽紋;葉對生,近革質,卵形至橢圓形,長7~15厘米,寬3~5厘米,先端漸尖或渾圓,基部楔形,全緣,背捲,中脉



木軸子(木竹子)

在上面微隆起,下面的側脉微隆起,側脉在近葉緣處網結,不達葉緣;花單生或數朵組成聚傘花序,再排成總狀花序或圓錐花序,頂生或腋生,花橙黃色,單性,少雜性,花心有黏液,萼4,外2較小,內2較大,花瓣4;漿果橢圓球形,長3~5厘米,青黃色,光滑。生山地丘陵闊葉林中。分佈雲南、廣東、廣西、福建、江西、臺灣。果可食,根、果、皮入藥,消炎、止痛。

【木粟】紫苜蓿(豆科) *Medicago sativa* L. 名見《爾雅翼》。詳見牧宿條。

【木蓮】木芙蓉(錦葵科) *Hibiscus mutabilis* L. 《本草綱目》卷三六木芙蓉：“[時珍曰]此花艷如荷花，故有芙蓉、木蓮之名。”詳見拒霜花條。

【木蓮】玉蘭(木蘭科) *Magnolia denudata* Desr. 玉蘭又稱杜蘭、木蘭等。《花鏡》卷四玉蘭：“玉蘭古名木蘭。”木蘭，一名木蓮，一名杜蘭，生零陵山谷及泰山上。玉蘭學名中的 *Magnolia* 指木蘭屬，來自法國植物學家 Pierre Magnol 的名字；*denudata* 使裸露的，意指玉蘭果實是蓇葖果，成熟時裂開使種子裸露出




木蓮(玉蘭)

來。玉蘭是落葉喬木。樹冠卵形，分枝少，幼莖上有毛；單葉互生，葉呈倒卵形，先端闊而突尖，基部漸狹，全緣；冬芽密生絨毛；花大，單生，先葉開放，白色，花柄粗短，花萼，花瓣相似，每輪3片，共3輪，雄蕊多數，心皮多數，螺旋排列於延長的花托上；蓇葖果圓筒形。栽培用於觀賞，或野生於闊葉林中。分佈於河南、陝西、山東和長江以南各地。花蕾入藥可消痰、益肺和氣，也可治頭痛、鼻塞、齒痛。

【木蒴藿】接骨木(忍冬科) *Sambucus williamsii* Hance. 接骨木又稱續骨木。《本草綱目》卷三六接骨木：“接骨以功而名。花、葉都類蒴藿、陸英、水芹輩，故一

名木蒴藿。”《植物名實圖考》卷三八接骨木：“接骨木，江西廣信有之。以有接骨之效，故名。”接骨木為落葉灌木或小喬木。莖上皮孔發達，莖高4~8米，奇數羽狀復葉，對生；頂生圓錐花序，花白色至淡黃色；漿果近球形，紫色或紅色，花期4~5月份，果期7~9月份。生於向陽山坡或栽培。分佈於我國大部分地區。莖、根皮、根、葉、花均可入藥，具有祛風、利濕、止血、止痛之功效。



木蒴藿(接骨木)

【木蛾】木耳(木耳科) *Auricularia auricula* (L. ex Hook.) Underw. 名見《本草綱目》。詳見木菌條。

【木蠃】木耳(木耳科) *Auricularia auricula* (L. ex Hook.) Underw. 名見《本草綱目》。詳見木菌條。

【木蜜】枳椇(鼠李科) *Hovenia acerba* Lindl. 枳椇又稱鷄距子、拐棗、萬字果、枸、枳枸、椇、枸骨、白石木、交加枝、金鈎木、梨棗樹、枳椇、檳榔、枳椇。《花鏡》卷四枳椇：“枳椇一名木蜜，一名鷄距子。”又伊欽恒校注：“別名枸、拐棗、萬字果。”枳椇學名中的 *Hovenia*，來自人名 D. d. v. Hoven; *acerba*，意指尖銳的。枳椇是

落葉喬木，高達 10 米，幼枝紅褐色。葉互生，卵圓形，長 7~17 厘米，寬 4~11 厘米，先端漸尖，基部圓形或心形，邊緣有鋸齒，基出 3 主脈，淡紅色，葉柄紅褐色，二歧式聚傘圓錐花序，萼片 5，卵狀三角形，花瓣 5，倒卵形，雄蕊 5，子房 3 室；果梗肥厚扭曲，肉質，紅褐色，核果近球形，成熟時黃褐色或棕褐色；種子暗褐色或黑紫色。生長於陽光充足的溝邊和路邊或山谷中。分佈於華北、華東、中南、西南各省區。根、樹皮、木汁、葉、果實和種子均供藥用。



木蜜(枳椇)

【木蜜】枸骨（冬青科）*Ilex cornuta* Lindl. 名見陸璣《詩疏》。詳見貓兒刺條。

【木蜜】棗（鼠李科）*Ziziphus jujuba* Mill. 棗又稱棗樹、大棗、壺棗、乾棗、美棗、良棗等。《花鏡》卷四棗：“棗一名木蜜。樹堅直而高大，身多刺而少橫枝。葉細而有尖，四五月開小淡黃花，香味甚濃。北地最廣，而青、晉、絳州者更佳。”棗學名中的 *Ziziphus*，來自希臘語 *Zizyphon*（棗原名），有人認為來自阿拉伯語的 *Zizouf*（棗的俗名）；*jujuba* 也為棗的俗名。棗為落葉小喬木，少有灌木，高可

達 10 米以上。樹皮褐色，有長枝、短枝和無芽小枝；具 2 個托葉刺，葉卵形或卵狀橢圓形，紙質，邊緣有鈍鋸齒；花兩性，黃綠色，腋生聚傘花序；核果矩圓形或長卵圓形，成熟時紅色到紅紫色；種子扁橢圓形；花期 5~7 月份，果期 8~9 月份。喜生於海拔 1700 米以下的山區、丘陵或平原地帶，我國東北、西南、東部及中原地區均有分佈。果可食，葉、核、樹皮、樹根均可入藥，具有止血、祛濕、清熱、下乳、調經功效，可治療瘡癤、腹瀉、菌痢、胃痛、吐血、月經不調等症。



木蜜(棗)

【木蜜】土沉香（瑞香科）*Aquilaria sinensis* (Lour.) Gilg 《御覽》卷九八二木蜜：“木蜜，名曰‘香樹’，生千歲，根本甚大。先伐僵之，四五歲乃往看，歲月久，樹材惡者腐敗，惟中節堅真，芳香者獨在耳。”詳見蜜香條。

【木蜜香】土沉香（瑞香科）*Aquilaria sinensis* (Lour.) Gilg 唐釋道世《法苑珠林》卷四九華香篇：“木蜜香，名曰‘香樹’，生千歲，根本甚大。先伐僵之，四五歲乃往看，歲月久，樹根（按《御覽》引為樹材）惡者腐敗，惟中節堅貞，芳香獨在耳。”詳見蜜香條。

【木綿】木棉（木棉科）*Bombax malabaricum* DC. 《本草綱目》卷三六木綿：

“交廣木綿，樹大如抱……今人謂之斑枝花，訛為攀枝花。”詳見古貝條。

【木綿】杜仲（杜仲科）*Eucommia ulmoides* Oliver 杜仲又稱思仙、思仲、木棉、木綿等。《本草綱目》卷三五杜仲：“其皮中有銀絲如綿，故曰木綿。”《名醫別錄》：“一名思仲，一名木綿，生上虞山谷及上黨、漢中。”杜仲學名中的 *Eucommia*，意為優良富含樹膠的。杜仲為落葉喬木。莖高達 20 米，樹皮粗糙灰褐色；葉長橢圓狀卵形，長 6~15 厘米，寬 3~6 厘米，互生，有鋸齒，薄革質；春季開花，雌雄異株；秋後果實成熟，翅果扁平長橢圓形，種子扁平綫形。杜仲為我國特產，分佈於我國西部至中部。喜光喜溫和肥沃土壤，多生長在海拔 300~500 米的低山谷地疏林中。皮、葉、果實含杜仲膠，可制做耐酸鹼容器以及管道的內壁，樹材可做家俱，種子可以榨油，樹皮可入藥作強壯劑，降低血壓，可以治療風濕、腰膝痛、習慣性流產等症。



木綿(杜仲)

【木稷】高粱（禾本科）*Sorghum bicolor* (L.) Moench 名見《廣雅》。詳見荻梁條、蜀黍條。

【木彈】龍眼（無患子科）*Dimocarpus*

longan Lour. 名見《本草綱目》卷三一龍眼。詳見亞荔枝條、益智條。

【木槲】木耳（木耳科）*Auricularia auricula* (L. ex Hook.) Underw. 名見《本草綱目》。詳見木菌條。

【木龍】蓼蓼（葡萄科）*Vitis adstricta* Hance 名見《百一選方》和《本草綱目》。詳見野葡萄條。

【木樨】木犀（木犀科）*Osmanthus fragrans* Lour. 名見《墨莊漫錄》。詳見九里香條、棧條。

【木樨花】木犀（木犀科）*Osmanthus fragrans* Lour. 名見《墨莊漫錄》。詳見九里香條、棧條。

【木槲】木耳（木耳科）*Auricularia auricula* (L. ex Hook.) Underw. 名見《證類本草》。詳見木菌條。

【木藥子】黃獨（薯蕷科）*Dioscorea bulbifera* L. 名見《廣群芳譜》。詳見山慈姑條。

【木蘭】玉蘭（木蘭科）*Magnolia denudata* Desr. 名見《花鏡》。詳見木蓮條。

【木鹽】鹽膚木（漆樹科）*Rhus chinensis* Mill. 名見《通志》。詳見酸桶條、枯鹽其條。

【木藥】樂樹（無患子科）*Koelreuteria paniculata* Laxm. 樂樹又稱樂華。《植物名實圖考長編》卷二〇樂華：“《圖經》：樂華生漢中川谷。”又：“《救荒本草》：木藥樹生密縣山谷中，樹高丈餘……”樂樹學名中的 *Koelreuteria*，來自人名 J. G. Koelreuter，德國植物學家；*paniculata* 意指圓錐花序狀的。樂樹是落葉喬木，高可達 10 米，小枝具疣點，被柔毛。單數羽狀復葉互生，有時二回或不完整的二回羽狀復葉，長可達 50 厘米，小葉 7~15，卵形或卵狀披針形，長 3.5~10 厘米，寬 3~6 厘米，邊緣鋸齒狀或羽狀分裂；聚傘圓錐花序長 25~40 厘米，花淡

黃色，中心紫色；蒴果腫脹長卵形，長4~6厘米，頂端漸尖，外面有網紋，邊緣有膜質薄翅3片；種子圓形，黑色。多生於雜木林或灌木林中。產我國大部分省區。世界各地有栽培。葉可作藍色染料，花供藥用，亦可作黃色染料。



木樂(樂樹)

【五木】雲木香(菊科) *Aucklandia lappa* Decne. 《修養書》：“正月一日取五木煮湯以浴，令人至老鬚髮黑。”徐鍇注云：“道家謂青木香為五香，亦云五木，多以為浴是矣。”詳見木香條。

【五木香】雲木香(菊科) *Aucklandia lappa* Decne. 《本草綱目》卷一四木香：“古樂府云，氍毹毳毳五木香，皆指此也。[頌曰]《修養書》云：正月一日取五木煮湯以浴，令人至老鬚髮黑。”詳見木香條。


【五芳草】馬齒莧(馬齒莧科) *Portulaca oleracea* L. 名見《本草綱目》。詳見馬莧條。

【五爪龍】烏薺莓(葡萄科) *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep. 《本草綱目》卷一八烏薺莓：“[時珍曰]五葉如白斂，故曰烏斂，俗呼五爪龍。”詳見赤葛條。

【五月梅】烏薺莓(葡萄科) *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep. 《植物名實圖考長編》卷一〇烏薺莓：“又《圖經》云：蔓生，莖端五葉，青白色，俗呼為五月梅，所在有之。”詳見赤葛條。

【五月紅】茅莓(薔薇科) *Rubus parvifolius* L. 名見《閩東本草》。詳見紅梅消條。

【五加】白笏(五加科) *Acanthopanax trifoliatum* (L.) Merr. 白笏又稱刺三甲、山五甲、風黨笏、苦力葱、苦力強等。《滇南本草》五加皮：“五加皮，味苦，辛，性溫。入肺腎，治腰膝酸疼、疝氣、筋骨拘攣、小兒腳軟。”白笏學名中的 *Acanthopanax*，來自希臘語的 *akanthos* (刺) 和 *panax* (人參屬)，意指與人參屬植物有親緣關係的有刺灌木；*trifoliatum* 意為具三葉的。白笏為多年生灌木，高2~7米。枝條有皮孔和刺，復葉互生，葉片長卵形；頂生傘形花序，3~10個聚合成總狀花序，雄蕊5個，雌蕊一個；果毬形黑色；花期7~8月份，果期11~12月份。喜生於溪邊、山脚及丘陵地氣候溫暖的灌叢中。分佈於廣東、廣西、四川、福建、江西等省。根或根皮可入藥，具清熱解毒、祛風利濕功效。



五加(白笏)

【五加蕪】五加（五加科）*Acanthopanax gracilistylus* W. W. Smith 《植物名實圖考》卷三三五加皮：“《仙經》謂之金鹽。江西種以爲籬，其葉作蔬，俗呼五加蕪。京師燒酒，亦有五加之名，殆染色爲之。”詳見豺漆條。

【五行草】馬齒莧（馬齒莧科）*Portulaca oleracea* L. 《圖經本草》：“馬齒莧舊不著州土，今處處有之；雖名莧類，而苗葉與人莧輩都不相似。又名五行草，以其葉青、梗赤、花黃、根白、子黑也。”詳見馬莧條。

【五色林檎】花紅（薔薇科）*Malus asiatica* Nakai 名見《洽聞記》。詳見聯珠果條、林檎條。

【五花】五加（五加科）*Acanthopanax gracilistylus* W. W. Smith 《本草綱目》卷三六五加：“[時珍曰]此藥以五葉交加者良，故名五加，又名五花。”詳見豺漆條。

【五角楓】八角楓（八角楓科）*Alangium chinense* (Lour.) Harms 名見《簡易草藥》。詳見刺楓條。

【五佳】五加（五加科）*Acanthopanax gracilistylus* W. W. Smith 《廣群芳譜》卷一〇〇：“五加，一名文章草，一名金玉香草，一名金鹽，一名五花，一名追風使，一名豺漆，一名豺節，一名五佳，一名白刺，一名木骨。江淮湖南州郡皆有之。”詳見豺漆條。

【五香】雲木香（菊科）*Aucklandia lappa* Decne. 《本草綱目》卷一四木香：“《三洞珠囊》云：五香者，即青木香也。一株五根，一莖五枝，一枝五葉，葉間五節，故名五香，燒之能上徹九天也。”詳見木香條。

【五葉木通】木通（木通科）*Akebia quinata* (Thunb.) Decne. 名見《開寶本草》。詳見通草條。

【五葉莓】烏莓（葡萄科）*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep. 《花鏡》卷五：“五爪龍，一技名，一名五葉莓。蔓生籬落間。”詳見赤葛條。

【五葉藤】茜草（茜草科）*Rubia cordifolia* L. 名見《履巉巖本草》。詳見茹蘆條。

【五稜子】陽桃（酢漿草科）*Averrhoa carambola* L. 名見《本草綱目》。詳見五斂子條。

【五楸】鹽膚木（漆樹科）*Rhus chinensis* Mill. 名見《五楸草綱目》。詳見枯鹽其條。

【五鳳草】澤漆（大戟科）*Euphorbia helioscopia* L. 名見《本草綱目》。詳見漆莖條。

【五斂子】陽桃（酢漿草科）*Averrhoa carambola* L. 陽桃又稱廉、楊桃、山斂、三廉、三斂子、羊桃、洋桃、五稜子、揚搖



五斂子(陽桃)

子等。《本草綱目》卷三一五斂子：“[釋名]五稜子、陽桃[時珍曰]按稽含《草木狀》云：南人呼稜爲斂，故以爲名。”陽桃學名中的 *Averrhoa*，來自阿拉伯人名 *Averrhoes*，此爲陽桃屬；*carambola* 系南洋陽桃俗名。陽桃是常綠喬木。莖高 8~12 米；單數羽狀復葉互生，有小葉 5~

11 枚，小葉卵形至橢圓形，長 3~6 厘米，葉下被疏柔毛；總狀圓錐花序頂生或腋生，花小，萼紅紫色，花瓣 5，白色至淡紫色；漿果卵形或矩圓形，具 5 稜，長 5~8 厘米，淡黃綠色，表面光滑。多栽培於南方園林或村旁。分佈於雲南、廣西、廣東、福建、臺灣等地。果為南方主要果品之一，亦入藥，清熱、生津、利尿、解毒等。

【支連】黃連（毛茛科）*Coptis chinensis* Franch. 《本草綱目》卷一三黃連：“[釋名]王連、支連[時珍曰]其根連珠而色黃，故名。”詳見王連條。

【支解香】紫丁香（木犀科）*Syringa oblata* Lindl. 《廣群芳譜》卷一〇〇丁香：“[藥譜]丁香異名支解香。”詳見百結條。

【支蘭】狼牙委陵菜（薔薇科）*Potentilla cryptotaeniae* Maxim. 名見《本草綱目》。詳見抱牙條、牙子條。

【不死草】卷柏（卷柏科）*Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring 《滇南本草圖說》卷四：“石蓮花，一名不死草。生石岸上，似側柏葉形。氣味辛平。主治五臟邪氣、女子陰中寒熱痛、症瘕、血閉、結子。”詳見萬歲條。

【不死草】麥冬（百合科）*Ophiopogon japonicus* (L. f.) Ker - Gawl. 《廣群芳譜》卷九六：“麥門冬，一名藁冬，一名忍冬，一名忍凌，一名禹韭，齊名愛韭，秦名烏韭，楚名馬韭，越名羊韭，一名禹葭，一名禹餘糧，一名不死草，一名階前草，一名僕壘，一名隨脂，所在有之。”詳見羊韭條。

【不死藥】麥冬（百合科）*Ophiopogon japonicus* (L. f.) Ker - Gawl. 《植物名實圖考長編》卷七麥門冬：“《吳普本草》云：一名馬韭，一名藁火冬，一名忍冬，一名忍陵，一名不死藥，一名僕壘，一

名隨脂。”詳見羊韭條。

【不凋草】巴戟天（茜草科）*Morinda officinalis* How 《本草圖經》：“巴戟天生巴郡及下邳山谷，今江淮東州郡有之，皆不及蜀州者佳。葉似茗，經冬不枯，俗名三蔓草，又名不凋草。”詳見三蔓草條。

【犬牙】狼牙委陵菜（薔薇科）*Potentilla cryptotaeniae* Maxim. 名見《吳普本草》。詳見抱牙條、牙子條。

【巨句麥】瞿麥（石竹科）*Dianthus superbus* L. 名見《本草經》。詳見蘧麥條。

【巨苾】葛藟（葡萄科）*Vitis flexuosa* Thunb. 陸璣《詩疏》：“莫莫葛藟。藟，一名巨苾，似燕薹，亦延蔓生。”詳見千歲藥條。

【巨荒】葛藟（葡萄科）*Vitis flexuosa* Thunb. 名見《詩義疏》。詳見千歲藥條。

【巨勝】芝麻（胡麻科）*Sesamum indicum* L. 《廣雅疏證》卷一〇上：“《神農本草》云：胡麻一名巨勝，巨與鉅同。”詳見胡麻條。

【牙子】狼牙委陵菜（薔薇科）*Potentilla cryptotaeniae* Maxim. 狼牙委陵菜又稱狼牙、狼齒、狼子、犬牙、抱牙、支蘭等。《本草經》（草部下品）：“狼牙，味苦，寒，有毒。主治邪氣熱氣，疥癩惡瘍瘡痔，去白蟲。一名牙子。生川谷。”狼牙委陵菜學名中的 *Potentilla*，意為委陵菜屬；*cryptotaeniae* 意指隱帶的。狼牙委陵菜是多年生草本，高 30~60 厘米。根叢生；莖多直立，被長柔毛；基生葉為三出復葉，小葉橢圓形或橢圓狀卵形，長 2~7 厘米，寬 1~2.5 厘米，先端急尖，基部近圓形或寬楔形，邊緣有粗鈍鋸齒；聚傘圓錐花序頂生，花黃色，直徑約 1.2 厘米；瘦果卵形，褐色，光滑。分佈於黑龍江、吉林、遼寧、四川等省。生河谷、草甸、林邊、路旁。全草入藥，主治金瘡出

血、小便溺血、小兒陰瘡、毒蛇傷螫等。



牙子(狼牙委陵菜)

【牙石】五加(五加科) *Acanthopanax gracilistylus* W. W. Smith 《植物名實圖考長編》卷一九五加皮：“一名豺漆，一名豺節，一名牙石，一名豚榆，俗名追風使草，蜀中名白刺顛。”詳見豺漆條。

【比目】龍眼(無患子科) *Dimocarpus longan* Lour. 《本草綱目》卷三一龍眼：“《吳普本草》謂之龍目，又曰比目。”詳見益智條。

【互草】黃常山(虎耳草科) *Dichroa febrifuga* Lour. 《本草經》(草部下品)：“恒山，味苦，寒。主治傷寒寒熱，熱發溫瘧，鬼毒，胸中痰結，吐逆。一名互草。生川谷。”詳見恒山條。

【瓦花】瓦松屬(景天科) *Orostachys* spp. 名見《摘玄方》。《本草綱目》卷二一昨葉何草：“[附方]：牙齦腫痛。瓦花、白礬等分，水煎。敷之立效。《摘玄方》。”詳見昨葉何草條。

【瓦草】黏萼蠅子草(石竹科) *Silene viscidula* Franch. 黏萼蠅子草又稱滇白前、白前。《植物名實圖考》卷一〇滇白前：“《滇本草》：瓦草一名白前……”黏萼

蠅子草學名中的 *Silene*，來自[希]seilenos，神話中的神名；*viscidula* 意指稍有黏性的。黏萼蠅子草是多年生草本，全株被短柔毛。根簇生，圓柱形；莖俯仰，分枝，長達80厘米，上部被腺毛；葉片橢圓形，長3~6厘米，兩面微粗糙，被短柔毛；二歧聚傘花序大型，密被腺柔毛和黏液；花直徑10~12毫米，苞片卵狀披針形，花萼鐘形，密被腺柔毛，縱脈紫色，萼齒卵狀披針形，花瓣淡紅色，爪倒披針形，瓣片輪廓長圓形，深2裂，裂片狹長圓形，有時兩側各具1細齒，副花冠片長橢圓狀，雄蕊、花柱明顯外露；蒴果卵形；種子圓腎形，黑褐色。生於海拔1200~3200米的灌叢草地。分佈於四川、雲南、貴州、西藏。根入藥。



瓦草(黏萼蠅子草)

【止行】蒺藜(蒺藜科) *Tribulus terrestris* L. 名見《本草經》。詳見屈人條、茨條。

【少辛】細辛(馬兜鈴科) *Asarum sieboldii* Miq. 《本草綱目》卷一三細辛：“[釋名]小辛、少辛[頌曰]華州真細辛，根細而味極辛，故名之曰細辛。[時珍

曰]小辛、少辛，皆此義也。”詳見小辛條。

【日及】朱槿(錦葵科) *Hibiscus rosa-sinensis* L. 《廣群芳譜》卷三九扶桑：“東海日出處有扶桑樹，此花光艷照日，其葉如桑，因以比之。後人訛為佛桑，乃木槿別種，故日及諸名亦與之同。”詳見扶桑條。

【日及】木槿(錦葵科) *Hibiscus syriacus* Linn. 木槿又稱薜英、舜華、日給、愛老、重臺、花上花、朝開暮落花、藩籬草、花奴、王蒸、椴、櫬、朝菌、朱槿、赤槿等。



日及(木槿)

《本草綱目》卷三六木槿：“[時珍曰]此花朝開暮落，故名日及。曰槿曰薜，猶僅榮一瞬之義也。”木槿學名中的 *Hibiscus*，為[希]、[拉]植物原名，此為木槿屬；*syriacus* 意指敘利亞的。木槿是落葉灌木，高3~4米。葉卵圓形，長3~6厘米，寬2~4厘米，通常3裂；花單生葉腋，花冠紫紅、紅或白色等，直徑約5~6厘米；蒴果卵圓形，直徑12毫米，密生星狀絨毛。產於我國和印度。我國各地均有栽培，供觀賞，兼作綠籬。全株入藥，有清熱涼血、消腫解毒、利尿之功，樹皮治赤白帶下、腫痛及疥癬，花治痢疾；莖皮纖維供作造紙原料。

【日中金錢】午時花(梧桐科) *Pentapetes phoenicea* Linn. 《植物名實圖考》卷二七金錢花：“《酉陽雜俎》：金錢花本出外國，名曰毘尸沙，一名日中金錢，俗名翦金花。”詳見子午花條。

【日給】木槿(錦葵科) *Hibiscus syriacus* Linn. 《花鏡》卷三：“木槿，一名薜英，一名王蒸，又名日給、愛老、重臺、花上花諸名目。”詳見日及條。

【日精】菊花(菊科) *Dendranthema morifolium* (Ramat.) Tzvel. 《廣群芳譜》卷四八菊花：“菊，一名治穰，一名日精，一名節花，一名傅公，一名周盈，一名延年，一名更生，一名陰成，一名朱贏，一名帝女花。”詳見節華條。

【中庭花】渥丹(百合科) *Lilium concolor* Salisb. 又稱山丹、紅百合、渥丹花等。《廣群芳譜》卷四七山丹曰：“一種高尺許，花紅如珠砂，茂者一幹兩三花，花小於百合，無香，一名中庭花。其性與百合同，色可觀，根同百合，可食，味少苦。[注]按此即《花疏》所云渥丹也……”渥丹學名中的 *Lilium*，[拉]植物原名，[希]leiron 白百合[凱]li 白色，百合屬；*concolor* 同色的。渥丹是多年生草本，



中庭花(渥丹)

高40~60厘米。鱗莖卵球形，白色，具少數鱗片，鱗片卵形或卵狀披針形；葉條形，長3.5~7厘米，寬3~6毫米，脈3~7條；花1~5朵，總狀花序，花直立，星狀開展，深紅色，無斑點，有光澤，花被6片，披針形，長2.2~3.5厘米，不反捲，花柱短於子房；蒴果矩圓形。生山坡草叢或灌叢中。我國中北部山地多有分佈。鱗莖可食，亦入藥。

【中藥】越南槐（豆科）*Sophora tonkinensis* Gagnep. 名見《本草綱目》。詳見山豆根條。

【牛子蕉】芭蕉（芭蕉科）*Musa basjoo* Sieb. et Zucc. 《桂海虞衡誌》云：“芭蕉有數種，極大者凌冬不凋……味甘酸，有微霜，名芭蕉乾，又名牛子蕉。”詳見甘蕉條。

【牛毛黏】漆姑草（石竹科）*Sagina japonica* (Sw.) Ohwi 名見《植物名實圖考》。詳見瓜槌草條。

【牛爛柿】君遷子（柿科）*Diospyros lotus* L. 《古今注》：“牛爛柿即軟棗，葉如柿，子亦如柿而小。”司馬光《名苑》云：“君遷子似馬爛，即今牛爛柿也。”詳見軟棗條。

【牛爛柑】金橘（芸香科）*Fortunella margarita* (Lour.) Swingle 名見《花鏡》卷四金柑條。詳見盧橘條。

【牛爛橘】金橘（芸香科）*Fortunella margarita* (Lour.) Swingle 名見《遵生八箋》。詳見盧橘條。

【牛皮凍】鷄矢藤（茜草科）*Paederia scandens* (Lour.) Merr. 《植物名實圖考》卷一九牛皮凍：“牛皮凍，湖南園圃林薄極多。蔓生綠莖，長葉如臘梅花葉，濃綠光亮。”鷄矢藤學名中的 *Paederia*，來自 *paidor*，意惡臭；*scandens* 意指攀援的。鷄矢藤是蔓生草本，長3~5米。葉對生，卵形、橢圓形、矩圓形至披針形，頂

端急尖至漸尖，基部寬楔形、圓形至淺心形，無毛或下面稍被短柔毛，葉柄長1.5~7厘米，葉間托葉三角形，長2~3毫米；聚傘花序排成頂生帶葉的大圓錐花序，花白紫色，萼狹鐘狀，長約3毫米，花冠鐘狀，長7~10毫米，5裂，內面紅紫色，被粉狀柔毛，雄蕊5，着生於花冠筒內，子房下位，2室，花柱2枚；漿果球形，直徑5~7毫米。生於溪邊、河邊、路邊、林旁及灌木林中。廣佈於長江流域及南方各省區。根、全草、果實供藥用。



牛皮凍(鷄矢藤)

【牛皮菜】厚皮菜（藜科）*Beta vulgaris* L. var *cicla* L. 名見《滇南本草》。四川現在種的牛皮菜也較多。詳見蒼蓬菜條。

【牛耳大黃】皺葉酸模（蓼科）*Rumex crispus* L. 《草木便方》牛耳大黃：“活血，補精，壯力。能走表。搗爛合稠靛缸水，搽疥癬禿癩。”牛耳大黃學名中的 *Rumex*，[拉]植物原名，此為酸模屬；*crispus* 皺波狀的。皺葉酸模是多年生草本。根肥大，黃色，有酸味；莖高50~90厘米，通常不分枝，有淺槽；葉披針形或長圓狀披針形，長12~27厘米，寬2~4厘米，先端漸尖，基部漸狹，葉緣皺


縮，兩面無毛，托葉鞘，膜質，管狀，常破裂；花多數，數個生於葉腋的總狀花序形成圓錐狀花序，花兩性，花被 6，兩輪，宿存；瘦果橢圓形，具三稜，褐色有光澤。生於田邊濕地及水邊。分佈於黑龍江、遼寧、吉林、內蒙古、河北、山東、山西、陝西、甘肅、青海、四川、廣西、福建、臺灣等地。根、葉含鞣質，可制栲膠。根入藥，清熱涼血，化痰止咳，通便殺蟲等。



牛耳草(皺葉酸模)

【牛耳草】旋蒴苣苔(苦苣苔科) *Boea hygrometrica* (Bunge) R. Br. 旋蒴苣苔又稱翻魂草、石膽草。《植物名實圖考》卷一六牛耳草：“牛耳草生山石間。”又：“湖南謂之翻魂草，《滇本草》謂之石膽草。”旋蒴苣苔學名中的 *Boea*，來自人名 Beau Commerson(法)；*hygrometrica* 意指吸濕的。旋蒴苣苔是多年生草本。葉基生，蓮座狀，廣橢圓形至近圓形，長 1.8~7 厘米，寬 1.2~5.5 厘米，上面被白色長柔毛，下面被白色或淡褐色長絨毛，先端鈍，基部闊楔形，邊緣具不規則鈍圓齒；聚傘花序傘狀，具 2~5 花，花序梗長 10~18 厘米，被棕色短柔毛和腺狀柔毛，花萼鐘狀，5 裂，花冠淡藍紫色，長

8~13 毫米，發育雄蕊 2，退化雄蕊 3，極小，子房綫形，由 2 心皮組成；蒴果長圓形，螺旋狀捲曲。生於山石壁上。分佈於我國西南、中南以至北部。全草供藥用。



牛耳草(旋蒴苣苔)

【牛舌草】車前(車前科) *Plantago asiatica* L. 名見《本草綱目》。詳見芩苳條、芩苳條。

【牛舌菜】羊蹄(蓼科) *Rumex japonicus* Houtt. 名見《本草綱目》。詳見秃葉條、蓬條。

【牛舌頭花】倒提壺(紫草科) *Cynoglossum amabile* Stapf et Drumm. 倒提壺又稱狗屎花、一把抓、藍狗屎花、附地菜、狗舌花等。《植物名實圖考》卷一三附地菜：“附地菜生田野，比前一種葉長大有星。莖有微毛亦勁，開五圓瓣小碧花，結小蒴如鈴。雲南生者，葉柔厚毛多，茸茸如鼠耳，俗呼牛舌頭花，又名狗屎花，土醫用之。”倒提壺學名中的 *Cynoglossum*，來自希臘語的 *kyon*(狗)和 *glossa*(舌頭)；*amabile* 意為美麗的。倒提壺為多年生草本，高可達 50 厘米。根細長；莖圓柱狀紫綠色；根生葉具葉柄，葉片橢圓形或匙狀，全緣或波狀緣；

蝎尾狀總狀花序，頂生或腋生，花小，雄蕊 5，雌蕊 1；小堅果；花期 3~10 月份。喜生於山野、屋旁、路邊。主要分佈於雲南、四川、貴州、西藏等地。根可入藥，具清熱、止咳、生肌功效，可治療咳嗽、吐血、刀傷、失音等症。倒提壺也稱附地菜 *Twigonotis peduncularis* (Trev.) Benth. 但與附地菜不一個種。



牛舌頭花(倒提壺)

【牛李】鼠李(鼠李科) *Rhamnus davurica* Pall. 鼠李又稱鼠梓、棊、趙李、皂李、女兒茶、烏槎樹等。《本草衍義》：“鼠李，木高七八尺，葉如李，但狹而不澤，子於條上四邊生，熟則紫黑色，生則青，葉至秋則落，子尚在枝。”《本草綱目》：“鼠李生道路邊，其實附枝如穗，人採其嫩者取汁，刷染綠色。”《本經逢原》：“牛李，善解諸經伏匿之毒。”鼠李學名中的 *Rhamnus*，為鼠李屬；*davurica* 意為達呼里的。鼠李是落葉小喬木或灌木。葉對生於長枝或短枝上，葉片長卵圓形或闊倒披針形，單性花，雌雄異株；核果近毬形，成熟後紫黑色。生於山地雜木林中。全國大部分地區均有分佈。果實入藥具有清熱利濕、消積殺蟲之功效，主治水腫腹

脹、疝瘕、疥癬、齒痛等疾病。



牛李(鼠李)

【牛肚菘】白菜(十字花科) *Brassica pekinensis* Rupr. 《廣群芳譜》卷一四白菜：“《本草》最肥大者，名牛肚菘。”詳見菘條、白菘條。

【牛角花】百脈根(豆科) *Lotus corniculatus* L. 《植物名實圖考》卷二九：“牛角花生雲南平野。鋪地叢生，綠莖纖弱。”詳見栢脈根條。

【牛尾菜】白背牛尾菜(百合科) *Smilax nipponica* Miq. 《救荒本草》卷二牛尾菜：“牛尾菜，生輝縣鴉子口山野間，苗高二三尺，葉似龍鬚菜……”詳見大順筋藤條。

【牛尾蒿】矮蒿(菊科) *Artemisia lancea* Van. 《植物名實圖考》卷一二牛尾蒿並圖二：“牛尾蒿似白蒿，白葉莖蘆，科生，多者數十莖，可作燭，有香氣，故祭祀以脂蕪之為香。”矮蒿學名中的 *Artemisia*，來自[希]神話中的月亮和女神，此為蒿屬；*lancea* 意為披針形。矮蒿是多年生草本。主根細長，側根多；根狀莖略粗，莖多數，常叢生，高 80~150 厘米，具縱稜，褐色或紫紅色，中部以上有多數斜上分枝，幼時被微柔毛及白色腺點；基生葉

與下部葉，二回羽狀全裂，花期葉萎，中部葉長4厘米，寬2~3厘米，羽狀深裂，裂片2~3對，綫狀披針形，葉面綠色，葉背有灰白色短茸毛，上部葉小，條形；頭狀花序極多，排列成復穗狀，花紫紅色，內層兩性，外層雌性；小瘦果長圓形。生荒地。我國廣泛分佈。民間以此代艾，有散寒、溫經、消炎之效。《植物名實圖考》所記牛尾蒿還包括另一種亦稱牛尾蒿(*A. dubia* Wall.)。



牛尾蒿(矮蒿)

【牛尾蘊】杉葉藻(杉葉藻科) *Hippuris vulgaris* L. 名見《本草綱目》。詳見聚藻條。

【牛金子】赤楠(桃金娘科) *Syzygium buxifolium* Hook. et Arn. 《植物名實圖考》卷九牛金子：“牛金子，江西處處有之。”赤楠學名中的 *Syzygium*，來自[希]syzygois 愈合的；*buxifolium* 意指黃楊葉的。赤楠是灌木或小喬木，高1~6米。嫩枝有稜；葉革質，對生，偶有3片輪生，闊橢圓形至橢圓形，有時闊倒卵形，長1.5~3厘米，寬1~2厘米，先端鈍，基部楔形，全緣，下面有腺點，側脈多

而密，在上面不明顯，在下面稍突起，葉具短柄；聚傘花序長2~4.5厘米，有花數朵，萼倒圓錐形，裂片4，花瓣4，分離，雄蕊多數；漿果毬形，直徑6~10毫米，成熟時紫黑色，頂端冠以宿存萼檐，內有種子1顆。生於低山疏林或灌叢。分佈於安徽、浙江、臺灣、福建、江西、湖南、貴州等省區。根或根皮供藥用。



牛金子(赤楠)

【牛蝨鬼】百部(百部科) *Stemona japonica* (Bl.) Miq. 名見《閩東本草》。詳見野天門冬條。

【牛星草】雀麥(禾本科) *Bromus japonicus* Thunb. 名見《本草綱目》。詳見杜姥草條、薊條。

【牛屎柴】煙管莢蒾(忍冬科) *Viburnum utile* Hemsl. 名見《本草綱目》。詳見羊屎柴條。

【牛莖】牛膝(莧科) *Achyranthes bidentata* Bl. 《本草綱目》卷一六牛膝：“[釋名]牛莖、百倍、山莧菜、對節菜[弘景曰]其莖有節，似牛膝，故以為名。”詳見百倍條。

【牛烏】車前(車前科) *Plantago asiatica* L. 名見《醫林纂要》，並曰：“能解酒。”詳見芨苳條。

【牛勒】野薔薇(薔薇科) *Rosa* spp. 《本

草綱目》卷一八營實、牆藤：“[時珍曰]此草蔓柔靡，依牆援而生，故名牆藤。其莖多棘刺勒人，牛喜食之，故有山棘、牛勒諸名。”詳見營實條。

【牛菜】牛蒡(菊科) *Arctium lappa* L. 《救荒本草》卷四牛蒡子：“本草名惡實，未去萼名鼠黏子，俗名夜叉頭，根謂之牛菜。生魯山平澤，今處處有之。”詳見惡實條。

【牛脣】東方澤瀉(澤瀉科) *Alisma orientale* (Sam.) Juz. 《植物名實圖考長編》卷一三澤瀉：“《廣要》：《爾雅》賈，牛脣。郭注云：《毛詩傳》曰：水鳥也。”詳見水瀉條。

【牛蔓】茜草(茜草科) *Rubia cordifolia* L. 名見《植物名實圖考長編》。詳見茹蘆條、蒨條。

【牛棘】野薔薇(薔薇科) *Rosa* spp. 《廣群芳譜》卷四二：“薔薇，一名刺紅，一名山棘，一名牛勒，一外牛棘，一名買笑。藤身叢生，莖青多刺，喜肥，但不可多，花單而白者更香，結子名營實。”詳見營實條。

【牛筋】南燭(杜鵑花科) *Vaccinium bracteatum* Thunb. 南燭又稱烏飯草、烏草、猴藥、男續、後卓、惟那木、草木之王、猴菽、染菽、飽飯花、墨飯草。《植物名實圖考長編》卷二二南燭：“《嘉祐本草》……取汁炊飯，名烏飯，亦名烏草，亦名牛筋，言食之健如牛筋也。”又：“《圖經》……一名猴藥，一名男續，一名後卓，一名惟那木，一名草木之王。”又：“土人名之曰猴菽，或曰染菽……”南燭學名中的 *Vaccinium* 來自一種烏飯樹的古名，*bracteatum* 意指具苞片的。南燭是常綠灌木或小喬木，高 2~6 米。葉革質，卵狀橢圓形至狹橢圓形，長 3~6 厘米，寬 1~3 厘米，先端急尖，基部寬楔形，邊緣有細鋸齒；總狀花序，長 2~6 厘米，苞片大，宿存，花萼 5 淺裂，花冠白色，壺狀，5 淺裂，雄蕊 10，子房下位；漿果毬形，熟

時紫黑色。生於山坡、路旁或灌叢中。分佈於臺灣省、華東、華中、華南至西南。根、葉、果實供藥用。



牛筋(南燭)

【牛筋】具柄冬青(冬青科) *Ilex pedunculosa* Miq. 名見《詩疏》。詳見凍青條、柎條。

【牛蒡子】牛蒡(菊科) *Arctium lappa* L. 《本草綱目》卷一五惡實：“[頌曰]惡實即牛蒡子也，今處處有之。”詳見惡實條。


【牛遺】車前(車前科) *Plantago asiatica* L. 《名醫別錄》：“一名芨苳，一名蝦蟆衣，一名牛遺，一名勝鳥。生真定平澤丘陵阪道中，五月五日採，陰乾。”詳見芨苳條。

【牛薺】益母草(脣形科) *Leonurus artemisia* (Lour.) S. Y. Hu 《本草綱目》卷一五芨蔚：“按郭璞《爾雅注》云：薺即芨蔚，又名益母。葉似荏，白華，華生節間。又云：藺，方莖，葉長而銳，有穗，穗間有花紫縹色，可以為飲，江東呼為牛薺，據此則是薺、藺名本相同，但以花色分別之，其為一物無疑矣。”詳見薺條。

【牛藻】杉葉藻(杉葉藻科) *Hippuris vulgaris* L. 名見《爾雅》。詳見蒼條、聚藻條。

【毛召】韶子(無患子科) *Nephelium chryseum* Bl. 名見《陸川本草》。詳見韶條。

【毛建草】毛茛(毛茛科) *Ranunculus japonicus* Thunb. 毛茛又稱水茛、毛堇、天灸、自灸、猴蒜。《廣群芳譜》卷九七毛



毛建草(毛茛)

茛：“[本草綱目]毛茛，一名毛建草，一名水茛，一名毛堇，一名天灸，一名自灸，一名猴蒜。”毛茛學名中的 *Ranunculus*，來自 *rana*，即蛙的縮小形；*japonicus* 意指日本的。毛茛是多年生草本，全株被白色細長毛。鬚根多數，細柱狀；莖直立，高 30~70 厘米，中空，有槽；基生葉多數，葉片圓心形或五角形，長 3~6 厘米，寬 4~7 厘米，常 3 深裂，邊緣有粗齒或缺刻，葉柄長達 15 厘米，莖生葉具短柄或無柄；聚傘花序有多數花，具長柄，花直徑 2 厘米，萼片 5，花瓣 5，黃色，具蜜槽，雄蕊多數，心皮多數，離生；聚合果近毬形，直徑 6~8 毫米。生長於河溝及陰濕的草叢中。全國大部分地區有分佈。全草供藥用。

【毛荔支】韶子(無患子科) *Nephelium*

chryseum Bl. 名見《植物名實圖考》。詳見韶條、山韶子條。

【毛堇】毛茛(毛茛科) *Ranunculus japonicus* Thunb. 名見《本草綱目》。詳見毛建草條。

【毛脚茵】龍芽草(薔薇科) *Agrimonia pilosa* Ldb. 名見《植物名實圖考》。詳見瓜香草條。


【毛蓼】金綫草(蓼科) *Antenoron filiforme* (Thunb.) Roberty et Vautier 名見《植物名實圖考長編》卷八毛蓼。詳見白馬鞭條、重陽柳條。

【毛蕪】麻葉蕪麻(蕪麻科) *Urtica canabina* L. 名見蘇軾《分門集注杜工部詩》。詳見蕪草條。

【升推】蒺藜(蒺藜科) *Tribulus terrestris* L. 名見《本草經》。詳見茨條。

【升陽菜】薄荷(脣形科) *Mentha haplocalyx* Briq. 名見《滇南本草》，並曰：“治一切傷寒頭疼……”詳見菝蘭條。

【仁頻】檳榔(棕櫚科) *Areca catechu* L. 檳榔又稱椶、賓門、馬金南、大腹子、洗瘴丹、橄欖子、賓門藥錢等。《西溪叢語》：“《上林賦》云仁頻。《仙藥錄》云，檳榔一名仁頻。《林邑記》云：葉如甘蕉，頻音賓。《吳普本草》云：一名賓門。”檳榔學名中的 *Areca*，來自 *Areec*，為馬來語，檳榔俗名；另說來自印度馬拉巴爾地區的俗名；*catechu* 馬來語，兒茶俗名。檳榔莖直立，無分枝，喬木狀，高 10~20 米，有明顯的葉環痕；葉簇生於莖頂，長 1.3~2 米，羽狀全裂，裂片狹長披針形；雌雄同株，花序着生於最下面一片葉的基部，多分枝，呈圓錐花序式，長 25~30 厘米，有佛焰苞式大苞片，長倒卵形，上部着生雄花，下部着生雌花，雄花小，雌花大；果長圓形，長 3~5 厘米，橙黃色，中果皮厚；種子卵形。產雲南、海南及臺灣等地。種子入藥，可驅蟲、破積等。



仁頻(檳榔)

【化木香】化香樹(胡桃科) *Platycarya strobilacea* Sieb. et Zucc. 《植物名實圖考》卷三八化香樹：“化香樹，湖南處處有之。高丈餘，葉微似椿，有圓齒，如橡葉而薄柔……一名化木香，詹香也。”詳見必栗香條。

【介】芥菜(十字花科) *Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss. 《左傳》魯昭公二十五年：“季邠之鷄斗，季氏介其鷄，邠氏爲之金距，平子怒。”注：“搗芥子播其羽也。”詳見芥條。

【公公鬚】王瓜(葫蘆科) *Trichosanthes cucumeroides* (Ser.) Maxim. 名見《本草綱目》，並曰：“一葉之下一鬚，故俚人呼爲公公鬚。”詳見鈎條。

【公母草】鷄眼草(豆科) *Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl. 《植物名實圖考》卷一二鷄眼草：“江西田野中有之，土人呼爲公母草。”詳見掐不齊條。

【公孫樹】銀杏(銀杏科) *Ginkgo biloba* L. 《花鏡》卷四銀杏：“銀杏一名鴨脚子……其肌理甚細，可爲器具梁棟之用。又名公孫樹，言公種而孫始得食也。”詳

見鴨脚子條。

【月月紅】月季花(薔薇科) *Rosa chinensis* Jacq. 名見《本草綱目》。詳見長春花條、勝春條。

【月桂】天竺桂(樟科) *Cinnamomum japonicum* Sieb. 名見《本草綱目》。詳見山桂條。又有月桂(樟科) *Laurus nobilis* L. 名始見於《本草拾遺》。《本草綱目》卷三四月桂：“[時珍曰]吳剛伐月桂之說，起於隋唐小說。月桂落子之說，起於武后之時。相傳有梵僧自天竺鷲嶺飛來，故八月常有桂子落於天竺。”古代將此種與天竺桂混稱月桂。

【月記】月季花(薔薇科) *Rosa chinensis* Jacq. 名見《南越筆記》。詳見月貴條、勝春條。

【月貴】月季花(薔薇科) *Rosa chinensis* Jacq. 《植物名實圖考》卷二一月季：“按《南越筆記》：月貴花似荼靡，月月開，故名。月貴一名記，有深、淺紅二色。據此則月季乃月貴、月記之訛，宋子京原本當是月貴也。”詳見勝春條。

【月爾】紫萁(紫萁科) *Osmunda japonica* Thunb. 紫萁又稱迷蕨、紫蕨等。《本草綱目》卷二七蕨：“一種紫萁，似蕨有花而味苦，謂之迷蕨，初生亦可食，《爾雅》謂之月爾，三蒼謂之紫蕨。郭璞云：花繁曰爾。紫蕨拳曲繁盛，故有月爾之名。”紫萁學名中的 *Osmunda*，來自英語 *Osmunder* [薩克遜的神祇]；*japonica* 意指日本。紫萁是多年生草本。株高 50~100 厘米，根狀莖短；二回羽狀復葉，叢生，葉片三角狀廣卵形，葉柄長 20~30 厘米，小羽片長圓狀披針形，長 5~6 厘米，寬 1~2 厘米，邊緣有細鋸齒；孢子葉的小羽片狹，卷縮或綫形，長 1.5~2 厘米，沿背面中脈兩側密生孢子囊。生於林下、溪邊酸性土壤。分佈於我國溫帶及亞熱帶地區。嫩葉可食，根狀莖入藥，具有清熱、解毒、涼血之功效。



月爾(紫萁)

【丹荔】荔枝(無患子科) *Litchi chinensis* Sonn. 名見《本草綱目》卷三一。詳見離枝條。

【丹桤木】杉木(杉科) *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook. 《植物名實圖考》卷三三杉：“杉，《別錄》中品……疏：俗作杉……又沙木亦其類。有赤心者，《本草拾遺》謂之丹桤木。”詳見桤條。

【丹棘】萱草(百合科) *Hemerocallis fulva* L. 名見《古今注》。《本草綱目》卷一六萱草：“董子云：欲忘人之憂，則贈之丹棘，一名忘憂故也。”詳見蕔草條。

【丹楓】楓香樹(金縷梅科) *Liquidambar formosana* Hance 《花鏡》卷三楓：“其樹最高大，似白楊而堅，可作棟梁之材。葉小有三尖角，枝弱善搖……其脂名白膠香。一經霜後，葉盡皆赤，故名丹楓，秋色之最佳者。”詳見香楓條。

【丹黏子】莽吉柿(藤黃科) *Garcinia mangostana* L. 《齊民要術》：“多南子，出晉安。”即此果，興化呼為“丹黏子”，又名倒黏子。詳見都念子條、倒黏子條。

【印鉅】大戟(大戟科) *Euphorbia pe-*

kinensis Rupr. 《本草經》(草部下品)：“大戟，味苦，寒。主治蠱毒十二水。腹滿急痛，積聚，中風，皮膚疼痛，吐逆。一名印鉅。”詳見下馬仙條。

【六月柿】番茄(茄科) *Lycopersicon esculentum* Mill. 名見《廣群芳譜》。詳見蕃柿條。

【六月春】蓮(睡蓮科) *Nelumbo nucifera* Gaertn. 名見《類腋輯覽》。詳見菡萏條。

【六月凌】衛矛(衛矛科) *Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb. 《植物名實圖考》卷三三衛矛：“衛矛……湖南俚語謂之六月凌，用治腫毒。”詳見神箭條。

【六駁】豹皮樟(樟科) *Litsea coreana* Lévl. var. *sinensis* (Allen) Yang et P. H. Huang 《崔豹古今注》：“六駁，山中有木，葉似豫樟，皮多癩駁。”豹皮樟學名中的 *Litsea*, [中]李子，此為木薑子屬；*coreana* 朝鮮的；*sinensis* 中國的。豹皮樟是常綠喬木，莖高5~8米，或更高，樹皮灰褐色，有片狀剝落，呈鹿皮斑痕；葉互生，長圓形或披針形，先端多急尖，葉面光亮，長4.5~9.5厘米，寬1.5~4厘米；花單生，雌雄異株，傘形花序腋生，苞片4，交互對生，花被片6，卵形或橢圓形，外被柔毛；果實近毬形，直徑7~8毫米，果托扁平，果托上殘存花被裂片，果



六駁(豹皮樟)

熟時由紅變黑。生山地雜木林中。產於浙江、江蘇、河南、湖北、江西、福建等地。根入藥，治胃脘脹痛。過去將該種常與 *L. rotundifolia* Hemsl. var. *oblongifolia* (Nees) Allem 混淆，誤定為 *L. chinensis* Bl. 而豺皮樟樹皮無片狀剝落，無鹿皮斑痕，無殘留花被，果熟時藍黑色，具白粉，注意區別。

【文】烏木(柿樹科) *Diospyros ebum* Koen. 《文選·吳都賦》劉逵注：“文，文木也，材密緻無理，色黑，如水牛角。日南有之。”日南為古地名，指今越南順化一帶。詳見文木條。

【文木】烏木(柿樹科) *Diospyros ebum* Koen. 烏木又稱文、烏文木、烏楠木、豎木、翳木、豎木等。《南方草物狀》：“文木，樹高七八丈，其色正黑，如水牛角。作馬鞭。日南有之。”《本草綱目》卷三五烏木：“[釋名]烏楠木、烏文木[時珍曰]木名文木，南人呼文如世，故也。”烏木學名中的 *Diospyros*，來自[希]dios(神聖的)+pyros(穀物)，指柿樹屬；*ebum* 意指黑色的。烏木是常綠喬木。莖高7~10米，樹皮暗灰色，幼枝有細軟毛；單葉互生，葉長橢圓形，長5~11厘米，葉薄革質，柄長1厘米；花以4數合



文木(烏木)

成，雄花無柄，5~6朵簇生於短梗，萼杯狀，片短，雌花單生，萼片長，宿存；果毬形，赤黃色，直徑5厘米許。喜溫濕氣候。原產印度尼西亞和馬來半島，我國廣東亦有分佈。材質優良，黑重紋美有光澤，果可食用，果漆可作漁網和船具的塗料。

【文光果】文冠果(無患子科) *Xanthoceras sorbifolia* Bunge 《花鏡》卷四文官果，伊欽恒校注：“又名文光果(《群芳譜》)、崖木瓜(陝西)。”詳見文官果條。

【文希】輪葉沙參(桔梗科) *Adenophora tetraphylla* (Thunb.) Fisch. 名見《本草綱目》。詳見白參條。

【文林郎果】花紅(薔薇科) *Malus asiatica* Nakai 名見《洽聞記》。詳見聯珠果條、林檎條。

【文官】木芙蓉(錦葵科) *Hibiscus mutabilis* L. 《花鏡》卷三：“芙蓉，一名木蓮，又名文官、拒霜。”詳見拒霜花條。

【文官花】錦帶花(忍冬科) *Weigela florida* (Bunge) A. DC. 《廣群芳譜》卷五三錦帶花：“[杜詩注]錦帶花，一名海仙花，一名文官花，此花出荆楚間，有花如錦，遂名錦帶花。”詳見海仙條。


【文官果】文冠果(無患子科) *Xanthoceras sorbifolia* Bunge 文冠果又稱文冠花、崖木瓜、文光果等。《花鏡》卷四：“文官果產於北地。”伊欽恒校注：“現名文冠果……”文冠果學名中的 *Xanthoceras*，來自[希]xanthos(黃色的)+keras(角)，此為文冠果屬；*sorbifolia* 意為似花楸葉的。文冠果是落葉灌木或小喬木，高可達2~8米。小枝粗壯，褐紅色，有短茸毛；奇數羽狀復葉，互生，小葉9~19，膜質，長圓形至披針形，長2~6厘米，寬1~2厘米，邊緣具銳利鋸齒；花雜性，總狀花序，頂生或腋生，春季花序先葉抽出或與葉同時抽出，花瓣5，白色，基部內面有紫紅色斑點；蒴果綠色，長達3.5~

6 厘米；種子毬形，黑褐色而有光澤，徑約 1~1.8 厘米。產於我國北部和東北部。野生於山坡、溝谷間，各地也常栽培。種子可食，味似板栗，具較高營養價值。枝葉入藥，治風濕關節炎等。



文官果(文冠果)

【**文星草**】穀精草(穀精草科) *Eriocaulon buergerianum* Koern. 穀精草又稱流星草、戴星草等。《廣群芳譜》卷九六：“穀精草，一名文星草，一名戴星草，一名流星草。處處有之。收穀後生荒田中。”穀精草學名中的 *Eriocaulon*，來自[希] crion(毛)+kaulos(莖)，此為穀精草屬。穀精草是一年生草本。葉片長披針狀綫形，叢生於短的莖端，長 6~20 厘米，基部寬 3~6 毫米；花葶多，長短不一，簇



文星草(穀精草)

生，長達 25~30 厘米，頭狀花序近毬形，直徑 4~6 毫米，花白色，單性，雌雄花生於同一花序上；蒴果 3 裂，長約 1 毫米；種子長橢圓形，有毛茸。生於田野或沼澤地，我國分佈普遍，日本亦產。花穗供藥用，能祛風散熱、明目退翳，治多種眼病及頭痛、齒痛、喉痹等症。

【**文冠花**】文冠果(無患子科) *Xanthoxeranthoxylon sorbifolia* Bunge 《救荒本草》卷四：“文冠花，生鄭州南荒野間，陝西人呼為崖木瓜。”詳見文官果條。

【**文章草**】五加(五加科) *Acanthopanax gracilistylus* W. W. Smith 《花鏡》卷五：“文章草一名五加，生漢中及冤句，今近道皆有。”詳見豺漆條。

【**文章樹**】柘樹(桑科) *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bru. 名見《清異錄》。詳見柘條。

【**文無**】當歸(傘形科) *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels 當歸又稱乾歸、山蕲、白蕲、薛、蕲草等。《古今注》云：“牛亨問曰：將離別，相贈以芍藥者何？答曰：芍




文無(當歸)

藥一名可離，故將別以贈之。亦猶相招召，贈之以文無，文無亦名當歸也。”《本草綱目》卷一四當歸：“古人娶妻為嗣續也，當歸調血為女人要藥，有思夫之意，

故有當歸之名……”當歸學名中的 *Angelica*, 來自希臘語的 *angelus*, 意為安琪兒、小天使; *sinensis* 意為中國的。當歸為多年生草本。莖直立紫色; 葉卵形, 2~3 回單數羽狀分裂, 裂片邊緣有缺刻; 頂生復傘形花序, 花白色, 雄蕊 5 個; 果實橢圓形, 花期 6~7 月份, 果期 7~9 月份。喜冷涼濕潤氣候的高寒山區生長。我國各地均有栽培。根可入藥, 具補血和血、調經止血、潤燥滑腸功效, 可治療月經不調、崩漏、血虛頭痛、眩暈、便秘等症。

【文錢紅】錦地羅(茅膏菜科) *Drosera burmanni* Vahl 《陸川本草》文錢紅: “消炎、去腐。治小兒胎毒、喉爛、潰瘍。”詳見怎地羅條。

【文蘭樹】文殊蘭(石蒜科) *Crinum asiaticum* L. var. *sinicum* (Roxb. ex Herb.) Baker 文殊蘭又稱秦瓊劍。《植物名實圖考》卷三〇文蘭樹: “文蘭樹產廣東。葉如萱草而闊長, 白花似玉簪而小……”又: “土醫以其汁治腫毒。因有秦瓊劍諸俚名。”文殊蘭學名中的 *Crinum*, 來自[希] *krinon*, 意荷花; *asiaticum* 意指亞洲的。文殊蘭是多年生草本, 鱗莖長柱形。葉多數, 聚生於幹頂, 帶狀披



文蘭樹(文殊蘭)

針形, 長可達 1 米, 寬 7~15 厘米, 先端漸尖, 邊緣波狀, 基部抱莖; 花莖直立, 傘形花序頂生, 有花 10~24 朵, 總苞片長 6~10 厘米, 披針形, 小苞片狹綫形, 花高脚碟狀, 花被管纖細, 長 8~10 厘米, 綠白色, 裂片 6, 綫形, 雄蕊 6, 淡紅色, 子房下位, 3 室; 蒴果近球形, 直徑 5 厘米, 通常具種子 1 枚。野生於河邊、村邊、低窪地草叢中, 或栽植於庭園。分佈於福建、臺灣、廣東等省區。根及鱗莖、葉、果實供藥用。

【方莖】芝麻(胡麻科) *Sesamum indicum* L. 《本草綱目》卷二二胡麻條: “[釋名] 巨勝、方莖、狗蝨、油麻、脂麻。”詳見胡麻條。

【方賓】石龍芻(燈心草科) *Juncus effusus* L. var. *decepiens* Buchen. f. *utilis* Mark. 《新修》注: “[別錄] 云: ‘一名方賓。’”(今本無此文字。)詳見龍鬚條。

【方漬】黃花蒿(菊科) *Artemisia annua* L. 名見《本草經》。詳見臭蒿條、草蒿條。

【方蘭】建蘭(蘭科) *Cymbidium ensifolium* (L.) Sw. 名見《花鏡》卷六建蘭條。詳見墨蘭條。

【火母】八寶(景天科) *Hylotelephium erythrostictum* (Miq.) H. Ohba 名見《本草綱目》。詳見景天條、救火條。

【火把花】鈎吻(馬錢科) *Gelsemium elegans* (Gardn. & Champ.) Benth. 《本草綱目》卷一七鈎吻: 釋名火把花等, 並曰: “滇人謂之火把花, 因其花紅而性熱如火也。”詳見野葛條。

【火欏】益母草(唇形科) *Leonurus artemisia* (Lour.) S. Y. Hu 名見《經效產寶》和《本草綱目》。詳見菴條。

【火欏草】豨薟(菊科) *Siegesbeckia orientalis* L. 《救荒本草》卷一: “豨薟俗又呼火欏草。”又云: “救饑, 採嫩苗葉焯熟,

水浸去苦味，淘洗淨，油鹽調食。”詳見希仙條。

【火炊燈】八寶(景天科) *Hylotelephium erythrostictum* (Miq.) H. Ohba 名見《分類草藥性》。詳見景天條。

【火麻】大麻(桑科) *Cannabis sativa* L. 大麻又稱漢麻、黃麻、臬麻、牡麻、苴麻、苧麻、山絲苗等。《本草綱目》卷二二大麻、[釋名]火麻等，[時珍曰]：“大麻即今火麻，亦曰黃麻。處處種之，剝麻收子。有雌有雄：雄者為臬，雌者為苴。”大麻學名中的 *Cannabis*，來自[希]kannabis，大麻原名，此為大麻屬；*sativa* 栽培的。大麻是一年生草本。莖直立，高1~3米，有縱溝，密被短絨毛，莖皮纖維韌；掌狀復葉互生，或下部對生。小葉3~11，披針形至綫狀披針形，緣有粗齒，葉下面密被灰白色氈毛；花單性，雌雄異株，雄花序圓錐狀，花黃色，花被5，雌花叢生於葉腋，綠色；瘦果扁卵形，長4~5毫米，有細網紋，外有黃褐色苞片。喜溫暖氣候和沙質壤土。我國各地有栽培。莖皮纖維可用於紡織和制繩，種子榨油工業用。果仁入藥，潤燥滑腸，通淋活血。



火麻(大麻)

【火參】大黃(蓼科) *Rheum officinale* Baill. 《廣群芳譜》卷九七大黃：“[本草綱目]大黃，一名黃良，一名將軍，一名火參，一名膚如。”詳見將軍條。

【火蔥】藟頭(百合科) *Allium chinense* G. Don 名見《本草綱目》。詳見薤條、藟子條。

【火燄草】八寶(景天科) *Hylotelephium erythrostictum* (Miq.) H. Ohba 名見《植物名實圖考》。詳見景天條、八寶草條。

【火燄草】佛甲草(景天科) *Sedum lineara* Thunb. 名見《履巉巖本草》。詳見佛指甲條。

【火燄草】菟絲子(旋花科) *Cuscuta chinensis* Lam. 菟絲子又稱唐、蒙、唐蒙、玉女、兔蘆、菟縷、赤網、菟邱、菟藟、狐絲、金綫草、野狐絲、鴉蘿、復實、野狐漿草、無根金絲草、無根草、吐血絲等。《本草綱目》卷一八菟絲子：“按寧獻王《庚辛玉冊》云：火燄草即菟絲子，陽草也。多生於荒園古道。”菟絲子學名中的 *Cuscuta*，來自阿拉伯語的 kechout(菟絲子原名)，此為菟絲子屬；*chinensis* 意為中國的。菟絲子為一年生寄生草本。莖



火燄草(菟絲子)

纏繞，纖細黃色，直徑約1毫米；無綠色葉，但有鱗片葉；花序側生，幾朵或多朵簇生成小傘形花序，花白色，花冠短鐘

形；蒴果毬形，種子2~4粒，卵圓形；花期7~9月份，果期8~10月份。分佈於東北、河北、山西等十多個省區。多生於田邊、山坡陽處、路邊灌叢，常寄生於豆科、菊科植物上。種子可藥用，具清熱涼血功效，可治療吐血、黃疸等症。

【火燒草】佛甲草（景天科）*Sedum lineara* Thunb. 《履巉岩本草》：“火燒草不以多少，曬乾，為細末，每用少許，冷水調敷患處。”治湯燙火燒。詳見佛指甲條。

【心】柞櫟（殼斗科）*Quercus dentata* Thunb. 《植物名實圖考長編》卷一七櫟若：“《爾雅》：櫟，心。《注》：櫟，櫟別名。《疏》：櫟，一名心。”詳見櫟條。

【巴山虎豆】頭花黎豆（豆科）*Stizolobium capitatum* (Sweet) O. Ktze. 《植物名實圖考》卷一：“黎豆……細核其形，蓋即固始（縣名）所呼巴山虎豆也。”詳見黎豆條。

【巴且】蘘荷（薑科）*Zingiber mioga* (Thunb.) Rosc. 《植物名實圖考長編》卷九白蘘荷：“《廣韻》則云：尊苴，大蘘荷名。是又以大小分也。其實蘘荷，尊苴皆大名，後世說者多歧耳。或作獬且，或作巴且。”詳見嘉草條。

【巴椒】花椒（芸香科）*Zanthoxylum bungeanum* Maxim. 名見《本草綱目》。詳見檄條、蜀椒條。

【水蘘菜】紫堇（罌粟科）*Corydalis edulis* Maxim. 名見《本草圖經》。詳見蜀堇條。

【水三稜】香附子（莎草科）*Cyperus rotundus* L. 《本草綱目》卷一四莎草：“其葉似三稜及巴戟，而生下濕地，故有水三稜、水巴戟之名。俗人呼為雷公頭。”詳見莎草條。

【水木樨】散沫花（千屈菜科）*Lawsonia inermis* L. 《花鏡》卷五：“水木樨一名指甲。枝軟葉細，五六月開細黃花，頗類木

樨。”詳見指甲條。

【水巴戟】香附子（莎草科）*Cyperus rotundus* L. 名見《本草綱目》卷一四莎草條。詳見水三稜條、莎草條。

【水玉】半夏（天南星科）*Pinellia ternata* (Thunb.) Breit. 半夏又稱守田、地文、和姑、羊眼半夏、示姑、蝎子草。《廣群芳譜》卷九七半夏：“半夏，一名水玉，一名守田，一名地文，一名和姑。”又：“生平澤者甚小，名羊眼半夏。”半夏學名中的 *Pinellia*，來自人名 G. V. Pinelli (意)；*ternata* 意指三出數的。半夏是多年生小草本，高15~30厘米。塊莖圓毬形，葉柄長6~23厘米，在葉柄下部內側生一白色珠芽，一年生的葉為單葉，卵狀心形，2~3年後，葉為3小葉的復葉；肉穗花序，花序柄長於葉柄，佛焰苞綠色或綠白色，花單性，無花被，雌花着生在花序下部，雄花着生在雌花的上部，兩者間隔3毫米，花序中軸先端附屬物延伸呈鼠尾狀，長6~10厘米；漿果卵圓形，黃綠色。野生於山坡、溪邊陰濕的草叢中或林下。我國大部分地區有分佈。塊莖供藥用。



水玉(半夏)

【水旦】蓮（睡蓮科）*Nelumbo nucifera* Gaertn. 名見《廣群芳譜》。詳見菡萏

條、水芝條。

【水白】蘋(蘋科) *Marsilea quadri-
folia* L. 名見《名醫別錄》。詳見四葉菜條。

【水白】浮萍(浮萍科) *Lemnaceae* spp.
《名醫別錄》：“酸，無毒。主下氣。以沐
浴，生毛髮。一名水白，一名水蘇。生雷
澤池澤，三月採，暴乾。”多指紫萍和浮
萍。詳見青萍條、紫背浮萍條。

【水瓜】絲瓜(葫蘆科) *Luffa cylindri-
ca* (L.) Roem. 名見《嶺南採藥錄》。詳
見蠻瓜條。

【水芝】蓮(睡蓮科) *Nelumbo nucifera*
Gaertn. 《廣群芳譜》卷二九荷花：“荷為
芙蓉花，一名水芙蓉，一名水芝，一名水
芸，一名澤芝，一名水旦，一名水華。”詳
見菡萏條。

【水竹】淡竹(禾本科) *Phyllostachys*
nigra (Lodd.) Munro var. *henonis*
(Mitf.) Stapf ex Rendle 《本草綱目》卷
三七竹：“淡竹今人呼為水竹，有大小二
種，此竹汁多而甘。”詳見甘竹條。

【水芙蓉】蓮(睡蓮科) *Nelumbo nucif-
era* Gaertn. 名見《廣群芳譜》。詳見菡
萏條、水芝條。

【水芹菜】水芹(傘形科) *Oenanthe ja-
vanica* (Bl.) DC. 《滇南本草》卷上：“水
芹菜、大麥芽、車前子。水煎服。”治小兒
發熱，月餘不涼。詳見水蘄條。

【水皂角】雲實(豆科) *Caesalpinia se-
piaria* Roxb. 《植物名實圖考》卷二四雲
實：“雲實，《本經》上品，江西、湖南山坡
極多，俗呼水皂角……”詳見天豆條。


【水沉】沉香(瑞香科) *Aquilaria agal-
locha* Roxb. 名見《本草綱目》。詳見沉
水香條。

【水青】鼠尾草(唇形科) *Salvia japoni-
ca* Thunb. 名見《本草綱目》。詳見藜
條。

【水英】水芹(傘形科) *Oenanthe javan-*

ica (Bl.) DC. 名見《爾雅義疏》卷三。
詳見水蘄條。

【水松】松藻(松藻科) *Codium* spp.
《名醫別錄》：“水松葉如松，豐茸，食之，
主水腫，亦生海底。”松藻學名中的 *Co-
dium*，來自於希臘文，即為小毬。松藻作
水松的名字出現在古文獻中未提到產地，
所以可能是北方沿岸習見的刺松藻 *Codium*
fragile (Sur.) Hariot，也可能
指南方沿岸習見的 *C. cylindricum*。現
以刺松藻為例敘述。刺松藻藻體黑綠色，
海綿質，富汁液，幼體被覆白色絨毛，
老時脫落，高10~30厘米。固着器為盤
狀或皮殼狀，自基部向上叉狀分枝，越向
上分枝越多。枝圓柱狀，直立，腋間狹
窄，上部枝較下部細，頂端鈍圓，枝徑
1.5~5.0毫米。整個藻體為一個分枝
很多、管狀無隔膜的多核細胞所組成。
生長在中及低潮帶巖石上或石沼中，常
大量地集生在一起。為我國黃、渤海沿
岸習見的海藻，東海較少，為泛暖溫帶性
藻類。可作副食品，可鮮吃或作佐料。
《本草綱目》認為“氣味甘”、“鹹寒無毒”，
具催生、治水腫的功用。



水松(刺松藻)

【水苳】毛苳(毛苳科) *Ranunculus ja-
ponicus* Thunb. 名見《本草綱目》。詳見

毛建草條。

【水胡椒】茵茵蒜(毛茛科) *Ranunculus chinensis* Bunge 茵茵蒜又稱回回蒜、蠍虎草等。《救荒本草》卷二回回蒜：“一名水胡椒，又名蠍虎草，生水邊下濕地。苗高一尺許，葉似野艾蒿而硬，又甚花叉，又似前胡葉頗大，亦多花叉，苗莖梢頭開五瓣黃花，結穗如初生桑椹子而小，又似初生蒼耳實亦小，色青，味極辛辣，其葉味甜。”茵茵蒜學名中的 *Ranunculus*，來自 *Rana*，蛙的縮小形，此為毛茛屬；*chinensis* 意指中國的。茵茵蒜是一年生草本。鬚根多數簇生；莖直立粗壯，高20~70厘米，中空，有縱條紋，莖與葉柄有淡黃色糙毛；三出復葉，基生葉與下部葉具長柄，葉片寬卵形，小葉2~3深裂，兩面伏生糙毛；花序具疏花，花梗有糙毛，萼片5，淡綠色，船形，花瓣5，黃色，寬倒卵形，基部有蜜槽；聚合果長圓形，瘦果扁平。生溪邊濕地。全國分佈。全草入藥，消炎退腫。



水胡椒(茵茵蒜)

【水香】佩蘭(菊科) *Eupatorium fortunei* Turcz. 《本草綱目》卷一四蘭草：“[釋名]蘭、水香、香水蘭、女蘭、香草、燕

尾香、大澤蘭、煎澤草、蘭澤草、省頭草、都梁香、孩兒菊、千金草[志曰]……時人煮水以浴，療風，故又名香水蘭。”詳見蘭條。

【水香稜】香附子(莎草科) *Cyperus rotundus* L. 名見《廣群芳譜》卷九五香附子條。詳見草附子條、莎草條。

【水泉】圓葉節節菜(千屈菜科) *Rotala rotundifolia* (Buch. - Ham. ex Roxb.) Koehne 圓葉節節菜又稱水莧菜。《陸川本草》水泉：“甘，寒。”圓葉節節菜學名中



水泉(圓葉節節菜)

的 *Rotala*，來自[拉] *rota*，車輪的縮小形，此為節節菜屬；*rotundifolia* 圓形葉的。圓葉節節菜是一年生草本，常叢生，各部無毛。根莖細長，匍匐而生，莖單一或稍分枝，高5~30厘米，帶紫紅色；葉對生，通常近圓形，罕有倒卵狀橢圓形，長5~10毫米，側脈4對；花極小，長約2毫米，單生於苞片內，形成數個稠密的穗狀花序，花序長1~4厘米，花瓣4，倒卵形，淡紫紅色；蒴果橢圓形，3~4瓣裂。生水田中及池沼或極潮濕的地方。分佈於江南各省區，是南方水稻田的主

要雜草之一。全草入藥，清熱、利尿、消腫、解毒，亦可作豬飼料。

【水前胡】前胡（傘形科）*Peucedanum praeruptorum* Dunn 前胡又稱姨媽菜、羅鬼菜。《植物名實圖考》卷八前胡：“雩婁農曰：前胡有大葉、小葉二種，黔滇山人采以為茹，曰水前胡，俗呼姨媽菜，方言不可譯也。”又：“又按黃元治《黔中雜記》云：柴胡英似野芹，土人採而齋之，謂之羅鬼菜，方言前與柴音相近，蓋未考矣。”前胡學名中的 *Peucedanum*，來自[希] *peuce*（松樹）與 *danos*（低矮）；*praeruptorum* 意指岩壁的。前胡是多年生草本，高0.6~1米。根圓錐形；莖直立，上部分枝；基生葉和下部葉具長柄，基部有寬鞘，葉片寬卵形或三角狀卵形，三出式二至三回分裂；復傘形花序，傘幅6~15，總苞片綫形，小總苞片卵狀披針形，小傘形花序有花15~20，花白色；雙懸果橢圓形或卵形。生於向陽山坡草叢中。分佈於華東、華中、四川。根供藥用。



水前胡(前胡)

【水紅】紅蓼（蓼科）*Polygonum orientale* L. 《植物名實圖考長編》卷九紅草：

“《圖經》：葑草即水紅也，舊不著所出州郡，云生水傍，今所在下濕地，皆有之。”詳見鴻藹條。

【水華】紫萍（浮萍科）*Spirodela polyrrhiza* (L.) Schleid. 名見《神農本草經》卷下。詳見水萍、紫背浮萍條。

【水華】蓮（睡蓮科）*Nelumbo nucifera* Gaertn. 名見《群芳譜》。詳見菡萏條、水芝條。

【水莧菜】圓葉節節菜（千屈菜科）*Rotala rotundifolia* (Buch. — Ham. ex Roxb.) Koehne 《草木便方》水莧菜：“利濕，清熱，消癰腫，解熱毒，一切火毒。治湯火傷，淋病，痢疾，痔腫。”此種不是同科植物水莧菜（*Ammannia baccifera* L.）。詳見水泉條。

【水莎】香附子（莎草科）*Cyperus rotundus* L. 名見《植物名實圖考長編》卷一二莎草條。詳見三稜草條、莎草條。

【水硫黃】芡實（睡蓮科）*Euryale ferox* Salisb. ex Kenig & Sims 《廣群芳譜》卷六六芡：“《孫公談圃》云：芡甘滑可食，名為水硫黃，詳見《東坡雜記》。”詳見鷄頭條。

【水浚】知母（百合科）*Anemarrhena asphodeloides* Bge. 名見《本草經》草部中品知母。詳見甞母條。

【水堇】石龍芮（毛茛科）*Ranunculus sceleratus* L. 《本草綱目》卷一七石龍芮：“[藏器曰]《爾雅》云：芟，堇草。注云：烏頭苗也。蘇恭注天雄亦云：石龍芮葉似堇草，故名水堇。據此則堇草是烏頭苗，水堇定是石龍芮，更非別草也。”詳見地椹條。

【水黃芹】羊蹄（蓼科）*Rumex japonicus* Houtt. 名見《本草綱目》。詳見禿葉條、蓬條。

【水菖蒲】菖蒲（天南星科）*Acorus calamus* L. 《花鏡》卷六菖蒲，伊欽恒校注，

菖蒲：“又名白菖、水菖蒲（《名醫別錄》）。”詳見昌陽條。

【水萍】紫萍（浮萍科）*Spirodela polyrrhiza* (L.) Schleid. 《神農本草經》卷下：“水萍，味辛寒。主治暴熱身癢，下水氣，勝酒，長鬚髮，止消渴。久服輕身。一名水華。生地澤。”詳見紫背浮萍條。

【水萍】慈姑（澤瀉科）*Sagittaria sagittifolia* L. 名見《本草綱目》。詳見藉姑條。

【水薺菜】東方澤瀉（澤瀉科）*Alisma orientale* (Sam.) Juz. 《救荒本草》卷一：“澤瀉，俗名水薺菜，一名水瀉，一名及瀉，一名芒芋，一名鵠瀉。”詳見水瀉條。

【水麻】石蒜（石蒜科）*Lycoris radiata* (L'Her) Herb. 石蒜又稱蒜頭草、溴波酸、金燈花等。《本草圖經》：“水麻，生鼎州。其根名石蒜，九月採。”石蒜學名中的 *Lycoris* 指石蒜屬，來自古羅馬的女演員 *Lycoris* 的名字；*radiata* 放射狀的，意指石蒜的傘形花序呈輻射狀。石蒜是多年生草本植物。鱗莖闊橢圓形，或近毬形，外被紫褐色鱗葉，直徑約 1.5~4 厘米；葉叢生，綫形或帶狀，長 15~30 厘




水麻(石蒜)

米，寬 1~2 厘米；傘形花序，有 4~6 朵花，花兩性，通常為紅色，苞片膜質，棕褐色，披針形，花被下有短管，上部 6 裂片排成 2 列，狹披針形，長約 4 厘米，向背反捲，雄蕊 6 枚，長於花被裂片，子房下位，3 室，花柱纖弱，很長；蒴果背裂，種子多數。生於山地陰濕處或路邊、林緣。分佈於河南、陝西及華東、華南、西南各地。以鱗莖入藥，有祛痰、利尿、解毒、催吐之功效。

【水參】知母（百合科）*Anemarrhena asphodeloides* Bge. 名見《本草經》草部中品知母。詳見連母條、甌母條。

【水葵】苔菜（龍膽科）*Nymphoides peltatum* (Gmel.) O. Kuntze 名見《本草綱目》。詳見接余條、鳧葵條。




水葵(莼菜)

【水葵】莼菜（睡蓮科）*Brasenia schreberi* J. F. Gmel. 莼菜又稱茆、蓴、孽、露葵、馬蹄草、錦帶、缺盆草等。《植物名實圖考長編》卷一三蓴條：“陸璣《疏》：茆與苕菜相似，葉大如手，赤圓……葉可以生食，又可齏，滑美。江南人謂之蓴菜，或謂之水葵，諸陂澤水中皆有。”莼菜學名中的 *Brasenia*，來自拉丁語中的 *Brasen*（人名）。莼菜為多年水生草本。根狀莖，橫臥於水底泥中；葉橢圓狀浮於水面，長 5

~10 厘米，寬 3~6 厘米，全緣無毛；花單生於花梗頂端，暗紫色，徑 1~2 厘米，花藥條形，長 4 毫米；堅果革質不裂，1~2 顆種子，卵形；花期 6 月份，果期 10~11 月份。分佈於江蘇、浙江、江西、湖南、雲南等省區，東南亞亦有分佈。多生於池塘、湖沼、河流。嫩葉可食用又可藥用，莖葉搗爛可治療癰疔。

【水粟】萍蓬草（睡蓮科）*Nuphar pumilum* (Hoffm.) DC. 《本草綱目》卷一九萍蓬草：“[時珍曰]陳藏器《拾遺》萍蓬草，即今水粟也。”萍蓬草學名中的 *Nuphar*，來自[非]neufar 植物原名；*pumilum* 意指矮小的。萍蓬草是多年生水生草本，根狀莖粗，橫卧。葉漂浮，寬卵形或卵形，長 6~17 厘米，寬 6~12 厘米，先端圓鈍，基部深心形，上面光亮，下面紫紅色，密生細毛，葉柄長 20~50 厘米，有柔毛；花單生在花梗頂端，漂浮於水面，直徑 3~4 厘米，萼片 5，革質，黃色，外面中央綠色，橢圓狀卵形，長 1~2 厘米，花瓣小，多數，窄楔形，長 5~7 毫米，先端微凹，雄蕊多數，子房上位，柱頭盤狀，常 10 淺裂；漿果卵形，長 3 厘米；種子多數，粟米狀，褐色。生於池沼、河流等淺水中。分佈於華東、華南、西



水粟(萍蓬草)

南、東北等地。根莖、種子供藥用。

【水楊】紅皮柳（楊柳科）*Salix sinopurpurea* C. Wang et Ch. Y. Yang 紅皮柳又稱蒲柳、青楊、蒲移、蒲楊、移柳、葍苻等。《本草綱目》卷三五水楊：“楊枝硬而揚起，故謂之楊。多宜水涘蒲萑之地，故有水楊、蒲柳、葍苻之名。”紅皮柳學名中的 *Salix*，在拉丁語中為柳樹的古名，來自凱爾特語的 sal(意為近)和 lis(意為水)，指該植物喜生於水邊濕地，有



水楊(紅皮柳)

的認為 *Salix* 來自拉丁語的 *salio*，意為跳躍、跳動，意指該植物生長迅速；*sinopurpurea* 拉丁文意指中國型紫色的。紅皮柳為落葉灌木。高 3~4 米，小枝黃綠色無毛；葉披針形長 5~10 厘米，寬 1~1.2 厘米，對生或斜對生；花期 4~5 月份，花先葉開放，花序圓柱形；果期 5~6 月份，蒴果 2 裂。主要分佈於甘肅、陝西、山西、河北、河南、湖北等地。常生長於山地灌木叢或河邊、湖邊。枝葉、樹皮、根可入藥，可治療久痢赤白、金瘡痛楚、乳癰諸腫等症。該種有學者認為是細柱柳(*S. gracilistyla* Mig.)，存以備考。

【水楊柳】細葉水團花（茜草科）*Adina rubella* Hance 細葉水團花又稱簸箕柳。

《植物名實圖考》卷三七水楊柳：“水楊柳，叢生水濱，高二三尺，長葉對生，似柳而細。莖柔可編筐筥。光州謂之簸箕柳，水農種之。”細葉水團花學名中的 *Adina*，來自[希] *adinos* 密集，指花密集成頭狀；*rubella* 意指淡紅色的。細葉水團花是落葉小灌木，高 1~1.5 米。小枝紅褐色，被柔毛；葉對生，卵狀披針形或卵狀橢圓形，長 3~4 厘米，寬 1~2.5 厘米，先端漸尖，基部闊楔形，全緣，托葉 2 深裂，早落；頭狀花序單一，腋生或頂生，盛開時直徑 1.5~2 厘米，花序梗長 2~5 厘米，花萼 5 裂，花冠管狀，5 裂，紫紅色，上部有黑色的點，雄蕊 5，子房下位；蒴果長 4 毫米。生於溪邊、河邊等濕潤的地方。分佈於長江以南各省區。根、莖、葉或花果序供藥用。



水楊柳(細葉水團花)

【水楊梅】路邊青(薔薇科) *Geum alep-picum* Jacq. 又稱地椒。《本草綱目》卷一六水楊梅：“[時珍曰]生水邊，條葉甚多，生子如楊梅狀。《庚辛玉冊》云：地椒一名水楊梅，多生近道陰濕處，荒田野中亦有之。”路邊青學種名 *Geum*，來源於希臘文，意為有風味。路邊青為多年生草本。鬚根簇生；莖直立，高 30~100 厘米，被開展粗硬毛；基生葉為大頭羽狀復葉，通常有小葉 2~6 對，莖生葉羽狀復葉，頂生小葉披針形或倒卵披針形，頂端



水楊梅(路邊青)


漸尖，基部楔形其他小葉變化甚大，有明顯的托葉；花序頂生，疏散排列，花直徑 1~1.7 厘米，兩性，花基數 5，花瓣黃色，幾圓形，萼片卵狀三角形，副萼片披針形，聚合果倒卵形，瘦果被長硬毛，頂端有小鈎，花果期 7~10 月份。生山坡草地、溝邊、地邊。

【水慈菰】慈姑(澤瀉科) *Sagittaria sagittifolia* L. 《救荒本草》卷四水慈菰：“俗呼為剪刀草，又名箭搭草，生水中。其莖面窠背方，背有綫楞。其葉三角，似剪刀形，葉中攏生莖叉梢間開三瓣白花黃心，結青蓇葖如青楮，桃狀頗小。”詳見藉姑條。

【水蔦】東方澤瀉(澤瀉科) *Alisma orientale* (Sam.) Juz. 《毛詩傳》：“水蔦也，如蕒斷，寸寸有節，拔之可復。”《詩疏》：“璣以為今澤蔦也。”詳見水瀉條。

【水槐】苦參(豆科) *Sophora flavescens* Alt. 苦參又稱苦蕒、苦骨、地槐、菟槐、驕槐、野槐、白莖、虎麻、岑莖、綠白、陵郎等。《本草圖經》云：“苦參生汝南山谷及田野，今近道處處皆有之。其根黃色，長五七寸許，兩指麓細。三五莖並生。苗高三四尺已來。葉碎青色，極似槐葉，故又有水槐名。”學名中的 *Sophora*，來自

阿拉伯語的 *sophera* (具蝶形花的植物原名), 意為槐屬; *flavescens* 意為淡黃色的。苦參為亞灌木。高 55~130 厘米, 莖具紋稜, 幼枝草本狀; 單數羽狀復葉, 互生, 橢圓形、卵形或披針形; 頂生總狀花序, 雄蕊 10 個, 雌蕊 1 個; 莢果綫形, 種子 3~7 枚, 黑色毬形; 花期 5~7 月份, 果期 7~9 月份。喜溫和氣候和砂質土壤。我國各地均有分佈。莖、根可入藥, 具清熱、利尿、燥濕、養肝、安五臟功效, 可以治療便血、滑精等症。



水槐(苦參)

【水對菜】蘋(蘋科) *Marsilea quadrifolia* L. 名見《陸川本草》。詳見四葉菜條。

【水辣菜】牡蒿(菊科) *Artemisia japonica* Thunb. 《救荒本草》卷二水辣菜: “生水邊下濕地中, 苗高一尺餘, 莖圓, 葉似鷄兒腸葉, 頭微齊短, 又似馬蘭頭葉, 亦更齊短, 其葉播莖生, 梢間出穗, 如黃蒿穗, 其葉味辣。”詳見蔚條。

【水蕒】水芹(傘形科) *Oenanthe javanica* (Bl.) DC. 水芹又名芹、楚葵、水英、芹菜、水芹菜等。《爾雅義疏》卷三: “芹, 水菜也。本草, 水蕒, 藉, 一名水英。《蜀本草》注云, 芹生水中, 葉似芎藭。”水芹學名中的 *Oenanthe*, 來源於希臘文, 意為



水蕒(水芹)

酒花; *javanica* 意為爪哇的, 即描述其模式標本產地。水芹為多年生濕生或水生草本, 高 15~80 厘米。莖直立或基部匍匐; 基生葉有柄, 柄長達 10 厘米, 基部有葉鞘, 葉片輪廓三角形, 1~2 回羽狀分裂, 末回裂片卵形至菱狀披針形, 長 2~5 厘米, 寬 1~2 厘米, 邊緣有牙齒或圓齒狀鋸齒, 莖上部葉無柄, 裂片或基生葉的裂片相似, 較小; 復傘形花序頂生, 花序梗長 2~16 厘米, 無總苞, 傘幅 6~16, 不等長, 長 1~3 厘米, 直立和展開, 小總苞片 2~8, 綫形。小傘形花序有花 20 餘朵, 萼齒綫狀披針形, 長與花柱基相等, 花瓣白色, 倒卵形, 有一長而內折的小舌片, 花柱基圓錐形, 花柱直立或兩側分開; 果實近於四角狀橢圓形或筒狀長圓形, 側稜較背稜和中稜隆起, 木栓質, 分生果橫剖面近於五邊狀的半圓形, 每枝槽內油管 1, 合生面油管 2。花期 6~7 月份, 果期 8~9 月份。多生於淺水近窪地方或沼池、水溝旁, 農舍附近常見栽培。產我國各地。莖葉可作蔬菜食用。全草入藥, 清熱, 利水, 治暴熱煩渴、黃疸、水腫、淋病、帶下、癩癧、疥癩, 有降低血壓的功效。

【水芸】蓮(睡蓮科) *Nelumbo nucifera* Gaertn. 名見《廣群芳譜》。詳見菡萏條、水芝條。

【水劍草】菖蒲(天南星科) *Acorus calamus* L. 《廣群芳譜》卷八八：“菖蒲，一名昌陽，一名昌歌，一名堯韭，一名蓀，一名水劍草。”詳見昌陽條。

【水錦花】密蒙花(馬錢科) *Buddleja officinalis* Maxim. 密蒙花又稱羊耳朵、蒙花。《本草綱目》卷三六密蒙花：“[釋名]水錦花[時珍曰]其花繁密蒙茸如簇錦，故名。”密蒙花學名中的 *Buddleja*，來自人名 A. Buddle，英國植物學家；*officinalis* 意指藥用的。密蒙花是落葉灌木，高1~4米，小枝略呈四稜形，密被灰白色絨毛。葉對生，狹橢圓形至綫狀披針形，長4~19厘米，寬2~8厘米，先端漸尖，基部楔形，全緣或有小鋸齒，被星狀毛，葉柄長2~20毫米，托葉在兩葉柄基部之間縮成一橫綫；聚傘圓錐花序頂生，長5~15厘米，密被灰白色柔毛，花萼先端4裂，花冠淡紫色至白色，先端4裂，雄蕊4，着生於花冠筒中部，子房頂端被星狀短絨毛；蒴果橢圓狀。種子多數，具翅。生於山坡、丘陵、



水錦花(密蒙花)

河邊的灌木叢或草叢中。分佈於陝西、甘肅、西南、中南等省區。花供藥用。

【水薑薑】石龍芮(毛茛科) *Ranunculus sceleratus* L. 名見《吳普本草》。詳見地椹條。

【水燈心】燈心草(燈心草科) *Juncus effusus* L. 《植物名實圖考》卷一四燈心草條：“燈心草，《開寶本草》始著錄……俚醫謂之水燈心，蓋野生者，性尤清涼。”詳見虎鬚草條。

【水藍】木藍(豆科) *Indigofera tinctoria* L. 名見《嶺南採藥錄》。詳見槐藍條。

【水蘊】杉葉藻(杉葉藻科) *Hippuris vulgaris* L. 名見《本草綱目》。詳見聚藻條。

【水瀉】東方澤瀉(澤瀉科) *Alisma orientale* (Sam.) Juz. 東方澤瀉又稱蕒、水蔞、瀘、瀘、蔞、及瀉、牛脣、澤芝、芒芋、鵠



水瀉(東方澤瀉)

瀉、禹孫、澤蔞、水蔞菜等。《本草綱目》卷一九澤瀉：“[釋名]水瀉、鵠瀉、及瀘、瀘、芒芋、禹孫[時珍曰]去水曰瀉，如澤水之瀉也。禹能治水，故曰禹孫。”東方澤瀉學名中的 *Alisma*，來自[希]植物原名，*alis* 水，此為澤瀉屬；*orientale* 意指東方的。東方澤瀉是多年生水生草本。

塊莖，毬形，直徑1~2厘米，大達4.5厘米，外皮褐色，密生多數鬚根；葉根生，多數，挺水葉寬披針形至橢圓形，葉脈5~7條，長3~11厘米，寬1.3~6.8厘米，柄長，基部鞘狀；花葶直立，高35~90厘米，花序長20~70厘米，花兩性，外輪被片3，內輪花被3，花瓣狀，白色、淡紅色；瘦果橢圓形。生沼澤或栽培。全國各地有分佈。毬莖入藥，清熱、利水、滲濕。古代常將澤瀉(*A. Plantago-aquatica* L.)混雜入藥，因二者外形相似，藥效同。

【水蘇】蘋(蘋科) *Marsilea quadrifolia* L. 《名醫別錄》云：“酸，無毒。主下氣，以沐浴，生毛髮。一名水白，一名水蘇。”詳見四葉菜條。

【水蘇】浮萍(浮萍科) *Lemnaceae* spp. 名見《名醫別錄》。詳見水白條、紫背浮萍條、青萍條。

【水蘇】芥菜(十字花科) *Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss. 《齊民要術》：“《吳氏本草》云：芥菹一名水蘇，一名勞祖。”詳見芥條。

【水鏡草】苔菜(龍膽科) *Nymphoides peltatum* (Gmel.) O. Kuntze 名見《土宿本草》。詳見接余條、鳧葵條。

【水蟻草】鼠曲草(菊科) *Gnaphalium affine* D. Don. 名見《植物名實圖考》。詳見鼠耳草條。

【水簾】浮萍(浮萍科) *Lemnaceae* spp. 《廣群芳譜》卷九一萍：“萍，一名水花，一名水白，一名水簾，一名藻。”多指紫萍和浮萍。詳見紫背浮萍條和青萍條。

【水鬚】知母(百合科) *Anemarrhena asphodeloides* Bge. 名見《名醫別錄》。詳見兒草條、甌母條。

五 畫

【卬巨】大戟(大戟科) *Euphorbia pekin-*

ensis Rupr. 《本草綱目》卷一七大戟：“郭璞注《爾雅》云，蒿，卬巨，即大戟也。”詳見下馬仙條。

【艾子】樗葉花椒(芸香科) *Zanthoxylum ailanthoides* Sieb. et Zucc. 《本草圖經》：“食茱萸，南北皆有之。其木變甚高大，有長及百尺者，枝差青黃，有小白點，葉正類油麻，花黃。蜀人呼其子艾子。”詳見食茱萸條。

【艾菊】旋覆花(菊科) *Inula japonica* Thunb. 《廣群芳譜》卷四七：“滴滴金，一名夏菊，一名艾菊，一名旋覆花，一名疊羅金。”詳見金沸草條。

【艾蒿】艾(菊科) *Artemisia argyi* Lévl. et Vant. 名見《本草綱目》。詳見黃草條、冰臺條。

【玉女】菟絲子(旋花科) *Cuscuta chinensis* Lam. 《名醫別錄》：“一名菟縷，一名唐蒙，一名玉女，一名赤綱，一名菟蘘。生朝鮮川澤田野，蔓延草木之上。”詳見火燄草條。

【玉朮】玉竹(百合科) *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce 名見《滇南本草》。詳見葳參條。

【玉札】地榆(薔薇科) *Sanguisorba officinalis* L. 名見《齊民要術》。詳見玉豉條。

【玉米】玉蜀黍(禾本科) *Zea mays* L. 名見《廣群芳譜》。詳見玉高粱條。

【玉芙蓉】素馨花(木犀科) *Jasminum officinale* L. var. *grandiflorum* (L.) Kobuski 《花鏡》卷六：“素馨花，一名那悉茗花，俗名玉芙蓉。”詳見耶悉茗花條。

【玉門精】天名精(菊科) *Carpesium abrotanoides* L. 天名精又稱天門精、麥句薑、蝦蟇藍、豕首、劉儻草、甌顛、蟾蜍蘭、覲、天蔓菁、地菘、天蕪菁、豨薺、鹿活草、莖菘、鶴蝨、活鹿草、蚶殼草、蛤蟆藍、

荊藪、豨首、皺面草、母豬芥、杜牛膝等。《植物名實圖考長編》卷七天名精：“《別錄》：無毒。除小蟲，去癬，除胸中結熱，止煩渴，逐水，大吐下。一名天門精，一名玉門精，一名蕤顛，一名蟾蜍蘭，一名覲。”天名精學名中的 *Carpesium*，意為天名精屬；*abrotanoides* 意指青蒿狀的。天名精是多年生草本。莖直立，高 50~100 厘米；下部葉寬橢圓形或矩圓形，長 10~15 厘米，寬 5~8 厘米，上部葉漸小，矩圓形，無葉柄；頭狀花序多數，沿莖枝腋生，直徑 6~8 毫米，花黃色，外圍的雌花花冠絲狀，3~5 齒裂，中央的兩性花花冠筒狀，頂端 5 齒裂；瘦果條形，褐黑色。我國各地普遍生長，印度、日本、朝鮮等國也有分佈。根、葉、果實均供藥用，功能清熱解毒、驅蟲，主治咽喉腫痛等。



玉門精(天名精)

【玉枝】羊躑躅(杜鵑花科) *Rhododendron molle* (Blum) G. Don 羊躑躅又稱黃躑躅、黃杜鵑、羊不食草、鬧羊花、驚羊花、老虎花、南天竺草、黃色映山紅、搜山虎、莢光、石棠花、黃蛇豹花等。《植物名實圖考長編》卷一四羊躑躅：“有大毒。邪氣鬼疰，蠱毒。一名玉支，生太行山川谷及淮南山，三月採花，陰乾。陶隱居

云：近道諸山皆有之。花苗似鹿葱，羊誤食其葉，躑躅而死，故以為名，不可近眼。”羊躑躅學名中的 *Rhododendron*，來自希臘語的 Rhodo (紅色) 和 dendron (樹木)，指具有紅色花的；*molle* 意為柔軟的。羊躑躅為落葉灌木。高 1~2 米，老枝光滑，幼枝有毛；單葉互生，葉橢圓形；總狀花序；蒴果長橢圓形；花期 4~5 月份，果期 6~7 月份。多生於山坡、石縫中。在中原和南方諸省有分佈。根、花可入藥，具祛風、除濕、止痛功效，可治療風濕、癱瘓、牙痛等症。



玉枝(羊躑躅)

【玉乳】梨(薔薇科) *Pyrus* spp. 名見《本草綱目》。詳見快果條。

【玉延】薯蕷(薯蕷科) *Dioscorea opposita* Thunb. 名見《名醫別錄》。詳見薯蕷條、土蕷條。

【玉容丹】蘋果(薔薇科) *Malus pumila* Mill. 名見《滇南本草》。詳見超凡子條、柰條。

【玉容草】鏝菜(脣形科) *Leonurus pseudomacranthus* Kitagawa 名見《滇南本草》(整理本)，有別名玉容草，並曰：“取葉燒灰服，治一切小兒黑痘及頂陷；治絞腸痧肚疼或陰症，研末酒服三錢。”詳見白花益母草條。

【玉桃】艷山薑(薑科) *Alpinia zerumbet* (Pers.) Burt. et Smith 《植物名實圖考》卷二七玉桃：“玉桃，葉如芭蕉，抽長莖，開花成串，花苞如小綠桃。花開露瓣，如黃蝴蝶花稍大。偶一有之，故人罕見。《花鏡》有地湧金蓮，差相仿佛。”又據附圖，當為本種。艷山薑學名中的 *Alpinia*，來自人名 P. Alpini (意)，意為山薑屬。艷山薑是多年生常綠草本，高 2~3 米。根肥大；葉大，互生，披針形，長 30~70 厘米，寬 7~15 厘米，緣有短柔毛，兩面均無毛，有葉舌；圓錐花序呈總狀花序式，常下彎，長 30 厘米，花序軸紫紅色，被絨毛，小苞片橢圓形，較大，白色，頂端粉紅色，花萼近鐘形，白色，頂粉紅色，一邊開裂，花冠白色，管長 1 厘米，頂端粉紅，唇瓣闊卵形，中部雜以紅色和黃色；蒴果卵圓形，紅色。生山谷、林下、溪邊。產我國南部各省。種子藥用，燥濕祛寒，健脾暖胃。



玉桃(艷山薑)

【玉高粱】玉蜀黍(禾本科) *Zea mays* L. 玉蜀黍又稱戎菽、御麥、番麥、玉麥、玉蜀秫、包穀、玉米等。《廣群芳譜》卷九：“玉蜀黍，一名玉高粱，一名戎菽，一

名御麥。以其曾經進御，故名御麥。出西番，舊名番麥，按《農政全書》，又作玉米，玄扈先生曰：玉米或稱玉麥，或稱玉蜀秫，從他方得種，其曰米麥秫，皆借名之。”玉蜀黍學名中的 *Zea*，源於希臘語 *Zea* (一種穀物)，現為玉米屬屬名。玉米為一年生草本。稈粗壯，高 1~4 米，不分支，基部節上生支柱根；葉條狀披針形，闊長，邊緣波狀；單性花，雄花序頂生，雄小穗成對生於各節，雌花序腋生，雌小穗成對，呈多行密集於一粗壯呈海綿質的穗軸周圍而形成棒狀，外有多數苞片包裹。性喜濕、熱和光照。廣泛栽培。果實可食，又是油脂、釀造等生產的原料，新鮮稈葉可作飼料，花柱及根、葉可入藥。



玉高粱(玉蜀黍)

【玉麥】玉蜀黍(禾本科) *Zea mays* L. 名見《廣群芳譜》。詳見玉高粱條。

【玉椒】胡椒(胡椒科) *Piper nigrum* L. 名見《通雅》。詳見味履支條。

【玉蜀秫】玉蜀黍(禾本科) *Zea mays* L. 名見《廣群芳譜》。詳見玉高粱條。

【玉鼓】地榆(薔薇科) *Sanguisorba officinalis* L. 地榆又稱酸赭、菹蔞、玉札、



玉豉(地榆)

白地榆、鼠尾地榆、豚榆系等。《本草綱目》卷一二地榆：“[釋名]玉豉：酸赭。弘景曰，其葉似榆而長，初生佈地，故名。其花子紫黑色如豉，故又名玉豉。”《齊民要術》：“《神仙服食經》云：地榆一名玉札，北方難得，故尹公度曰：寧得一斤地榆，不用明目寶珠。其實黑如豉，北方呼豉為札，嘗言玉豉。”地榆學名中的 *Sanguisorba*，來自拉丁語的 *Sanguis* (血) 和 *Sorba* (吸收的)；*officinalis* 意為藥用的。地榆為多年生草本。莖直立有稜，根紡錘形且脂厚；單數羽狀復葉，互生，小葉橢圓形至長卵圓形，邊緣有鋸齒；花形小，呈近繖形穗狀花序；瘦果橢圓形，種子1枚；花期6~9月份，果期7~10月份。喜溫和濕潤氣候和肥沃砂質土壤。我國各地均有分佈。根可入藥，具涼血止血、清熱解毒功效，可治療吐血、衄血、血痢、崩漏、腸風、金瘡等症。

【玉蔓菁】擘藍(十字花科) *Brassica caulorapa* Pasq. 名見《山西誌》。詳見芥藍條、撇藍條。

【玉榧】榧樹(紅豆杉科) *Torreya grandis* Fort. 名見《花鏡》。詳見梭子條。

【玉蕊花】西番蓮(西番蓮科) *Passiflora caerulea* L. 西番蓮又稱轉心蓮、西洋鞠、時計果等。《花鏡》卷五：“玉蕊花向為唐人所重，故唐貞觀有之，集賢院有之。”又伊欽恒校注：“現名西番蓮……”西番蓮學名中的 *Passiflora*，來自[拉] *passio*(情欲、苦難) + *flos*(花)，此為西番蓮屬；*caerulea* 意為天藍色的。西番蓮是多年生纏繞性草本。莖細長，略被白粉；葉互生，掌狀5深裂，裂片披針形；花單生葉腋，與捲鬚對生，花大型，直徑6~10厘米，花瓣5，淡紅色；漿果橢圓形至近圓形，橙黃色或黃色。栽培於廣西、江西、四川、雲南等地。常逸生於濕潤山坡林中。全草入藥，具除風清熱、止咳化痰等功用，主治風熱頭痛、神經痛、失眠、月經痛及下痢等症。



玉蕊花(西番蓮)

【玉環】蓮(睡蓮科) *Nelumbo nucifera* Gaertn. 《廣群芳譜》卷二九荷花：“《三餘帖》：一名玉環。”詳見菡萏條。

【玉鷄苗】野薔薇(薔薇科) *Rosa* spp. 《花鏡》卷五：“薔薇，一名買笑，又名刺紅、玉鷄苗。”詳見營實條。

【末利】茉莉花(木犀科) *Jasminum sambac* (L.) Ait 名見《南方草木狀》。詳見抹麗條、末麗條。

【末麗】茉莉花(木犀科) *Jasminum*



末麗(茉莉花)

sambac (L.) Ait 茉莉又稱抹麗、抹厲、沒利、抹利、末利、暗麝、狎客、遠客、鬢華、柰花等。《本草綱目》卷一四茉莉：“[時珍曰]稽含《草木狀》作末利，《洛陽名園記》作抹厲，佛經作抹利，《王龜齡集》作沒利，《洪邁集》作末麗。蓋末利本胡語，無正字，隨人會意而已。”茉莉花學名中的 *Jasminum*，意指素馨屬；sambac 意為茉莉花。茉莉是常綠直立或攀援灌木，高 0.5~3 米。幼枝有短柔毛或近無毛；單葉對生，橢圓形、廣卵形或有時近倒卵形，全緣，長 3~9 厘米，寬 2~7.5 厘米，葉柄長約 3~7 厘米；聚傘花序頂生或腋生，通常有 3 朵花，花柄粗壯，長 5~10 毫米，被柔毛；果毬形，果徑約 1 厘米，呈紫黑色。茉莉原產印度，我國南北和世界各地廣泛栽培。為庭園或溫室內常見的盆栽芳香植物之一，是著名的花茶原料及重要的香精原料。花、葉藥用，治目赤腫痛，並有止咳化痰之效。

【示姑】半夏(天南星科) *Pinellia ternata* (Thunb.) Breit. 名見《名醫別錄》。詳見水玉條。

【正馬】玄參(玄參科) *Scrophularia ningpoensis* Hemsl. 《廣群芳譜》卷九四：

“玄參，一名黑參，一名鹿腸，一名馥草，一名玄臺，一名重臺，一名正馬，一名逐馬，一名鬼藏，一名野芝麻。”詳見重臺條。

【去水】芫花(瑞香科) *Daphne genkwa* Sieb. et Zucc. 《本草經》：“芫華，味苦，溫，有毒。主治咳逆上氣，喉鳴喘，咽腫氣短，蠱毒鬼瘡，疝瘕癰腫，殺蟲魚。一名去水。生川谷。”詳見芫條。

【甘瓜】甜瓜(葫蘆科) *Cucumis melo* L. 甜瓜又稱果瓜、熟瓜等。《本草綱目》卷三三甜瓜：“[釋名]甘瓜，果瓜。[時珍曰]瓜字篆文，象瓜在鬚蔓間之形。甜瓜之味甜於諸瓜，故獨得甘、甜之稱。”甜瓜學名中的 *Cucumis*，[拉]胡瓜原名，壺形



甘瓜(甜瓜)

的容器，甜瓜屬；*melo* 指甜瓜蜜味。甜瓜是一年生蔓生草本。莖枝有稜溝，多刺毛，捲鬚不分叉；葉片近圓形或腎形，長寬均約 8~15 厘米，葉面粗糙被糙毛，邊緣不分裂或 3~7 淺裂，裂片圓鈍，有鋸齒；花單性，雌雄同株，雄花常幾枚簇生於葉腋，雌花單生，花梗纖細，被柔毛，花萼筒狹鐘形，被長柔毛，裂片近鑽形，花冠黃色，裂片卵狀長圓形；果實長橢圓形或因品種而各異，果皮平滑，有溝紋或

斑紋，果肉黃白或綠色，味香甜；種子扁長卵形，黃白色。性喜溫燥。我國各地有栽培。瓜果可食。

【甘竹】淡竹（禾本科）*Phyllostachys nigra* (Lodd.) Munro var. *henonis* (Mitf.) Stapf ex Rendle 淡竹又稱水竹、金竹花等。《本草圖經》：“篔竹、淡竹、苦竹，《本經》並不載所出州土，今處處有之。竹之類甚多，而人藥者惟此三種，人多不能盡別。甘竹似篔而茂，即淡竹也。”淡竹學名中的 *phyllostachys*，來自希臘語的 *phylon*（葉子）和 *stachys*（穗子）；*nigra* 意為黑色的。淡竹為多年生常綠喬木或灌木。可高達 7~18 米，圓筒形，分枝側節間有一縱槽；籜葉長披針形，小枝上端有 1~5 片葉，葉鞘淡綠色，葉片狹披針形；穗狀花序小枝排成覆瓦狀圓錐花序；筍期 4~5 月份，花期 10 月至次年 5 月份。通常栽植於庭院或陰涼山坡。分佈於我國長江流域各省區。莖、葉可入藥，具清熱、涼血、化痰、止吐功效，可治療煩熱嘔吐、呃逆、痰熱咳喘、吐血、崩漏、驚痛等症。竹材堅韌，可用於編織，筍可食用。



甘竹(淡竹)

【甘柘】甘蔗（禾本科）*Saccharum offi-*

cinarum L. 《上林賦》：“甘柘巴苴。”詳見拓條。

【甘根】白及（蘭科）*Bletilla striata* (Thunb.) Rehb. f. 白及又稱連及草、白給、白根、箬蘭、朱蘭等。《本草綱目》卷一二白及：“[時珍曰]其根白色，連及而生，故曰白及。其味苦而曰甘根，反言也。”白及學名中的 *Bletilla*，意為白及屬；*striata* 意指具有縱行條紋的。白及是多年生草本。鬚根灰白色，纖細，地下有指狀分歧肥厚的塊莖，假鱗莖扁球形，上面具葶薺似的環帶，富黏性；莖粗壯，勁直，高 15~50 厘米；葉 3~5 枚，披針形或廣披針形，長 8~30 厘米，寬 1.5~6 厘米，全緣；總狀花序頂生，花 3~8



甘根(白及)

朵，花紫色、淡紅色或黃白色；蒴果圓柱形，長 3.5 厘米，直徑 1 厘米。廣佈於長江流域各省。生長於山野川谷較潮濕處，花大而美麗，常栽培供觀賞。塊莖入藥，性微寒、味苦，能止血補肺、生肌止痛，主治肺虛久咳、吐血等症。

【甘棠】杜梨（薔薇科）*Pyrus betulaefolia* Bge. 據《爾雅·釋木》杜為赤棠；《說文解字》釋杜為甘棠；《說文通訓定聲》：

“實之白而甘者曰棠，赤而澀者曰杜。”《植物名實圖考長編》卷一六棠梨：“陸璣《詩疏》：甘棠梨，一名杜梨，赤棠也，與白棠同耳，但子有赤白美惡。子白色為白棠，甘棠也，少酢滑美。赤棠子澀而酢，無味，俗語云：澀如杜，是也。”古代在品名上有混淆，但是一物種。詳見杜條。

【甘蒲】香蒲（香蒲科）*Typha* spp. 《本草綱目》卷一九香蒲、蒲黃：“[釋名]甘蒲、醮石、花上黃粉名蒲黃。”詳見睢條。

【甘蕉】芭蕉（芭蕉科）*Musa basjoo* Sieb. et Zucc. 芭蕉又稱芭苴、天苴、綠天、扇仙、甘露、蕉子、紅蕉、牛子蕉等。《本草綱目》卷一五甘蕉：“[釋名]芭蕉、天苴、芭苴，[時珍曰]按陸佃《埤雅》云：蕉不落葉，一葉舒則一葉焦，故謂之蕉。俗謂乾物為巴，巴亦蕉意也……曹叔雅《異物誌》云：芭蕉結實，其皮赤如火，其肉甜如蜜，四五枚可飽人，而滋味常在牙齒間，故名甘蕉。”甘蕉當是香蕉（*Musa nana*），它和芭蕉（*M. basjoo*）是兩種植物，但古人常指為相同，因此，甘蕉、芭蕉二名互用。香蕉不再另述。芭蕉學名中的 *Musa*，來自古羅馬第一任國王的醫生的名字 Antonius Musa；*basjoo* 為日語中芭蕉的俗名。芭蕉為多年生草本。葉長 2~3 米，寬 20~30 厘米，葉柄粗壯，長



甘蕉(芭蕉)

達 30 厘米；花單性，雌雄同株；漿果三稜狀長圓形，種子多數。多栽培於庭園及農舍附近，分佈於山東以至長江流域以南等地。葉可作造紙原料，花、種子、莖均可藥用，具有清熱、止渴、利尿、解毒功效。

【甘澤】甘遂（大戟科）*Euphorbia kansui* Liou 《廣群芳譜》卷九七甘遂：“[本草綱目]甘遂，一名甘藁，一名陵藁，一名陵澤，一名甘澤，一名重澤，一名苦澤，一名白澤，一名主田，一名鬼醜。”詳見主田條。

【甘藁】甘遂（大戟科）*Euphorbia kansui* Liou 《植物名實圖考長編》卷一四甘遂：“《別錄》：甘，大寒，有毒。下五水，散膀胱留熱，皮中痞熱氣腫滿。一名甘藁，一名陵澤，一名重澤。”詳見主田條。

【甘藷】甘薯（薯蕷科）*Dioscorea esculenta* (Lour.) Burkill. 陳祈暢《異物誌》：“甘藷，似芋，亦有巨魁。剝去皮，肌肉正白如脂肪。南人專食，以當米穀。”（原注：蒸，炙皆香美。賓客酒食亦施設，有



甘藷(甘薯)

如果實也)此甘藷不是旋花科的番薯 (*Ipomoea batatas*)，因番薯原產美洲中部，哥倫布發現新大陸後才由越南等地傳入我國，六朝時根本沒有。甘薯學名

中的 *Dioscorea*, 來自人名 A. D. Dioscorides, 此為薯蕷屬; *esculenta* 是可吃的。甘薯是纏繞草質藤本。地下莖塊狀, 多個, 淡黃色, 光滑; 莖左旋, 基部有刺, 被丁字形柔毛; 單葉互生, 闊心形, 基出脈 9~13, 被丁字形長柔毛; 雄花序為穗狀花序, 雄花單生或 2~4 朵簇生, 雌穗狀花序單生於上部葉腋, 花序軸稍有稜; 蒴果三稜形, 較少成熟, 每稜翅狀; 種子圓形, 具翅。栽培或野生。分佈於兩廣、海南等地。塊莖可食。


【甘藷】番薯(旋花科) *Ipomoea batatas* (L.) Lam. 《廣群芳譜》卷十六甘藷: “朱薯, 一名番薯。”詳見番藷條。

【甘露】芭蕉(芭蕉科) *Musa basjoo* Sieb. et Zucc. 《植物名實圖考》卷一四甘蕉: “甘蕉, 《別錄》下品。生嶺北者開花, 花苞有露, 極甘, 通呼甘露。生嶺南者有實, 通呼蕉子……”詳見甘蕉條。

【甘露兒】甘露子(脣形科) *Stachys sieboldii* Miq. 《救荒本草》卷八甘露兒: “人家園圃中多栽, 葉似地瓜兒, 葉甚闊, 多有毛澀, 其葉對節生, 色微淡綠, 又似薄荷葉亦寬而皺, 開紅紫花, 其根呼為甘露兒。”詳見滴露條。

【古貝】木棉(木棉科) *Bombax malabaricum* DC. 木棉又稱攀枝花、斑枝花、紅棉、瓊枝、吉貝、木綿等。《植物名實圖考》卷三〇木棉: “李延壽《南史》所謂林邑諸國出古貝花, 中有鵝毛, 抽其緒, 紡為布。張勃《吳錄》所謂交州永昌木棉樹高過屋, 有十餘年不換者, 實大如盃, 花中棉軟白, 可為緼絮及毛布者。皆指似木之木棉也。”木棉學名中的 *Bombax*, 來自[希]棉花、絹絲之意, 此為木棉屬; *malabaricum* 意指馬拉巴(印度)的。木棉是落葉大喬木, 高可達 25 米。樹幹和枝有短而粗的圓錐形刺, 側枝平展; 掌狀復葉有 5~7 個小葉, 長圓形至長圓狀披針形, 長 10~20 厘米, 寬 3.5~5.5 厘

米; 花簇生於枝端, 先葉開放, 花大, 直徑約 10 厘米, 紅色或橙紅色; 蒴果長圓形, 長 10~15 厘米, 粗 4.5~5 厘米, 裂為 5 瓣, 內有綿毛; 種子多數, 倒卵形, 光滑。分佈於廣東、廣西、福建、臺灣、雲南等地。生丘陵或低山次生林中。果內的綿毛作墊褥、枕頭等填充材料。花、根、皮入藥, 治泄瀉、痢疾、血崩、胃潰瘍、跌打扭傷等。



古貝(木棉)

【古度子】無花果(桑科) *Ficus* spp. 《花鏡》云: “古度子出自交廣諸州。木與葉似栗, 不開花而實。枝間生子, 大如安石榴及檳子, 而色赤味酸。”伊欽恒校注: “古度子當系無花果的一個變種。”《植物名實圖考長編》卷一六無花果: “按《滇南本草》……又無花果即古度, 《滇略》亦云然, 或有所本也。”目前僅能定為無花果屬植物, 附於此, 存以備考。參考映日果條。

【古終藤】草棉(錦葵科) *Gossypium herbaceum* L. 《本草綱目》卷三六木綿: “[時珍曰]木綿有二種: 似木者名古貝, 似草者名古終。”又: “沈懷遠《南越誌》所謂桂州出古終藤, 結實如鵝毳, 核如珠珣, 治出其核, 紡如絲棉, 染為斑布者, 皆指似草之木綿也。”草棉學名中的 *Gos-*

sypium, 意指棉花的古名, 來自[阿]goz, 軟物, 指種子具長綿毛; *herbaceum* 意指草本的。草棉是一年生草本, 高達 1.5 米。葉掌狀 5 裂, 直徑 5~10 厘米, 通常寬超過長, 葉柄長 2.5~8 厘米; 花單生於葉腋, 花梗長 1~2 厘米, 小苞片闊三角形, 長 2~3 厘米, 寬超過於長, 先端具 6~8 齒, 花黃色, 內面基部紫色, 直徑 5~7 厘米; 蒴果卵圓形, 通常 3~4 室; 種子被白色長棉毛和短棉毛。我國大部分地區均有栽培。棉花供紡織原料。根、外果皮、種子供藥用。



古終藤(草棉)


【术律草】八角蓮(小檗科) *Dysosma versipellis* (Hance) M. Cheng 名見《本草綱目》。詳見九白條、爵犀條。

【左篆藤】海金沙(海金沙科) *Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw. 名見《分類草藥性》。詳見竹園荑條。

【左轉藤】海金沙(海金沙科) *Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw. 名見《天寶本草》。詳見竹園荑條。

【左纏藤】忍冬(忍冬科) *Lonicera japonica* Thunb. 《花鏡》卷五: “鴛鴦藤一名忍冬……又名金銀藤, 氣甚清芬, 而莖、葉皆可入藥用。因其藤左纏, 俗名左纏藤。”詳見金銀藤條。

【石下長卿】徐長卿(蘿藦科) *Cynanchum paniculatum* (Bunge) Kitag. 徐長卿又稱英雄草、九頭獅子草等。《唐本草》: “徐長卿, 葉似柳, 兩葉相當, 有光潤, 所在川澤有之。根如細辛, 微粗長而有臊氣。今俗用鬼督郵, 非也。”《本草綱目》: “《名醫別錄》於有名未用復出石下長卿條, 云一名徐長卿。”徐長卿學名中的 *Cynanchum*, 是鵝絨藤屬; *paniculatum* 圓錐花序式的, 意指徐長卿是圓錐花序。徐長卿為多年生草本植物。根莖短, 多鬚根; 莖高 65 厘米, 莖細節長; 單葉對生, 葉針形至綫形, 長約 5~14 厘米, 寬 2~8 毫米, 先端尖, 葉緣微外捲; 圓錐花序頂生於葉腋; 花黃色, 雄蕊 5 枚, 雌蕊 1 枚, 子房上位; 蒴果角狀, 種子頂端有銀白色絨毛。野生於山坡或路旁。全國大部分地區均有分佈。以根或全草入藥。



石下長卿(徐長卿)

【石打穿】龍芽草(薔薇科) *Agrimonia pilosa* Ldb. 名見《本草綱目拾遺》。詳見瓜香草條。

【石瓜】番木瓜(番木瓜科) *Carica papaya* L. 名見《植物名實圖考》。詳見冬瓜樹條。

【石皮】石韋(水龍骨科) *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farw. 《植物名實圖考長編》卷一三石韋：“《別錄》：甘，無毒……石韋一名石皮，用之去黃毛，毛射人肺，令人欬，不可療。”詳見石韋條。

【石竹】①瞿麥(石竹科) *Dianthus superbus* L. 名見《日華本草》。詳見蓮麥條。②石竹(石竹科) *Dianthus chinensis* L.

【石血】絡石(夾竹桃科) *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. 名見《植物名實圖考長編》卷一〇絡石：“《唐本草注》云：此物生陰濕處，冬夏常青……俗名耐冬。山南人謂之石血，療產後血結，大良。”詳見耐冬條。

【石芥】石蕊(石蕊科) *Cladonia rangiferina* Web. 名始見於《名醫別錄》。《本草綱目》卷二一：“其狀如花蕊，其味如茶，故名。石芥乃茶字之誤。”詳見石濡條。

【石芥】芥菜(十字花科) *Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss. 《廣群芳譜》卷一四芥：“石芥。注：低小者。”詳見芥條。

【石花】瓊枝(紅翎菜科) *Eucheuma gelatinae* (Esp.) J. Ag. 《南越筆記》：“石花一名海菜，產瓊之會同。”詳見瓊脂條。


【石花】小石花菜(石花菜科) *Gelidium divaricatum* (Mart.) 《海澄縣誌》：“石花……生海嶼中，性寒，夏日煮之成凍，並可入蜜品，患痔者服之甚佳。”福建同安縣、詔安縣及廈門等地方誌中所稱石花皆為小石花菜。詳見石花菜條。

【石花】卷柏(卷柏科) *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring 名見《盛京通誌》。詳見萬歲條。

【石花菜】瓊枝(紅翎菜科) *Eucheuma gelatinae* (Esp.) J. Ag. 《本草綱目》卷二八：“石花菜生南海沙石間。高二三寸，狀如珊瑚，有紅、白二色，枝上有細

齒。以沸湯泡去砂屑，沃以薑醋，食之甚脆。其根埋沙中，可再生枝也。”詳見瓊脂條。

【石花菜】小石花菜(石花菜科) *Gelidium divaricatum* (Mart.) 又稱石花、凍菜、海花菜等。《漳浦縣誌》：“石花菜生海礁上，葉如蜈蚣脚，性寒，六月煮之，凝如冰。”《閩書》及《植物名實圖考長編》(部分)也即小石花菜。小石花菜的屬名，*Gelidium* 來自於拉丁語 *gelo*，意為能冰結；種加詞 *divaricatum* 意為極叉開的。小石花菜藻體紫紅色，矮小，密集錯綜地生在一起，匍匐且傾臥，軟骨質。體綫形或略扁壓的圓柱形，羽狀分枝，其上有較密的羽狀小枝，小枝與分枝常呈直角，對生或互生，頂端尖，生殖枝則鈍頭。四分孢子囊生在膨脹小羽枝的頂端，散佈在皮層中。囊果生在膨脹小羽枝的中部，一般在7~10月份成熟。生長在中潮帶巖石、藤壺以及其他貝殼上，常形成很大的群落。分佈於我國南北沿海。可作夏季凝膠狀清涼食品，也可作瓊膠的原料。



石花菜(小石花菜)

【石長生】井欄邊草(鳳尾蕨科) *Pteris multifida* Poir. 名見《植物名實圖考》卷一六的鳳尾草項，但石長生條項則從附圖及文字看都不是此種。詳見鳳尾草條。

【石風丹】高斑葉蘭(蘭科) *Goodyera*

procera (Ker-Gawl.) Hook. 《植物名實圖考》卷一七石風丹：“石風丹生大理府。似石韋有莖，稍開青花，作穗如狗尾草，俚醫用之。”高斑葉蘭學名中的 *Goodyera*，為蘭科中的一屬；*procera* 意指伸長的。高斑葉蘭是多年生草本，高 30~90 厘米。葉矩圓形或狹橢圓形，長 8~15 厘米，寬 2~5.5 厘米，先端漸尖，基部漸狹而成長而厚的柄；穗狀花序，長 7~15 厘米，花白色而淡綠，直徑約 3 毫米，萼片卵形，花瓣較狹，匙形，唇瓣囊狀，內面有柔毛，先端鈍，向外反折，內有 2 枚胼胝體，合蕊柱短而闊，蕊喙 2 裂，和蕊柱等長；蒴果紡錘形。生於海拔 500~1550 米的山坡林下、溝旁陰濕處。分佈四川、雲南、廣東等地。全草供藥用。




石風丹(高斑葉蘭)

【石茵陳】豬毛蒿(菊科) *Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. 《本草綱目》卷一五：“[大明曰]茵陳出和州及南山嶺上，一名石茵陳。”詳見白蒿條。

【石華】瓊枝(紅翎菜科) *Eucheuma gelatinae* (Esp.) J. Ag. 《本草綱目》卷二八：“石花菜生南海沙石間……郭璞《海

賦》所謂水物則玉珧海月，土肉石華，即此物也。”詳見璠脂條。

【石荷葉】虎耳草(虎耳草科) *Saxifraga stolonifera* (L.) Meerb. 虎耳草又稱金絲草、金錢吊芙蓉、繫繫葉等。《本草綱目》卷二〇虎耳草：“[時珍曰]虎耳生陰濕處，人亦栽於石山上。莖高五六寸，有細毛，一莖一葉，如荷蓋狀。人呼為石荷葉。葉大如錢，狀似初生小葵葉，及虎之耳形。”虎耳草學名中的 *Saxifraga*，意為切割巖石的，此為虎耳草屬；*stolonifera* 意指生有匍匐莖的。虎耳草是多年生草本，高 14~45 厘米，全株被毛。有細長匍匐莖，着地可生幼苗；葉數片全部基生或有時 1~2 生莖下部，葉片腎形，肉質而厚，長 1.7~7.5 厘米，寬 2.4~12 厘米；圓錐花序，花白色，花瓣 5，大小不等，下方兩片特大，上面 3 片較小；蒴果卵圓形，頂端 2 深裂，呈嘴狀。分佈於我國華東、華南、西南至陝西、河南，朝鮮、日本亦有。全草入藥，能清熱解毒、涼血止血，主治耳中流膿水、皮膚瘙癢、濕疹等，多作外用。



石荷葉(虎耳草)

【石能】石龍芮(毛茛科) *Ranunculus sceleratus* L. 名見《名醫別錄》。詳見地


椹條、天豆條。

【石被】石莼(石莼科) *Ulva lactuca* L. 《連江縣志》：“石被……生海水面，碧綠色，平舒如被，藥肆呼昆布。”詳見石蓴條。

【石都念子】莽吉柿(藤黃科) *Garcinia mangostana* L. 《本草拾遺》：“石都念子味酸，小溫，無毒。主痰嗽，噦氣。生嶺南，樹高丈餘。”《植物名實圖考》卷三二石都念子：“石都念子，《本草拾遺》始著錄，即倒捻子。東坡名爲海漆，亦名臙脂子。”詳見都念子條。

【石菜】厚皮菜(藜科) *Beta vulgaris* L. var *cicla* L. 名見《本草求原》。詳見蒼蓬菜條。

【石棗兒】綿棗兒(百合科) *Scilla scilloides* (Lindl.) Druce 綿棗兒又稱地蘭。《救荒本草》卷三：“綿棗兒一名石棗兒，出密縣山谷中，生石間。苗高三五寸，葉似韭葉而闊，瓦隴樣，葉中擡葶出穗，似



石棗兒(綿棗兒)

雞冠莧穗而小，開淡粉紅花，微帶紫色，結小蒴兒，其子似大藍子而小，黑色。根類獨顆蒜，又似棗形而白，味甜，性寒。”綿棗兒學名中的 *Scilla*，[拉]植物原名，

綿棗兒屬；*scilloides* 如綿棗的。綿棗兒是多年生草本。鱗莖卵球形，下部有短根莖，有多數鬚根，鱗莖皮黑褐色；葉狹帶狀，基生，通常 2~5 枚，長 15~20 厘米，寬 3~8 毫米，柔軟；總狀花序直立，長 15~20 厘米，具多數花，苞片小，綫形，花小，紫紅色、粉紅色至白色，花被 6，裂片矩圓形；蒴果近倒卵形，3 稜；種子 1~3 顆，黑色，有稜，光澤。生於丘陵山坡。除內蒙古、青海、新疆、西藏外，幾佈全國。鱗莖可食。

【石棠花】羊躑躅(杜鵑花科) *Rhododendron molle* (Blum) G. Don 名見《綱目拾遺》。詳見玉枝條。

【石榆子】韶子(無患子科) *Nephelium chryseum* Bl. 沈懷遠《南越誌》石榆子：“初寧縣里有石榆子，一名‘山棗’，又時呼爲‘韶子’也。”詳見韶條。

【石藍】白前屬(蘿藦科) *Cynanchum* spp. 白前又稱嗽藥等。《唐本草》：“白前，葉似柳，或似芫花苗，高尺許，生洲渚沙磧之上。根白，長於細辛，味甘。俗以酒漬服，主上氣。不生近道，俗名石藍、嗽藥。”白前作用主藥指以下兩種，分述如下。

①柳葉白前：*Cynanchum stauntoni* (Decne.) Schltr. ex Lévl. 柳葉白前學名中 *Cynanchum*，來自於希臘文 *Kyon an-chone*，意爲可以絞殺狗；*stauntoni* 爲紀念英國學者 G. Staunton 而拉丁化的形容詞。柳葉白前爲直立草本，高 30~40 厘米。根叢生；莖具單列毛；葉對生，無毛，綫狀披針形，長達 6 厘米，寬 5 毫米，葉柄長 2 毫米；聚傘花序腋生，傘房狀，長 2~2.5 厘米，着花 10 餘朵，花萼裂片 5 枚，卵圓形，花冠筒內面被茸毛，裂片卵圓形，鈍頭，副花冠 5 裂，裂片頂端圓形；蓇葖果單生，綫狀披針形，種子扁圓形，暗褐色，頂端截形，基部圓形，頂端具白色細絨毛。生長於溪灘、江邊砂磧之

上或山谷中陰濕處。分佈於湖北和貴州。



石藍(柳葉白前)

②白前 *Cynanchum glaucescens* (Decne.) Hand. — Mazz. 白前學名中的屬名釋義同上，種加詞 *glaucescens* 意為變蒼白色的。白前為直立灌木，高達 50 厘米。莖具二列柔毛；葉無毛，長圓形或長圓狀披針形，長 1~5 厘米，寬 0.7~1.2 厘米，頂端鈍或急尖，莖部楔形或圓形，近無柄；傘形聚傘花序腋內或腋間生，近無毛，着花 10 餘朵，花萼 5 深裂，內面基部有腺體 5 個，極小，花冠黃色、輻狀，副花冠淺杯狀，裂片 5，肉質，卵形，龍骨狀內向，其端部傾倚於花藥，花粉塊每室 1 個，下垂，柱頭扁平；蓇葖果單生，紡錘形，先端漸尖，基部緊窄，長 6 厘米，直徑 1 厘米；種子扁平，寬約 5 毫米，頂端具白色絹質種毛。花期 5~11 月份，果期 7~11 月份。生於海拔 100~300 米的江邊河岸及沙石間，也有在路邊丘陵地區。產於江蘇、浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西和四川等省區。以上兩種植物的生長環境及分佈相同，常群生一起，都可以根及根莖入藥，功能祛痰鎮咳、清

肺熱、降肺氣。



石藍(白前)

【石蘂】石斛(蘭科) *Dendrobium* spp. 石斛又稱林蘭、禁生、杜蘭、金釵花、千年潤等。名見《名醫別錄》。《名醫別錄》：“無毒。益精，補內絕不足，平胃氣，長肌肉，逐皮膚邪熱瘴氣，脚膝疼，冷痺弱，定志除驚。一名禁生，一名林蘭，一名石蘂。生六安山谷水傍石上，七月、八月採莖，陰乾。”石斛屬名 *Dendrobium*，源於希臘文，意為生於樹上，形容其附生於樹幹上的習性。石斛指蘭科石斛屬多種植物，達十種以上，又因品種及加工方法不同又可分為數種，普遍單稱石斛多指石斛 *Dendrobium nobile* Lindl. 或短唇石斛 *D. linawianum* Rehb. f. 現分述如下。

①石斛 *Dendrobium nobile* Lindl. 學名中的種加詞 *nobile*，意為出名的、壯麗的。石斛為多年生的附生草本，高 30~50 厘米。莖叢生，直立，直徑 1~1.3 厘米，黃綠色，多節，節間長 2.5~3.5 厘米；葉無柄，近革質，常 3~5 片生於莖的上端，葉片長圓形或長圓狀披針形，長 6~12 厘米，寬 1.5~2.5 厘米，先端鈍，有偏斜狀的凹缺，葉脈平行，通常 9 條，葉鞘緊抱於節間，長 1.5~2.7 厘米；總狀花序自莖節生出，通常具花 2~3 朵，苞片膜質，小，異形，花甚大，下垂，直徑

6~8 厘米，花萼及花瓣白色，末端呈淡紅色，萼片 3，中萼片離生，兩側萼片斜生於蕊柱足上，幾相等，長圓形，長 3.5~4.5 厘米，寬 1.2~1.5 厘米，先端急尖或鈍形，花瓣卵狀長圓形或橢圓形，與萼片幾等長，寬 2.1~2.5 厘米，唇瓣生於蕊柱足的前方，近圓卵形，長 4~4.5 厘米，寬 3~3.5 厘米，先端圓形，基部有短爪，下半部向上反捲包圍蕊柱，兩面被茸毛，近基部的中央有一塊深紫色的斑點，合蕊柱高 6~7 毫米，連足部長約 12 毫米，雄蕊呈圓錐狀，花藥 2 室，藥長 3 毫米，花粉塊 4，蠟質；蒴果。花期 5~6 月份。附生於高山巖石或森林中的樹幹上。分佈於四川、貴州、雲南、湖北、廣西、臺灣等地，此外各地尚有栽培。有生津益胃、清熱養陰之效，治熱病傷津、口乾煩燥、病後虛熱、陰傷目暗等症。



石蘧(石斛)

②短唇石斛 *Dendrobium linawianum* Rchb. f. 與上種近似，主要區別為本種莖的節間膝曲或明顯地加粗，因此全形呈連穗狀，花淡紫色，唇瓣矩圓，具細長的爪，中下部邊緣具點。產臺灣、廣西、廣東等地。生長於高山巖石或森林中的樹幹上。分佈於四川、貴州、雲南、湖北、廣西、臺灣等地，此外各地尚有栽培。有生津益胃、清熱養陰之效，治熱病


傷津、口乾煩燥、病後虛熱、陰傷目暗等症。

【石雲茶】石蕊(石蕊科) *Cladonia rangiferina* Web. 名見《本草匯言》。詳見石濡條。

【石髮】游苔屬(石蕊科) *Enteromorpha* spp. 《本草綱目》：“石髮……張華《博物志》：生海中者，長尺餘，大小如韭葉，以肉雜蒸食，極美。”詳見乾薑條。

【石解】粉防己(防己科) *Stephania tetrandra* S. Moore 名見《本草綱目》。詳見解離條。

【石蓴】石蓴(石蓴科) *Ulva lactuca* L. 又稱石被、昆布、紙菜、綸和綸布等。《本草拾遺》：“石蓴味甘，平，無毒……生南海中水石上。”石蓴的屬名 *Ulva*，來自於拉丁語，意為苔草狀；其種加詞 *lactuca*



石蓴(石蓴)

亦來自於拉丁語，意為具乳汁。石蓴藻體黃綠色，長 10~30 厘米，可達 40 厘米。體近似卵形，邊緣常略有波狀，或呈廣寬的葉片狀。體厚在 45 微米上下。生長在海灣內、中潮帶及低潮帶的巖石上或石沼中。多分佈於我國長江以南，浙江省至海南島沿岸都能見到；黃、渤海沿岸稀少。幼嫩的石蓴是良好的副食品，可入藥，功能下水、利尿。

【石蓮花】卷栢(卷栢科) *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring 《滇南本草》卷上：“石蓮花，一名卷栢，一名回陽草。味苦，性寒。通月經，破症瘕，消血塊，難產催生效。燒酒爲使。”詳見萬歲條。

【石磋】絡石(夾竹桃科) *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. 《名醫別錄》云：“微寒，無毒。主喘息不通……一名石磋，一名略石，一名明石，一名領石，一名懸石。”詳見耐冬條。

【石蕊花】石蕊(石蕊科) *Cladonia rangiferina* Web. 《朱蘊齋醫集》云：“石蕊花五錢，蓮子十五枚，煎湯泡服。”可治心熱煩悶。詳見石濡條。

【石龍】紅蓼(蓼科) *Polygonum orientale* L. 名見《名醫別錄》。詳見天蓼條、鴻藹條。

【石龍牙草】茅膏菜(茅膏菜科) *Drosera peltata* Smith var. *multisejala* Y. Z. Ruan 《植物名實圖考》卷一六石龍牙草：“石龍牙草生山石上。根如小半夏，春無葉，有花，細莖如絲。參差開五瓣小白花，花罷黃鬚下垂，高三四寸，小草尤纖。”茅膏菜學名中的 *Drosera*，來自[希] *droseros*，如露水，茅膏菜屬；*peltata* 意指盾狀的。茅膏菜是多年生柔弱小草



石龍牙草(茅膏菜)


本。毳莖，紫色，直徑約 1 厘米；莖高 10~32 厘米，淡綠色，具紫紅色汁液，莖單一或上部分枝；葉互生，有細柄，柄長 8~13 毫米，葉片半月形或半圓形，長 2~3 毫米，基部近平截，葉緣密生長腺毛，毛端膨大，紫紅色，分泌黏液，呈露珠狀，能捕小蟲；螺狀聚傘花序生於枝端或莖頂，具少數小花，萼鐘形，裂片 5，卵形，花瓣 5，白色，倒卵形，具有色縱紋；蒴果室背開裂，種子細小橢圓形。生半陰濕地。分佈於我國中南部。全草入藥。

【石龍藤】絡石(夾竹桃科) *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. 《廣群芳譜》卷八一：“絡石，一名石鯪，一名石龍藤……”詳見耐冬條。

【石檀】花曲柳(木犀科) *Fraxinus rhynchophylla* Hance 名見《名醫別錄》。詳見苦樹條、稱星樹條。

【石膽草】旋蒴苣蕒(苦苣蕒科) *Boea hygrometrica* (Bunge) R. Br. 名見《滇南本草》。詳見牛耳草條。

【石濡】石蕊(石蕊科) *Cladonia rangiferina* Web.



石濡(石蕊)

giferina Web. 石蕊又稱石芥、雲茶、蒙頂茶、石蕊花、石雲茶、雲芝茶、蒙山茶、

蒙陰茶等。石蕊學名中 *Cladonia*，源於希臘文，意為樹枝，形容石蕊植株的外形；種加詞 *rangiferina*，意為似馴鹿的，也是形容植株(枝狀體)的外形。始見於《名醫別錄》。《本草拾遺》：“石濡，生石之陰，如屋游、垣衣之類，得雨即展，故名石濡。早春青翠，端開四葉。”石蕊的子器柄圓柱形，高 5~10 厘米，中空，全體灰白色，表面粗糙，有破孔，多分枝，枝頂具傾向於一側的放射狀小枝，乾燥時硬脆，潮濕時柔軟；子器生於小枝頂端，半球形，暗褐色。生於乾燥的山地。分佈於東北、陝西、四川、雲南、貴州等地。全株入藥，功用清熱、化痰、涼肝、止血。

【石韃】石韃(水龍骨科) *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farw. 石韃又稱石皮、石蘭、金星草等。《本草經》(草部下品)：“石韃，味苦平。主治勞熱邪氣，五癰閉不通，利小便水道。一名石韃。生山谷石上。”石韃學名中的 *Pyrrosia*，來自[希]Pyr，意即火、發炎，此為石韃屬。石韃是多年生草本，高 10~30 厘米。根狀莖細長，橫走，密被深褐色披針形鱗片；葉疏生，革質，披針形至矩圓披針形，長 7~20 厘米，寬 1.5~5 厘米，全緣，上面綠色，有細點，下面被淡褐色星狀毛；孢子囊群橢圓形，散生在葉下面，在側脈之間排列成數行，初為星狀毛包被，成熟時



石韃(石韃)


露出，無囊群蓋。分佈於長江以南各省區。附生樹幹或山野岩石上。因本屬的北京石韃、有柄石韃、絨毛石韃、西南石韃或廬山石韃等均與石韃的形態大同小異，故古代書籍中未作區別。現代中藥所指的石韃亦是以上幾種植物葉片的統稱。可治尿血、尿路結石、腎炎、崩漏、痢疾、肺熱咳嗽、慢性支氣管炎等症。

【石蘭】石韃(水龍骨科) *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farw. 《本草綱目》卷二〇石韃：“[釋名]石韃、石皮、石蘭，[弘景曰]蔓延石上，生葉如皮，故名石韃。”詳見石韃條。

【石鯪】絡石(夾竹桃科) *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. 《本草經》云：“絡石，味苦，濕。主風熱、死肌……久服輕身明目，潤澤好顏色，不老延年。一名石鯪。”詳見耐冬條。

【布瓜】絲瓜(葫蘆科) *Luffa cylindrica* (L.) Roem. 名見《古今合璧事類備要》和《本草綱目》。詳見蠻瓜條。

【戊己芝】黃精(百合科) *Polygonatum sibiricum* Redouté 黃精又稱米鋪。《本草綱目》卷一二黃精：“黃精為服食要藥，故《別錄》列於草部之首，仙家以為芝草之類，以其得坤土之精粹，故謂之黃精。《五符經》云，黃精獲天地之淳精，故名戊己芝，是此義也。”黃精學名中的 *Polygonatum*，黃精屬，多節的，意指黃精屬植物的莖上有多層輪生葉，將莖分成多節；*sibiricum* 意指西伯利亞。黃精為多年生草本植物。根狀莖橫走，肥大肉質，黃白色，略呈扁圓柱狀，莖直立，圓柱形，單一不分枝，高 50~80 厘米，光滑無毛；葉片綫狀，4~5 片輪生，先端捲曲；花腋生，下垂，花被筒狀，白色，雄蕊 6 枚，子房上位；漿果毬形，成熟時黑色。生於荒山坡及山地雜樹林中。廣佈於我國各地。根狀莖為常用中藥，有滋養強壯之功效。



戊己芝(黃精)

【平仲】銀杏(銀杏科) *Ginkgo biloba* L. 《植物名實圖考》卷三一銀杏：“銀杏，《日用本草》始著錄，即白果，一名鴨脚子。或云即平仲”。詳見鴨脚子條。

【平波】蘋果(薔薇科) *Malus pumila* Mill. 《飲膳正要》：“平波，止渴生津。”詳見柰條。

【平慮草】仙人掌(仙人掌科) *Opuntia dillenii* (Ker-Gawl.) Haw. 《植物名實圖考》卷一五仙人掌條：“《南安府誌》：《三國誌》載孫皓時，有菜生工人吳平家，高四尺，厚三分，如枇杷形……東觀案圖作平慮草。按此即今仙人掌，人呼為老鴉舌。”詳見龍舌條。

【可離】芍藥(毛茛科) *Paeonia lactiflora* Pall. 《古今注》：“董仲舒答牛亨問云：芍藥，一名可離，故將別以贈之。”詳見將離條。

【只刺】蒼耳(菊科) *Xanthium sibiricum* Patr. 名見《千金·食治》。詳見卷耳條。

【目草】防風(傘形科) *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. 名見《廣群芳譜》。詳見回芸條、銅芸條。

【田字草】蘋(蘋科) *Marsilea quadri-
folia* L. 《吳普本草》云：“蘋即俗呼田字
草。”詳見四葉菜條。

【田字草】酢漿草(酢漿草科) *Oxalis
corniculata* L. 名見《百一選方》。詳見
醋母草條。

【由胡】萹蒿(菊科) *Artemisia selen-
gensis* Turcz. ex Bess. 名見《本草綱目》。
詳見萹條、繁條。

【四大金剛】及己(金粟蘭科) *Chloran-
thus serratus* (Thunb.) Roem. et
Schult. 名見《植物名實圖考》。詳見四
葉細辛條。

【四季花】月季花(薔薇科) *Rosa chinen-
sis* Jacq. 《植物名實圖考》卷二一月季：
“《益部方物記》：花亘四時，月一披秀，寒
暑不改，似固常守。右月季花，此花即東
方所謂四季花者。”詳見勝春條。

【四季豆】菜豆(豆科) *Phaseolus vul-
garis* L. 名見《植物名實圖考》。詳見雲
菘豆條。

【四季青】毛蓼(蓼科) *Polygonum bar-
batum* L. 《植物名實圖考》卷九：“四季
青生建昌。形如蓼而莖細無節，葉尖錯
生，秋時梢開白花成穗，如蓼花而疏。土
人取根敷傷。”但本書卷一四毛蓼及附圖
不為現毛蓼，白馬鞭也不是現毛蓼。毛
蓼學名中的 *Polygonum*，意為關節多的
意思；種加詞 *barbatum* 意為具髯毛的。
毛蓼為一年生草本，高 40~100 厘米。
莖直立；葉披針形，長 8~15 厘米，寬 1.5
~3 厘米，先端漸尖，基部狹窄，兩面疏
生短柔毛，尤以邊緣和中脈上為甚，托葉
鞘筒狀，長 1.5~2 厘米，膜質，密生長柔
毛，先端有粗狀的長睫毛，葉柄長約 1 厘
米，密生柔毛；穗狀花序，長 3~10 厘米，
頂生或腋生，稍分枝，苞片鞘狀，膜質，花
被 5 深裂，白色或淡紅色，雄蕊 5~8。
瘦果卵形，有 3 稜，黑色，有光澤。花期

秋季。生於水旁、田邊、路邊濕地及林下。分佈於長江以南各省區。全草有抗菌作用，可入藥；根有收斂作用，可治腸炎；種子為芳香劑，量大有催吐、瀉下作用。



四季青(毛蓼)

【四嶽近陽草】茜草(茜草科) *Rubia cordifolia* L. 名見《本草綱目》。詳見茹蘆條、四補草條。

【四眼菜】蘋(蘋科) *Marsilea quadrifolia* L. 名見《分類草藥性》。詳見四葉菜條。

【四葉細辛】及己(金粟蘭科) *Chloranthus serratus* (Thunb.) Roem. et Schult. 及己又稱四大金剛、獐耳細辛。《植物名實圖考》卷八及己：“今湖南、江西亦呼為四葉細辛，俗名四大金剛，外科要藥。”及己學名中的 *Chloranthus*，來自[希] chloros(綠色的)與 anthos(花)；*serratus* 意指有鋸齒的。及己是多年生草本，高15~50厘米。根狀莖橫走；莖直立，莖節明顯；葉對生，4~6片生於莖上部，橢圓形、倒卵形或卵狀披針形，長7~10厘米，寬2.5~6厘米，先端長尖，基部楔形，邊緣有鋸齒，齒端有1腺體，兩面無毛；穗狀花序頂生，單一或2~3分枝，花小，兩性，無花被，雄蕊3枚，下部合生，子房下位，1室，胚珠1顆，無花

柱，柱頭粗短；核果梨形，綠色。生長於陰濕樹林中。分佈於江蘇、安徽、湖北、福建、廣東、貴州等地。全草供藥用。




四葉細辛(及己)

【四葉草】蘋(蘋科) *Marsilea quadrifolia* L. 名見《天寶本草》。詳見四葉菜條。

【四葉菜】蘋(蘋科) *Marsilea quadrifolia* L. 蘋又稱芥菜、田字草、破銅錢、白蘋、蕒草、大萍、四眼菜、四葉草、水對菜、水蘇、水白等。《本草綱目》卷一九蘋：“[釋名]芥菜、四葉菜[時珍曰]蘋本作蕒。《左傳》：蘋繁蘊藻之菜，可薦於鬼神，可羞於王公。則蕒有賓之之義，故字從賓。其草四葉相合，中折十字，故俗呼為四葉菜、田字草、破銅錢，皆象形也。”蘋學名中的 *Marsilea*，來自意大利的人名 G. Marsili; *quadrifolia* 意為具四葉的。蘋為多年生草本，株高10~20厘米，根狀莖細軟，匍匐泥中；葉具長柄；葉柄端部小葉四片，十字形對生，每片小葉呈倒三角形；孢子果斜卵形或圓形，被毛；孢子期5~8月份。分佈於亞熱帶和溫帶。常生於靜止的淺水池或稻田中。全草可入藥，具清熱、利水、解毒、止血功效，可治療風熱目赤、腎炎、肝炎、瘧疾、

尿血、癰瘡、月經不調、毒蛇咬傷等症。



四葉菜(蘋)

【四補草】茜草(茜草科) *Rubia cordifolia* L. 《本草綱目》卷一八茜草：“《土宿真君本草》云：四補草，其根茜草也。一名西天王草，一名四嶽近陽草，一名鐵塔草、風車兒草。”詳見茹慮條。

【央匱】阿魏(傘形科) *Ferula assafoetida* L. 名見《本草綱目》。詳見阿虞條。

【出隧】茭筍(禾本科) *Zizania caduciflora* (Turcz ex Trin.) Hand. — Mazz. 《植物名實圖考》卷一八菰：“宋《圖經》調《爾雅》出隧，蘆蔬，即此。秋時結實，謂之彫胡米。”詳見菰條。

【仙人杖】枸杞(茄科) *Lycium chinense* Mill. 名見《抱樸子》。詳見枸櫞條。

【仙人掌】射干(鳶尾科) *Belamcanda chinensis* (L.) DC. 名見《土宿本草》。詳見野萱花條、烏扇條。


【仙術】蒼朮(菊科) *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC. 名見《本草綱目》。詳見赤朮條。

【仙遺糧】土茯苓(百合科) *Smilax glabra* Roxb. 名見《滇南本草》。詳見土草薺條。

【仙靈脾】淫羊藿(小檗科) *Epimedium*

grandiflorum Morr. 《植物名實圖考長編》卷六淫羊藿：“《圖經》：淫羊藿俗名仙靈脾，生上郡陽山山谷，今江東、陝西、泰山、漢中、湖湘間皆有之。”詳見剛前條。

【冬瓜樹】番木瓜(番木瓜科) *Carica papaya* L. 番木瓜又稱番瓜、石瓜。《植物名實圖考》卷三一番瓜：“番瓜產粵東、海南家園種植。”“又《羅江縣誌》：石瓜一名冬瓜樹，可治心痛云。”番木瓜學名中的 *Carica*，意指乾無花果，來自小亞細亞地名 *Caria*，因該地被錯誤地假定為原產地；*papaya* 意指番木瓜。番木瓜是軟木質小喬木，高達 8 米，有乳汁，莖不分枝或可在損傷處發生新枝，有螺旋狀排列的粗大葉痕。葉大，生莖頂，近圓形，常 7~9 深裂，直徑可達 60 厘米，葉柄中空，長常超過 60 厘米；花單性，雌雄異株，雄花排成長達 1 米的下垂圓錐花序，雌花單生或數朵排成傘房花序；漿果大，矩圓形，長可達 30 厘米，熟時橙黃色。廣植於世界熱帶地區。漿果可提木瓜素，能助消化；葉有強心、消腫作用；種子可榨油。



冬瓜樹(番木瓜)

【冬生】女貞(木犀科) *Ligustrum lucidum* Ait. 晉蘇彥《女貞頌》：“女貞之樹，

一名冬生，負霜葱翠，振柯凌風，故清士欽其質，而貞女慕其名，或樹之於雲堂，或植之於階庭。”詳見貞木條。

【冬年】莽吉柿(藤黃科) *Garcinia mangostana* L. 清·郭柏蒼《閩產錄異》卷二冬年：“即逃軍糧。產漳州、泉州、龍岩。以其可以度年，故名冬年。”詳見都念子條。

【冬青】女貞(木犀科) *Ligustrum lucidum* Ait. 《本草綱目》卷三六女貞：“女貞、冬青、枸骨，三樹也。女貞即今俗呼蠟樹，冬青即今俗呼凍冬樹者，枸骨即今俗呼貓兒刺者。東人因女貞茂盛，亦呼為冬青，與冬青同名異物，概一類二種爾。”詳見貞木條。

【冬青】具柄冬青(冬青科) *Ilex pedunculosa* Miq. 名見《本草綱目》。詳見凍青條。

【冬青果】椴木(山茱萸科) *Swida macrophylla* (wall.) Sojak《植物名實圖考》卷三五椴子木：“《救荒本草》，椴子木……此即江西俗呼冬青果也。”詳見松楊條。

【冬風】東風菜(菊科) *Doellingeria scaber* (Thunb.) Nees 東風菜又稱冬風菜。《本草綱目》卷二七東風菜：“[釋名]冬風[志曰]此菜先春而生，故有東風之號。一作冬風，言得冬氣也。”“[時珍曰]按裴淵《廣州記》云：東風菜，花、葉似落妊娠(婦)，莖紫。宜肥肉作羹食，香氣似蘭，味如酪。”東風菜學名中的 *Doellingeria*，來自人名 Doellinger，東風菜屬；*scaber* 意指粗糙的。東風菜是多年生草本。莖直立，圓形，高 1~1.5 米，幼枝有毛；葉互生，基部葉心形，長 9~24 厘米，寬 6~18 厘米，上綠下白，兩面有短毛，柄長 6~15 厘米，葉緣具復鋸齒，上部葉卵狀三角形，柄短有翅；頭狀花序集成圓錐傘房狀，總苞片 3 層，半圓形，外週舌狀花，白色，雌性，條狀矩圓形，中央管狀

花，管狀，黃色，多兩性；瘦果倒卵形，冠毛棕黃白色。喜生陽坡曠地。我國北、中、東部多分佈。全草入藥。



冬風(東風菜)

【冬風菜】東風菜(菊科) *Doellingeria scaber* (Thunb.) Nees 《廣群芳譜》卷一七冬風菜：“《廣州記》：冬風菜陸生，宜配肉作羹。”詳見冬風條。

【冬寒菜】冬葵(錦葵科) *Malva crispa* L. 名見《植物名實圖考》。詳見露葵條、葵菜條。

【冬蔥】火蔥(百合科) *Allium ascalonicum* L. 名見《蜀本草》。詳見胡蔥條。

【冬牆】女貞(木犀科) *Ligustrum lucidum* Ait. 名見《花鏡》。詳見貞木條、萬年枝條。

【生瓜】菜瓜(葫蘆科) *Cucumis melo* L. var. *conomon* (Thunb.) Makino 名見《本經逢原》。詳見越瓜條。

【禾雀舌】佛甲草(景天科) *Sedum lineara* Thunb. 名見於《嶺南採藥錄》。詳見佛指甲條。

【白醜】牽牛(旋花科) *Pharbitis nil* (L.) Choisy 《植物名實圖考》卷二二牽牛子：“自河以北謂之黑醜、白醜，又謂之勤孃子。”詳見盆甌草條。

【白木香】土沉香(瑞香科) *Aquilaria sinensis* (Lour.) Gilg 《南越筆記》東莞香：“夏月子熟種之，苗長尺許乃拔而蒔……至四五歲，乃斬其正幹鬻之，是為白木香。香在根，而不在幹，幹純木而色白，故曰白木香，非香，故曰白木；而不離香，故曰白木香。”詳見蜜香條。

【白毛藤】白英(茄科) *Solanum lyratum* Thunb. 始載於《百草鏡》：白毛藤“除骨節風濕痛”。《本草拾遺》：“白毛藤主瘡癩。”詳見穀菜條。

【白朮】芍藥(毛茛科) *Paeonia lactiflora* Pall. 此種不是菊科的白朮。名見《本草綱目》。詳見將離條。

【白瓜】冬瓜(葫蘆科) *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn. 《本草綱目》卷二八冬瓜：“[釋名]白瓜、水芝、地芝[志曰]冬瓜經霜後，皮上白如粉塗，其子亦白，故名白冬瓜，而子云白瓜子也。”詳見菰條。

【白瓜】菜瓜(葫蘆科) *Cucumis melo* L. var. *conomon* (Thunb.) Makino 名見《本草求原》。詳見越瓜條。

【白石木】枳椇(鼠李科) *Hovenia acerba* Lindl. 名見崔豹《古今注》。詳見檳榔條、木蜜條。

【白地草】地膚(藜科) *Kochia scoparia* (L.) Schrad. 名見《本草綱目》。詳見地葵條。

【白地栗】慈姑(澤瀉科) *Sagittaria sagittifolia* L. 《本草綱目》卷三三慈姑：“河薺苳、白地栗，所以別烏芋之薺苳、地栗也。”詳見藉姑條。

【白地榆】地榆(薔薇科) *Sanguisorba officinalis* L. 名見《滇南本草》，並曰：“苦澀，溫……治酒寒，面寒疼，肚腹疼。”詳見玉豉條。

【白羊鮮】白鮮(芸香科) *Dictamnus dasycarpus* Turcz. 白鮮又稱白羶、地羊羶、金雀兒椒、地羊鮮、白蘚等。《植物名

實圖考長編》卷六白鮮：“《別錄》：咸，無毒。療四肢不安……生上谷川谷及冤句。四月、五月採根，陰乾。陶隱居云：近道處處有，以蜀中者為良，俗呼為白羊鮮，氣息正似羊羶，或名白羶。”白鮮學名中的 *Dictamnus*，來自希臘語的 *diktamos*，意指白鮮來自 Crote 島上的 dicte 山；*dasycarpus* 意為有粗毛果實的。白鮮為多年生草本，高可達 1 米，全株有強烈刺激味。根木質化、叢生；單數羽狀復葉，小葉紙質，卵形或卵狀披針形，邊緣有鋸齒；頂生總狀花序，花大型白色，萼片 5，雄蕊 10；蒴果 5 室，種子 2~3 枚；花期 4~5 月份，果期 5~6 月份。分佈於東北至西北。喜生於疏林及草地。根、皮可入藥，具祛熱、解毒、利尿功效，可治療黃疸、咳逆、淋瀝、瘡毒、疥癬等症。




白羊鮮(白鮮)

【白旱蓮】鱧腸(菊科) *Eclipta prostrata* (L.) L. 名見《履巉巖本草》。詳見旱蓮草條。

【白杉】杉木(杉科) *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook. 《廣群芳譜》卷七十二杉：“有赤白二種，赤杉實而多油，白杉虛而乾燥。”詳見被條。

【白楊】山楊(楊柳科) *Populus davidi-*

ana Dode 山楊又稱獨搖、移楊、高飛、大葉楊等。《本草綱目》卷三五白楊：“[宗禦曰]木身似楊微白，故曰白楊，非如粉之白也。”山楊學名中的 *Populus*，在拉丁語中為白楊樹的古名，原義為人民、多數，因在古羅馬此樹多栽植於公共場所，被稱為民衆之樹；*dauidiana* 是法國植物學家 A. David 氏的拉丁化詞。山楊為落葉喬木。莖高達 25 米；葉三角狀卵圓形或近圓形，先端圓鈍或急尖，葉邊緣有波狀鈍齒，老葉無毛，葉柄長 2.5~6 厘米；早春開花，雌雄異株，柔荑花序下垂；4~5 月份成熟，蒴果橢圓狀紡錘形。分佈在我國東北、華北、西北、華中等地。喜光，生長快，不耐水濕，生於乾山坡或山溝。木材白色富彈性，造紙、做家具、做火柴桿及建築用。枝、葉、皮可入藥，可驅蛔蟲、治腹痛、肺熱咳嗽、腳氣腫等症。



白楊(山楊)

【白芨】杜若(鴨跖草科) *Pollia japonica* Thunb. 名見《名醫別錄》、《本草綱目》。詳見若芝條、杜蓮條。

【白花草】鱧腸(菊科) *Eclipta prostrata* (L.) L. 名見《嶺南採藥錄》，並曰：“鮮旱蓮草四兩。搗爛沖童便服；或加生

柏葉共同用尤效。”治吐血。詳見旱蓮草條。

【白花射干】野鳶尾(鳶尾科) *Iris dichotoma* Pall. 野鳶尾又稱冷水丹。《植物名實圖考》卷二四白花射干：“白花射干，江西、湖廣多有之。二月開花，白色有黃點，似蝴蝶花而小……”又：“俚醫謂



白花射干(野鳶尾)

之冷水丹，以為行血、通關節之藥。”野鳶尾學名中的 *Iris*，來自[希]iris，意即虹彩；*dichotoma* 意指二叉的。野鳶尾是多年生草本。根狀莖為不規則的塊狀；葉劍形，套折狀，長 15~35 厘米，寬 1.5~3 厘米；花莖實心，高達 75 厘米，上部二歧分枝，花 3~5 朵簇生，白色，有紫褐色斑點，直徑 4~4.5 厘米，外輪花被有黃褐色條紋，內輪花被較短，雄蕊 3，花柱分枝扁平，花瓣狀，頂端 2 裂；蒴果圓柱形或略彎曲，長 3.5~4.5 厘米；種子暗褐色，有小翅。生於丘陵坡上。分佈東北、華北和山東、江蘇等地。根或全草供藥用。

【白花益母草】鬘菜(唇形科) *Leonurus pseudomacranthus* Kitagawa 鬘菜又稱樓臺草、玉容草、蕓等。《植物名實圖考》卷一四鬘菜：“鬘菜，《本草拾遺》始著


錄。李時珍以其似益母草白花，遂以爲白花益母草。”鑿菜學名中的 *Leonurus*，來自[希]Leon(獅子)+oura(尾巴)，此爲益母草屬；*pseudomacranthus* 意指假大花的。鑿菜是多年生草本。圓錐形主根，密生鬚根；莖直立，高60~100厘米，莖方，有節，密被倒生柔毛；葉厚，帶革質，兩面具白毛，對生，葉片變異大，下部葉通常脫落，近莖基部葉卵圓形或三裂，裂片幾相等，中部葉通常不裂，長圓形，緣有4~5對疏齒，枝梢的葉近綫狀長圓形；腋生輪傘花序，花多數，萼鐘形，5齒，花冠白色帶紫紋，2脣，下脣3裂；小堅果長圓狀三棱形，黑褐色。生山坡、丘陵。分佈於東北、華北、華中、華東及西南等地。全草入藥治產後腹痛。



白花益母草(鑿菜)

【白花益母草】野芝麻(脣形科) *Lamium barbatum* Sieb. et Zucc. 《植物名實圖考》卷一五野芝麻：“野芝麻，臨江、九江山圃中極多。春時叢生，方莖四棱，棱青，莖微紫。對節生葉，深齒細紋，略似麻葉……葉莖味淡，微辛，作芝麻氣更膩。湖南圃中尤多，芟夷不盡，或即呼爲白花益母草。”野芝麻學名中的 *Lamium*，來自[希]laimos，咽、喉之意，野芝麻屬；*barbatum* 意指有髯毛的。野芝麻是

多年生草本。根莖有地下匍匐枝；莖直立，高1米，4棱形，具淺槽、中空；葉對生，卵形或卵狀心形，長4.5~8.5厘米，寬3.5~5厘米，先端長尾尖，緣具粗齒，兩面有短硬毛，莖上部葉較長而狹；輪傘花序生上部葉腋，苞片綫形具緣毛，萼鐘形5裂，裂片披針狀鑽形，具緣毛；花冠唇形，白色或淺黃色，上脣兜狀，下脣3裂；小堅果倒卵形。生荒野路旁。湖南、四川以北多有分佈。



白花益母草(野芝麻)

【白花藤】絡石(夾竹桃科) *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. 《植物名實圖考》卷二一白花藤：“白花藤，江西廣饒極多，蔓延墻垣，與薜荔雜廁。葉光滑如橘，凌冬不凋。開五瓣白花，形如卍字，土人無識之者。”詳見耐冬條。

【白花蟛蜞菊】鱧腸(菊科) *Eclipta prostrata* (L.) L. 名見《嶺南採藥錄》，並曰：“鮮早蓮草四兩，搗爛冲童便服；或加生栢葉共同用尤效。”治吐血。詳見早蓮草條。

【白豆】短豇豆(豆科) *Vigna cylindrica* (L.) Verdc. 短豇豆又稱飯豆等。《嘉祐本草》：“白豆，平，無毒。”短豇豆學名中的 *Vigna*，源於意大利一人名 D.

Vigna, 現為豇豆屬屬名; *cylindrica* 為圓筒狀之意。短豇豆為一年生草本。莖直立或頂端纏繞; 3 出復葉, 先端短尖, 全緣或近全緣; 總狀花序腋生, 花 2~3 朵生於序軸上部, 序軸和總花梗間有腺體, 萼鐘狀, 淺綠色, 花冠黃白帶紫色; 莢果柱形, 長 7~15 厘米, 寬 6~7 毫米; 種子長圓形或近腎形, 黃白色或暗紅色。我國各地廣泛栽培。種子食用, 也可入藥, 有健胃、補氣之效。



白豆(短豇豆)

【白刺】五加(五加科) *Acanthopanax gracilistylus* W. W. Smith 名見《本草綱目》。詳見五佳條、豺漆條。

【白參】輪葉沙參(桔梗科) *Adenophora tetraphylla* (Thunb.) Fisch. 輪葉沙參與多種同屬植物又稱知母、羊乳、羊婆孃、鈴兒草、虎鬚、苦心、文希、識美、志取。《本草綱目》卷一二沙參: “[釋名] 白參、知母、羊乳、羊婆孃、鈴兒草、虎鬚、苦心。《別錄》: 又名文希, 一名識美, 一名志取。”輪葉沙參學名中的 *Adenophora*, 來自[希]aden(腺體)與 phoros(具有); *tetraphylla* 意指四葉的。輪葉沙參是多年生草本, 有白色乳汁。根

胡蘿蔔形, 有橫紋; 莖可達 1.5 米, 不分枝; 葉通常 4 枚輪生, 葉片卵圓形至條狀披針形, 邊緣有鋸齒, 花序狹圓錐狀, 花下垂, 萼齒 5, 花冠鐘形, 藍紫色, 5 淺裂, 雄蕊 5, 子房下位, 花柱伸出花冠外, 柱頭 3 裂; 蒴果 3 室, 卵圓形; 種子黃棕色, 稍扁。多生長於山野的陽坡草叢中。分佈於華南、長江中下游各省。根供藥用, 清肺化痰。



白參(輪葉沙參)

【白昌】商陸(商陸科) *Phytolacca acinosa* Roxb. 名見《本草綱目》。詳見蓬蘽條。

【白粉】榆(榆科) *Ulmus pumila* L. 名見《爾雅》。詳見零榆條。

【白果】銀杏(銀杏科) *Ginkgo biloba* L. 《農政全書》: “銀杏, 一名白果, 一名鴨脚子。銀杏以白得名, 鴨脚取其葉之似。”詳見鴨脚子條。

【白笏樹】白笏(五加科) *Acanthopanax trifoliatum* (L.) Merr. 名見《滇南本草》。詳見五加條。

【白茅菅】白茅(禾本科) *Imperata cylindrica* (L.) Beauv. 名見《神農本草經集注》。陶弘景曰: 茅“即今之白茅菅”。詳見絲茅條。

【白馬鞭】金錢草(蓼科) *Antenoron filiforme* (Thunb.) Roberty et Vautier 《植物名實圖考》卷一四毛蓼：“毛蓼，《本草綱目》始著錄，主治癰腫、疽癩、引膿、生肌，今俚醫亦用之。其穗細長，花紅，冬初尚開，葉厚有毛，俗呼為白馬鞭。”詳見重陽柳條。

【白草】白藪(葡萄科) *Ampelopsis japonica* Mak. 名見《本經》、《植物名實圖考長編》。詳見兔核條。

【白草】白英(茄科) *Solanum lyratum* Thunb. 《名醫別錄》：白英“一名白草，生益州山谷。春採葉，夏採莖，秋採花，冬採根。”詳見穀菜條。

【白草果】薑花(薑科) *Hedychium coronarium* Koen. 《植物名實圖考》卷二三白草果：“白草果與草果同，而花白瓣肥，中惟一縷微黃。”薑花學名中的 *Hedychium*，來自[希]hedys(甜美)與 chion(雪)；*coronarium* 意指花冠的。薑花是多年生草本，高1~2米。葉片長圓狀披針形或披針形，長20~40厘米，寬4.5~8厘米，頂端長漸尖，基部楔形，無柄，葉舌長2~3厘米；穗狀花序長10~20厘米，苞片呈覆瓦狀排列，長4.5~5厘



白草果(薑花)

米，每一苞片內有花2~3朵，花萼管長4厘米，花冠白色，花冠管長8厘米，裂片披針形，長5厘米，後方的1枚呈兜狀，側生退化雄蕊長圓狀披針形，長5厘米，脣瓣倒心形，長和寬約6厘米，白色，基部稍黃，頂端2裂，花絲長約3厘米；蒴果毬形。生於熱帶山區溝谷和低平地。分佈於我國南部至西南部。根莖供藥用，花美麗、芳香，常栽培供觀賞。

【白莖】苦參(豆科) *Sophora flavescens* Alt. 《本草經》曹元字輯注(草部中品)苦參：“《別錄》又有地槐、菟槐、驕槐、白莖、虎麻、苓莖、祿白、陵郎等名。”詳見水槐條。

【白胡荽】蒼耳(菊科) *Xanthium sibiricum* Patr. 《本草綱目》卷一五泉耳：“鄭康成謂是白胡荽，幽州人呼為爵耳。”詳見卷耳條。

【白柘】柘樹(桑科) *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bru. 名見《爾雅》。詳見柘條。

【白根】白及(蘭科) *Bletilla striata* (Thunb.) Rchb. f. 《本草綱目》卷一二白及：“吳普作白根，其根有白，亦通。”詳見甘根條。

【白麵根】薺苳(桔梗科) *Adenophora trachelioides* Maxim. 名見《救荒本草》。詳見杏葉沙參條。

【白前】黏萼蠅子草(石竹科) *Silene viscidula* Franch. 名見《植物名實圖考》。詳見瓦草條。

【白給】白及(蘭科) *Bletilla striata* (Thunb.) Rchb. f. 《廣群芳譜》卷九四：“白及，[本草綱目]一名連及草，一名甘根，一名白給。”詳見甘根條。

【白旃檀】檀香(檀香科) *Santalum album* L. 《御覽》卷九八二旃檀：“旃檀，出外國。元嘉末，曾城有人於山見一大樹，員蔭數畝，三丈餘圍，辛芳酷烈。其間枯

條數尺，援之刃之，乃白旃檀。”詳見旃檀條。

【白桐】白花泡桐(玄參科) *Paulownia fortunei* (Seem.) Hemsl. 白花泡桐又稱桐、黃桐、泡桐、椅桐、榮桐等。《本草綱目》卷三五桐：“《本經》桐葉，即白桐也。桐華成筒，故謂之桐。其材輕虛，色白而有綺文，故謂之白桐。”白花泡桐學名中的 *Poulownia*，來自俄國皇帝保羅一世的女兒的名字 Anna paulowna; fortunei 來自英國植物學家的名字 Robert Fortune，指此植物由 Fortune 發現。白花泡桐為落葉大喬木。莖高達 20 米，樹皮灰褐色；幼枝、葉、花序各部均有黃褐色星狀絨毛；葉長卵狀心臟形，長約 20 厘米；花序狹長成圓柱形，小聚傘花序有花 3~8 朵；蒴果長圓形或長橢圓形，花期 3~4 月份，果期 7~8 月份。分佈於我國十多個省區。多生於低海拔的山坡林中、山谷荒地。果、花可藥用，具祛痰、止咳功效，可治療肺炎、菌痢、瘡腫、呼吸道感染等症。木材優良。



白桐(白花泡桐)

【白樺木】花曲柳(木犀科) *Fraxinus rhynchophylla* Hance 名見《本草圖經》。詳見苦樹條、稱星樹條。

【白苣】白芷(傘形科) *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. ex Franch. et Sav. 《植物名實圖考長編》卷一一白芷：“《別錄》：無毒。療風邪，久渴，吐嘔，兩肋滿，風痛，頭眩，目癢，可作膏藥面脂，潤顏色。一名白苣，一名薺，一名莞，一名苻薺，一名澤芬，葉一名蒿麻，可作浴湯。”詳見芳香條。

【白莫】白英(茄科) *Solanum lyratum* Thunb. 《本草經》曹元宇輯注白莫：“《證類》及各本，俱作‘白英’。狩谷云：‘《本草和名》作白莫。’森云：‘李唐遺卷，無作白英者。’”白莫當是最古名，後誤為白草，繼誤為白英，皆字形相近。詳見穀菜條。

【白蓮】杜若(鴨跖草科) *Polia japonica* Thunb. 名見《名醫別錄》。詳見若芝條、杜蓮條。

【白椶】蕤核(薔薇科) *Prinsepia uniflora* Batal. 名見《爾雅》。詳見蕤李子條。

【白椶】柘樹(桑科) *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bru. 名見《爾雅》。詳見柘條。

【白粱】粱(禾本科) *Setaria italica* (L.) Beauv. 名見《本草圖經》。詳見青粱條、薺其條。

【白椶】柘樹(桑科) *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bru. 名見《爾雅》。詳見柘條。

【白菖】菖蒲(天南星科) *Acorus calamus* L. 名見《名醫別錄》。詳見水菖蒲條、昌陽條。

【白菘】白菜(十字花科) *Brassica pekinensis* Rupr. 《本草綱目》卷二六菘：“白菘即白菜也。牛肚菘即最肥大者。”詳見菘條。

【白麻】苘麻(錦葵科) *Abutilon theophrasti* Medicus 《本草綱目》卷一五：“苘

麻，今之白麻也。”詳見繇麻條。

【白棠】杜梨(薔薇科) *Pyrus betulae-folia* Bge. 名見《詩疏》、《植物名實圖考長編》。詳見甘棠條、杜條。

【白萼】玉簪(百合科) *Hosta plantaginea* (Lam.) Ascherson 玉簪又稱白鶴仙、季女等。《花鏡》卷六：“玉簪花一名白萼。二月生苗成叢，葉大如小團扇，七月初抽莖。莖有細葉十餘，每葉出花一朵。花未開時，其形如玉搔頭簪，潔白如玉。”玉簪學名中的 *Hosta*，來自人名 N. Th. Host(奧)，此為玉簪屬；*plantaginea* 意為似車前草的。玉簪是多年生草本。具粗根狀莖；葉基部叢生，卵形至心狀卵形，長 15~25 厘米，寬 9~15.5 厘米；花莖於夏秋兩季從葉叢中抽出，長 40~65 厘米，總狀花序，花潔白，芳香；蒴果圓柱形，長 4~6 厘米，直徑 1 厘米；種子黑色，光澤，邊緣有翼。原產於我國及日本。我國各地均有栽培，為庭院觀賞植物。根莖、葉供藥用，具消腫、解毒、止血等功用，葉還可治蛇蟲傷，鮮花可提取芳香油。



白萼(玉簪)

【白華】芒(禾本科) *Miscanthus sinensis* Anderss. 《植物名實圖考長編》卷六茅根：“《爾雅》所謂白華，野菅是也。”詳見

筴茅條。

【白幕】白薇(蘿藦科) *Cynanchum atratum* Bunge 《植物名實圖考長編》卷六白薇：“《別錄》：咸，大寒，無毒。主療傷中淋露，下水氣，利陰氣，益精。一名白幕，一名薇草，一名春草，一名骨美。”詳見春草條。

【白幕】白英(茄科) *Solanum lyratum* Thunb. 《名醫別錄》曰：“一名白幕。”莫與幕，音形均相近。詳見穀菜條。

【白榆】榆(榆科) *Ulmus pumila* L. 《花鏡》卷三榆，伊欽恒校注：“榆，即白榆。”詳見零榆條。

【白蒺藜】背扁黃耆(豆科) *Astragalus complanatus* R. Br. ex Bunge 《本草綱目》卷一六蒺藜條：“白蒺藜，結莢長寸許，內子大如脂麻，狀如羊腎而帶綠色，今人謂之沙苑蒺藜。”詳見沙苑蒺藜條。

【白蒿】萹蒿(菊科) *Artemisia selen-gensis* Turcz. ex Bess. 《本草綱目》卷一五白蒿：“白蒿有水陸兩種，《爾雅》通謂之繁，以其易繁衍也。曰：繁，幡蒿。即今陸生艾蒿也，辛熏不美。曰：繁，由胡，即今水生萹蒿也，辛香而美。”又曰：“二種形狀相似，但陸生辛熏，不及水生者香美爾。”又曰：“萹蒿生陂澤中，二月發苗，葉似嫩艾而歧細，面青背白。其莖或赤或白，其根白脆。採其根莖，生熟蒞曝皆可食，蓋嘉蔬也。”此白蒿是現代植物學上的萹蒿，是同屬植物中惟一可葶水而生的植物。詳見萹條。

【白蒿】艾(菊科) *Artemisia argyi* Lévl. et Vant. 《本草經》最早記述白蒿為上品：“白蒿，味甘平。主治五臟邪氣，風寒濕痺，補中益氣，長髮令黑，療心懸，少食常饑。久服輕身，耳目聰明，不老。生川澤。”《名醫別錄》：“生中山，二月採。”艾與白蒿雖名稱不同却是同種植物。然而後世本草書却引出不少混亂的解釋，因此，白蒿、艾、野艾蒿是近親的多

種復合種的總稱，少數古本草書所載的白蒿，乃是白蓮蒿或豬毛蒿。艾這種白蒿，詳見冰臺條。

【白蒿】豬毛蒿（菊科）*Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. 豬毛蒿又稱山茵陳、石因陳、西茵陳、野同蒿等。《救荒本草》卷二白蒿：“生荒野中。苗高二三尺，葉如細絲，似初生松針，色微青白，稍似艾香，味微辣。”豬毛蒿學名中的 *Artemisia*，來自[希]神話中的月亮和狩獵女神，此為蒿屬；*scoparia* 意指帚狀的。豬毛蒿是一二年生草本，有濃香。主根單一，狹紡錘形，半木質化；根狀莖粗短，莖直立，單生，高 40~90 厘米，紅褐色，有縱紋，常有細營養枝；基生葉與營養枝上的葉被灰白絹毛，葉 2~3 回羽狀全裂，花期凋萎，莖下部葉 2~3 回羽狀全裂，中部葉 1~2 回羽狀全裂，裂片細絲狀；頭狀花序極多，排列成圓錐狀，花的總苞卵形，綠色，花外層雌性，內層兩性，花冠管狀；瘦果倒卵形，褐色。生曠野、路旁。分佈遍及全國。民間入藥稱土茵陳，亦作黃花蒿代用品。



白蒿(豬毛蒿)

【白鼓釘】蒲公英（菊科）*Taraxacum mongolicum* Hand. - Mazz. 名見《野菜譜》：“白鼓釘一名蒲公英，四時皆有，雖極寒天，小而可用，採之熟食。”詳見蒲公英條。

【白微】白薇（蘿藦科）*Cynanchum atratum* Bunge 名見《本草綱目》。詳見白薇條。

【白蕤】蕤核（薔薇科）*Prinsepia uniflora* Batal. 名見《西京賦注》。詳見蕤李子條。

【白膠香】楓香樹（金縷梅科）*Liquidambar formosana* Hance 《唐本草》云：“楓香脂，味辛，苦，平，無毒。主癰癤風癢，浮腫，齒痛。一名白膠香。”詳見香楓條。

【白藥】金綫吊烏龜（防己科）*Stephania cepharantha* Hayata 《本草圖經》：“白藥，今夔、施、江西、嶺南亦有之。三月生苗，似苦苣葉；四月而赤莖；六月開白花；八月結子，亦名苳蕒；九月採根，以水洗、切碎、曝乾，名白藥子。”詳見山烏龜條。

【白頭翁】毛大丁草（菊科）*Gerbera piloselloides* (L.) Cass. 名見《滇南本草》。詳見一枝香條、小一枝箭條。

【白澤】甘遂（大戟科）*Euphorbia kansui* Liou 名見《吳普本草》。詳見甘澤條、主田條。

【白環藤】蘿藦（蘿藦科）*Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino 《本草綱目》卷一八蘿藦：“[藏器曰]蘿藦東人呼為白環，藤生籬落間，折之有白汁。一名雀瓢。”詳見斫合子條。

【白檀】檀香（檀香科）*Santalum album* L. 葉廷珪《香譜》云：“皮實而色黃者為黃檀，皮潔而色白者為白檀，皮腐而色紫者為紫檀。”白檀為檀香的通稱。詳見旃檀條。

【白蘋】蘋（蘋科）*Marsilea quadriifolia*

L. 《本草綱目》卷一九蘋：“蘋乃四葉菜也。葉浮水面，根連水底……四葉合成，中折十字，夏秋開小白花，故稱白蘋。”詳見四葉菜條。

【白蘇】紫蘇（唇形科）*Perilla frutescens* Britt. 名見《本草綱目》。詳見蘇條。

【白羶】白鮮（芸香科）*Dictamnus dasycarpus* Turcz. 《本草綱目》卷一三白鮮：“弘景曰：俗呼為白羊鮮。氣息正似羊膻，故又名白膻。”詳見白羊鮮條。

【白蘘荷】蘘荷（薑科）*Zingiber mioga* (Thunb.) Rosc. 《本草圖經》：“白蘘荷舊不注所出州土，今荆、襄、江、湖間多種之，北地亦有。”詳見嘉草條。


【白鮮】白鮮（芸香科）*Dictamnus dasycarpus* Turcz. 名見《本草經集注》（草部中品）白鮮。詳見白羊鮮條。

【白鶴仙】玉簪（百合科）*Hosta plantaginea* (Lam.) Ascherson 《本草綱目》卷一七玉簪：“[釋名]白鶴仙[時珍曰]並以花象命名。”詳見白萼條。

【白蘄】當歸（傘形科）*Angelica sinensis* (Oliv.) Diels 《廣群芳譜》卷九五當歸：“當歸一名文無……一名白蘄。”詳見文無條。

【瓜子金】抱石蓮（水龍骨科）*Lepidogrammitis drymoglossoides* (Bak.) Ching 《植物名實圖考》卷一六瓜子金：“瓜子金，山石上皆有之。毛根如猴薑，橫蔓細莖，葉如瓜子稍長，厚一二分，背有黃點。”抱石蓮學名中的 *Lepidogrammitis*，來自[希]lepis（鱗片）與 *Grammitis*（屬名），禾葉蕨屬；*drymoglossoides* 意指如抱樹蓮狀的。抱石蓮是多年生草本，高達5厘米。根狀莖纖細，長而橫走，疏生鱗片，鱗片淡棕色，頂部長鑽形，下部近圓形並呈星芒狀，葉二型，營養葉倒卵圓形至矩圓狀卵圓形，長

1.5~3厘米，寬1~1.5厘米，孢子葉有短柄或無柄，倒披針形或舌形，有時也和不育葉同形，長3~6厘米，寬不及1厘米，孢子囊群圓形，遠離，沿中脈兩側成一行分佈，幼時有盾狀隔絲覆蓋。生於山谷、溪邊等陰濕的石壁上或樹上。分佈於長江流域及華南各地。全草供藥用，有清熱解毒、利濕消癥之效。



瓜子金(抱石蓮)

【瓜子菜】馬齒莧（馬齒莧科）*Portulaca oleracea* L. 名見《嶺南採藥錄》。詳見馬莧條。

【瓜香草】龍芽草（薔薇科）*Agrimonia pilosa* Ldb. 龍芽草又稱老鶴嘴、子母草、毛脚茵、黃龍尾、施州龍牙草、石打穿、金頂龍芽、鐵胡蜂。《植物名實圖考》卷一二龍芽草：“《救荒本草》：龍芽草一名瓜香草，生輝縣鴨子口山野間。”又：“按此草，建昌呼為老鶴嘴，廣信呼為子母草，湖南呼為毛脚茵。”又：“《滇南本草》謂之黃龍尾……”龍芽草學名中的 *Agrimonia*，由屬名 *Argemone* 薊罌粟屬轉化而成；*pilosa* 意指被長柔毛的。龍芽草是多年生草本，高50~120厘米，被白色長柔毛。奇數羽狀復葉，互生，小


葉片3~9,倒卵形,倒卵橢圓形或倒卵披針形,長1~6厘米,寬0.6~3厘米,邊緣有銳鋸齒,兩面具多數黃色腺點;總狀花序,萼片5,花瓣5,黃色,雄蕊5~15枚,雌蕊常2枚;瘦果。生於荒地、山坡、路旁、草地。分佈於南北各省。全草供藥用。



瓜香草(龍芽草)

【瓜槌草】漆姑草(石竹科) *Sagina japonica* (Sw.) Ohwi 漆姑草又稱牛毛黏、珍珠草。《植物名實圖考》卷一五瓜槌草:“瓜槌草一名牛毛黏,生陰濕地及花盆中。”又:“雲南謂之珍珠草,俗方以治小兒乳積。”漆姑草學名中的 *Sagina*, 來自 *sagino*, 意即填滿; *japonica* 意指日本的。漆姑草是一年生小草本,高5~20厘米,上部被稀疏腺柔毛。莖叢生,稍鋪散;葉對生,綫形,長5~20毫米,寬0.8~1.5毫米,頂端急尖,無毛,基部有薄膜相連成短鞘狀;花頂生和腋生,白色,直徑約3毫米,萼片5,邊緣膜質,花瓣5,白色,雄蕊5,短於花瓣,子房卵圓形,花柱5,綫形,柱頭上有毛狀突起;蒴果卵圓形,5瓣裂;種子微小,多數,褐色,表面具尖瘤狀凸起。生於山野、庭

園、路旁等陰濕處。分佈於江蘇、四川、湖南、湖北、貴州等地。全草供藥用。



瓜槌草(漆姑草)

【瓜樓】栝樓(葫蘆科) *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 《救荒本草》卷四:“瓜樓根俗名天花粉,本草有栝樓實,一名地樓,一名果羸,一名天瓜,一名澤姑,一名黃瓜。”詳見地樓條。

【瓜萹】栝樓(葫蘆科) *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 名見《本草綱目》。詳見天瓜條、地樓條。

【包穀】玉蜀黍(禾本科) *Zea mays* L. 《植物名實圖考》卷二:“玉蜀黍,《本草綱目》始入穀部……俗呼包穀。”詳見玉高粱條。

【氏冬】款冬(菊科) *Tussilago farfara* L. 名見《名醫別錄》。詳見苦苣條、菟奚條。

【主田】甘遂(大戟科) *Euphorbia kansui* Liou 甘遂又稱甘藷、陵澤、重澤、陵藷、甘澤、苦澤、白澤、鬼醜等。《本草經》(草部下品):“甘遂,味苦,寒,有毒。主治大腹疝瘕,腹滿,面目浮腫,留飲宿食,破症

堅積聚，利水穀道。一名主田。生川谷。”甘遂學名中的 *Euphorbia*，來自 *Euphorbus* (羅馬)，是摩利達尼亞王 Juba 的醫生之名，此為大戟屬。甘遂是多年生草本，高 25~40 厘米，含乳汁。根細長，稍彎曲，部分呈連珠狀或棒狀，外皮棕褐色；莖直立，下部木質化，淡紫紅色；單葉互生，條狀披針形或披針形，長 2~5 厘米，寬 4~10 毫米，全緣；杯狀聚傘花序，花單性，無花被，雄花多數和雌花 1 枚生於同一總苞中；蒴果近球形；種子卵形，棕色。產於我國陝西、河南、山西、甘肅、河北等地。生於荒坡草地上。根入藥，為利尿劑，主治水腫脹滿、痰飲積聚等症。



主田(甘遂)

【玄及】五味子(木蘭科) *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. 名見《吳普本草》。詳見會及條。

【玄臺】玄參(玄參科) *Scrophularia ningpoensis* Hemsl. 名見《吳普本草》。詳見正馬條、重臺條。

【玄胡索】延胡索(罌粟科) *Corydalis yanhusuo* W. T. Wang 《本草綱目》卷

一三延胡索：“[釋名]玄胡索[好古曰]本名玄胡索，避宋真宗諱，改玄為延也。”詳見元胡索條。

【半支蓮】佛甲草(景天科) *Sedum lineara* Thunb. 《醫宗匯編》：“半支蓮同香槽搗爛，少加食鹽，包住患處。”治天蛇頭疼不可忍。詳見佛指甲條。

【半春子】胡頹子(胡頹子科) *Elaeagnus pungens* Thunb. 《植物名實圖考》：“(胡頹子)湖北俗呼甜棒槌，秋末著花，葉長而厚，俗呼半春子。”詳見盧都子條。

【半邊蓮】白花地丁(堇菜科) *Viola patrinii* DC. 名見《植物名實圖考》。詳見犁頭草條。

【必栗香】化香樹(胡桃科) *Platycarya strobilacea* Sieb. et Zucc. 化香樹又稱化木香、詹香、花木香。《植物名實圖考》卷三八化香樹：“按《本草拾遺》，必栗香，味辛，溫，無毒，主鬼氣，煮服之，並燒為香，殺蟲魚。”化香樹學名中的 *Platys*，意為寬的、扁平的；*carya* 意為堅果；*strobilacea* 意為球果狀的。化香樹為落葉小喬木。莖高達 2~6 米，幼枝有棕色絨毛；奇數羽狀復葉互生，葉卵狀披針形或長橢圓狀披針形，長 4~11 厘米，寬 1.5~3.5 厘米；5~6 月份開花，單性花，雌雄同株，穗狀花序；7~8 月份成熟，果實為扁平或圓形小堅果；種子卵形，種皮



必栗香(化香樹)

黃褐色，膜質。分佈於我國黃河流域及以南地區。喜光耐乾旱瘠薄，多生長在海拔 600~1300 米的山坡雜林中。木材可制火柴桿。樹皮、根皮、葉、果序均含鞣質，可提制栲膠，種子可榨油。

【奴會】蘆薈（百合科）*Aloe vera* L. var. *Chinensis* (Haw.) Berg. 蘆薈又稱蘆會、象膽、訥會等。《本草綱目》卷三四蘆會：“[釋名]奴會、訥會、象膽[時珍曰]名義未詳。”蘆薈學名中的 *Aloe*，來自[阿]alloeh(苦味)，此為蘆薈屬；*chinensis* 意為中國的。蘆薈是多年生草本。莖極短；葉簇生於莖頂呈蓮座狀，肥厚多汁，條狀披針形，直立或近直立，長 15~36 厘米，基部寬 3.5~6 厘米，邊緣疏生刺狀小齒；花葶單一或稍分枝，高 60~90 厘米，總狀花序具幾十朵花，花黃色或具紅色斑點；蒴果三角形，室背開裂。原產非洲北部地區。我國南部和溫室中有栽培。葉、花和根均藥用，主治尿血、婦女閉經、帶下、小兒驚癇、疳積、燙傷、痔瘡、疥瘡、癰腫、刀傷、牙痛及腹痛等。



奴會(蘆薈)

【皮弁草】酸漿（茄科）*Physalis alkekengi* L. 《本草綱目》卷一六酸漿：“[時珍曰]酸漿，以子味名也。苦葳，苦耽，以苗之味名也。燈籠、皮弁，以角之形名也。

王母、洛神珠，以子之形名也。”詳見酢醬條。

【尼克特草】煙草（茄科）*Nicotiana tabacum* L. 名見《植物雜誌》1980(2)。詳見淡把姑條。

【母豬芥】天名精（菊科）*Carpesium abrotanoides* L. 名見《本草綱目》。詳見玉門精條。

六 畫

【地丁】蒲公英（菊科）*Taraxacum mongolicum* Hand. —Mazz. 《本草衍義》：“蒲公英，今地丁也。四時常有花，花罷飛絮，絮中有子，落處即生；所以庭院間有者，蓋因風而來也。”詳見蒲公英條。

【地不榮】地不容（防己科）*Stephania epigaea* Lo 地不容又稱解毒子、地芙蓉等。《植物名實圖考長編》卷一〇地不容：“《唐本草》：地不容，味苦，大寒，無毒。主解蟲毒，止煩熱，辟瘴癘，利喉閉及痰毒。一名解毒子。”範洪《滇南本草圖說》卷五：“地不榮，軟枝細藤，葉似小荷錢，根大而肥。”地不容學名中的 *Stephania*，來自[希]stephanos，王冠；*epigaea* 意指子葉出土的。地不容是草質落葉藤本。莖長數米，塊根盤狀，暗灰褐色，肉黃白



地不榮(地不容)

色，堅厚；嫩枝稍肉質，紅紫色帶白粉；葉革質，扁圓形，長3~5厘米，寬5~6.5厘米，盾狀着生，柄長4~6厘米；單傘形聚傘花序腋生，花暗紫色，具白粉，雄花，萼6片，花瓣3，偶5~6，紫色，雌花，萼1片，花瓣2或1；核果紅色。生山地灌叢，亦有栽培。分佈雲南、四川等地。塊根入藥、清熱解毒，鎮靜、理氣、止痛。

【地文】半夏(天南星科) *Pinellia ternata* (Thunb.) Breit. 名見《神農本草經》。詳見水玉條。

【地仙】枸杞(茄科) *Lycium chinense* Mill. 名見《日華子本草》。詳見枸棘條、枸櫞條。

【地瓜兒】甘露子(脣形科) *Stachys sieboldii* Miq. 名見《救荒本草》。詳見滴露條。

【地瓜兒苗】硬毛地筍(脣形科) *Lycopus lucidus* Turcz. var. *hirtus* Regel 硬毛地筍又稱小澤蘭、地筍、地蠶子、地筍子、澤蘭、虎蘭、龍棗、虎浦、孀孩兒等。《植物名實圖考》卷五：“地瓜兒苗詳《救荒本草》。方莖，葉似薄荷微長，根如甘



地瓜兒苗(硬毛地筍)

露兒更長，味甘。”硬毛地筍學名中的 *Lycopus*，來自[希] *lykos* (狼) + *pous* (足)，地筍屬；*lucidus* 光亮的，*hirtus* 意指粗硬毛的。硬毛地筍是多年生草本，高40~100厘米。根莖橫走，具節，有鱗葉，先端肥大呈圓柱形；莖直立，四稜，稜上被向上小硬毛，節上毛密；葉披針形，暗綠色，密被細剛毛狀硬毛，具緣毛，邊緣具銳齒；輪傘花序，多花密集，花萼鐘形，花冠白色，上脣2裂，下脣3裂；小堅果倒卵圓狀四邊形，褐色。喜濕，生沼澤地。幾產全國各地。肥大根莖可食用，莖葉入藥，是婦科要藥。

【地羊鮮】白鮮(芸香科) *Dictamnus dasycarpus* Turcz. 名見《本草綱目》。詳見金雀兒椒條、白羊鮮條。

【地羊羶】白鮮(芸香科) *Dictamnus dasycarpus* Turcz. 《本草圖經》云：“白鮮生上谷川谷及冤句……宜二月採，差晚則虛惡也。其氣息都似羊羶，故俗呼為白羊鮮，又名地羊羶，又名金雀兒椒。”詳見白羊鮮條。

【地芝】冬瓜(葫蘆科) *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn. 名見《廣雅》。詳見蔬條。

【地血】茜草(茜草科) *Rubia cordifolia* L. 《植物名實圖考長編》卷一〇茜根：“《說文》曰：人血所生，故一名地血，今茹蘆能治血，又所染亦赤，蓋其類爾。”《本草綱目》卷一八茜草條：“人血所化之說，恐亦俗傳耳。”詳見茹蘆條。

【地血】紫草(紫草科) *Lithospermum erythrorhizon* Sieb. et Zucc. 《本草經》(草部中品)：“紫草，味苦，寒。主心腹邪氣，五疸，補中益氣，利九竅，通水道。一名紫丹，一名紫芙，一名地血。生山谷。”詳見苳草條。

【地衣】車前(車前科) *Plantago asiatica* L. 名見《本草綱目》。詳見苳苳條、苳苳

條。

【地芙蓉】木芙蓉（錦葵科）*Hibiscus mutabilis* L. 名見《本草圖經》。詳見柃木條、拒霜花條。

【地芙蓉】地不容（防己科）*Stephania epigaea* Lo 《植物名實圖考》卷二一地不容：“雩婁農曰：……其根、苗大致似交藤，而根扁而瘠，葉厚而圓，開小紫花。詢著土人，則曰其葉易衍，其根易碩，殆無隙地能容也，故名。或以其葉團似荷錢，而易為地芙蓉，失其意矣。”詳見地不容條。

【地豆】落花生（豆科）*Arachis hypogaea* L. 《植物名實圖考長編》卷一六：“落花生曰地豆，滇曰落花松。”詳見長生菓條。

【地茄】地苳（野牡丹科）*Melastoma dodecandrum* Lour. 《植物名實圖考》卷九：“地茄生江西山崗。鋪地生葉，如杏葉而小，柔厚有直紋三道。葉中間開粉紫花團，瓣如杏花，中有小缺。土醫以治勞損。”地苳學名中的 *Melastoma*，源於希臘語 melas（黑色的）+ stoma（口），現為野牡丹屬屬名；*dodecandrum* 意為有十二個雄蕊的。地苳為披散或匍匐狀半灌木。莖分枝，下部伏地，長 10~30 厘米；葉對生，卵形或橢圓形，主脈 3~5 條；花



地茄(地苳)

兩性，1~3 朵生於枝端，淡紫色，花瓣 5；果實稍肉質，不開裂，長約 7~9 毫米，生疏伏毛；種子多數，彎曲。生於濕潤之地、酸性土壤上。我國長江以南各省區有分佈。果含鞣質，可食，根及全株可入藥，有解毒消腫、祛瘀利濕之效。

【地栢葉】虎尾鐵角蕨（鐵角蕨科）*Asplenium incisum* Thunb. 《植物名實圖考》卷一六地栢葉：“地栢葉，湖南山坡多有之。高四五寸，細莖，花葉似側栢而光，色亦淡綠，四五莖作小叢。”虎尾鐵角蕨學名中的 *Asplenium*，來自[希]a（無）與 splen（脾臟）；*incisum* 意指具缺刻的。虎尾鐵角蕨是多年生草本，高 17~25 厘米。根狀莖短而直立，頂部密生狹披針形鱗片，葉叢生，寬披針形，長 10~27 厘米，寬 1.5~4.5 厘米，無毛，二回羽狀，



地栢葉(虎尾鐵角蕨)

下部羽片漸縮小成卵形，中部羽片三角狀披針形或披針形，長 1~2 厘米，先端漸尖，邊緣有細鋸齒，葉柄下部褐紫色，有光澤；孢子囊群綫狀矩圓形，生於小脈中部，蓋薄膜質，全緣。生於溪邊及石坡

陰濕處酸性土上。分佈於黃河流域、長江流域和沿海各省。全草供藥用。

【地胡椒】石胡荽（菊科）*Centipeda minima* (L.) A. Br. et Aschers. 名見《植物名實圖考》卷一六。詳見鵝不食草條、天胡荽條。

【地草果】白花地丁（堇菜科）*Viola patrinii* DC. 名見《植物名實圖考》。詳見黎頭草條。

【地骨】枸杞（茄科）*Lycium chinense* Mill. 名見《詩疏》。詳見杞條、枸櫞條。

【地栗】葶薺（莎草科）*Heleocharis dulcis* (Burm. f.) Trin. ex Henschel 名見《本草綱目》。詳見烏芋條。

【地連錢】伏石蕨（水龍骨科）*Lemnaphyllum microphyllum* Presl 名見《綱目拾遺》。詳見螺屠草條。

【地筍】硬毛地筍（脣形科）*Lycopus lucidus* Turcz. var. *hirtus* Regel 《嘉祐本草》：“地筍溫，無毒。利九竅，通血脈，排膿治血，止鼻洪，吐血，產後心腹痛，一切血病。肥白人、產婦，可作蔬菜食，甚佳。即澤蘭根也。”詳見地瓜兒苗條。

【地筍子】硬毛地筍（脣形科）*Lycopus lucidus* Turcz. var. *hirtus* Regel 名見《本草便方》。詳見地瓜兒苗條。

【地肤】地錦（大戟科）*Euphorbia humifusa* Willd. 地錦又稱地噤、夜光、承夜、草血竭、血見愁、血風草、馬螳草、雀兒卧單、醬瓣草、獼猴頭草、爛花草。《廣群芳譜》卷九八地錦：“[本草綱目]地錦，一名地肤，一名地噤，一名夜光，一名承夜，一名草血竭，一名血見愁，一名血風草，一名馬螳草，一名雀兒卧單，一名醬瓣草，一名獼猴頭草。”地錦學名中的 *Euphorbia*，來自人名 Euphorbus（羅馬）；*humifusa* 意指匍匐地面的。地錦是一年生草本，含白色乳汁，莖纖細，匍匐，呈紅色。葉通常對生，橢圓形，長 5~10 毫米，寬

4~6 毫米，邊緣有細鋸齒；杯狀聚傘花序單生於葉腋，總苞倒圓錐形，淡紅色，頂端 4 裂，腺體 4 枚，雄花數朵和雌花 1 朵同生於總苞內；蒴果三稜狀毬形；種子黑褐色。生於田野路旁及庭院間。全國各地均有分佈。全草供藥用。



地肤(地錦)

【地烏桃】豬苓（多孔菌科）*Polyporus unbellatus* Fr. 名見《本草圖經》。詳見豕零條。

【地菘】天名精（菊科）*Carpesium abrotanoides* L. 《夢溪筆談》：“今按，地菘即天名精，蓋其葉似菘，又似蔓菁，蔓菁即蔓精也，故有二名，鶴蝨即其實也。”詳見玉門精條。

【地麥】地膚（藜科）*Kochia scoparia* (L.) Schrad. 《名醫別錄》：“無毒。去皮膚中熱氣，散惡瘡疔痕，強陰，使人潤澤。一名地麥，生荆川平澤及田野，八月、十月採實，陰乾。”詳見地葵條。

【地麥草】地膚（藜科）*Kochia scoparia* (L.) Schrad. 《唐本草注》：“田野人名為地麥草，北人名涎衣草。葉細莖赤，苗極弱，不能勝舉。今云堪為掃帚，恐未之識

也。”詳見地葵條。

【地參】知母(百合科)*Anemarrhena asphodeloides* Bge. 名見《本草經》(草部中品)知母。詳見連母條、甌母條。

【地棠草】積雪草(傘形科)*Centella asiatica* (L.) Urban. 名見《植物名實圖考》。詳見地錢草條。

【地椒】路邊青(薔薇科)*Geum aleppicum* Jacq. 《庚辛亞冊》：“地椒，多生近道陰濕處，荒田野中亦有之。叢生，苗葉似菊，莖端開黃花，實類椒而不赤。”詳見水楊梅條。

【地筋】黃茅(禾本科)*Heteropogon contortus* (L.) Beauv. 《植物名實圖考》卷八：“黃茅，即地筋。黃茅生山崗，葉莖如菅而粗大，莖梢生葉，秋時開花……”詳見菅根條。

【地筋】白茅(禾本科)*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Ness) C. E. Hubb《本草綱目》卷一三白茅條：“[釋名]根名茹根，蘭根，地筋。”詳見絲茅條。

【地筋】枸杞(茄科)*Lycium chinense* Mill. 名見《廣雅》。詳見枸櫞條。

【地落艾】益母草(唇形科)*Leonurus artemisia* (Lour.) S. Y. Hu 名見《陸川本草》。詳見菴條。

【地葵】蒼耳(菊科)*Xanthium sibiricum* Patr. 名見《本草經》。《本草綱目》卷一五：“其味滑如葵，故名地葵，與地膚同名。”詳見卷耳條。

【地葵】地膚(藜科)*Kochia scoparia* (L.) Schrad. 地膚又稱地麥、落帚、獨帚、王彗、王薺、王帚、掃帚、益明、涎衣草、白地草、鴨舌菜、千心妓女、箭、地麥草、掃帚草、苕、鷄兒木、蒲、竹帚等。《本草經》：“地膚子，味苦，寒。主治膀胱熱，利小便，補中益精氣。久服耳目聰明，輕身耐老。一名地葵。生平澤。”地膚學名中的 *Kochia*，來自人名 W. D. J. Koch



地葵(地膚)

(德), 地膚屬; *scaparia* 意指帚狀的。地膚是一年生草本, 高 50~150 厘米。根略呈紡錘形; 莖直立, 圓柱形, 多分枝, 綠色或稍帶淺紅色, 有條稜; 葉互生, 披針形或條狀披針形, 長 2~7 厘米, 寬 3~7 毫米, 先端漸尖, 基部楔形, 通常有 3 條主脈; 花兩性或雌性, 1~3 個腋生, 集成疏穗狀圓錐花序, 花被近毬形, 淡綠色, 花被 5 片, 基部合生; 胞果扁毬形, 包於花被內; 種子卵形, 黑褐色。生荒地。全國分佈。種子入藥。

【地節】玉竹(百合科)*Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce 《本草綱目》卷一二萎蕤條：“《爾雅》作委萎，字相近也。其葉光瑩而像竹，其根多節，故有莢及玉竹、地節諸名。”詳見葳參條。

【地節】枸杞(茄科)*Lycium chinense* Mill. 名見《廣群芳譜》。詳見枸櫞條。

【地新】藁本(傘形科)*Ligusticum sinense* Oliv. 名見《本草綱目》。詳見山園荜條。

【地棍】石龍芮(毛茛科)*Ranunculus sceleratus* L. 石龍芮又稱天豆、水堇、水薑臺、石能、苦堇、堇葵、彭根、鬼見愁、油灼灼、胡椒菜、魯果能、薑臺、鵝孫頭草



地椹(石龍芮)

等。《本草經》：“石龍芮，味苦，平。主治風寒濕痹，心腹邪氣，利關節，止煩滿。久服輕身明目不老。一名魯果能，一名地椹。生川澤。”石龍芮學名中的 *Ranunculus*，來自 *Rana* 蛙的縮小形，此為毛茛屬；*sceleratus* 意指有毒的。石龍芮是一年生草本。鬚根簇生；莖粗壯、直立、光滑、多枝，高 10~60 厘米；基生葉多數，具長柄，葉片腎狀圓形，長 1~4 厘米，寬 1.5~5 厘米，3 深裂，基部心形，中央裂片菱狀倒卵形，3 淺裂，側生裂片不等，2 或 3 裂，莖上部葉較小，3 全裂，裂片披針形至綫形，葉柄基部鞘狀；復傘花序，花小，瓣 5，黃色；聚合果長圓形瘦果極多。生河邊或濕地。全國分佈。全草入藥。

【地槐】苦參(豆科) *Sophora flavescens* Alt.《名醫別錄》苦參：“無毒。養肝膽氣，安五臟，定志益精……令人嗜食，輕身。一名地槐，一名菟槐。”詳見水槐條。

【地錦】爬山虎(葡萄科) *Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch. 爬山虎又名地嚙、常春藤、土鼓、土鼓藤等。《本草拾遺》：“地錦，生淮南林下。葉如鴨掌，藤莖着地，節處有根，亦緣樹石，冬

月不死，山人產後用之。”爬山虎學名中 *Parthenocissus*，來自希臘文，意為處女般的地錦或常春藤；*tricuspidata* 意為有三主脈的，形容其葉三裂狀而且具有三條主脈。爬山虎為落葉藤本。枝條粗壯，捲鬚短，多分枝，先端具黏性吸盤；葉闊卵形，長 10~20 厘米，寬 8~17 厘米，中部以上較寬，先端通常 3 裂，基部呈心形，幼苗或下部枝上的葉較小，且分成 3 小葉，均有小葉柄，中間小葉倒卵形，兩側小葉斜卵形，葉片邊緣具粗鋸齒，齒端尖銳，上面深綠色，有光澤，下面淡綠色，脈上有柔毛，葉柄長 8~22 厘米；聚傘花序通常着生於兩葉間的短枝上，長 4~8 厘米，花萼小，花冠瓣 5，雄蕊 5，花盤與子房貼生，子房上位，2 室，花柱單一；漿果藍黑色，毬形，直徑約 6~8 毫米，具 4 顆種子。花期 6 月份，果期 9 月份。多攀援牆壁及巖石上。分佈於河北、山東、河南、陝西、甘肅、山西、江蘇、浙江、江西、湖南、湖北、廣東等地。入藥可止血、祛風、止痛。治產後血瘀、腹中有塊、赤白帶下、風濕筋骨疼痛、偏頭痛。



地錦(爬山虎)

【地輔】枸杞(茄科) *Lycium chinense* Mill. 名見《神農本草經》。詳見枸杞條、枸杞條。

【地精】何首烏(蓼科) *Polygonum mul-*

tiflorum Thunb.《開寶本草》：“何首烏味苦，澀，微溫……一名野苗，一名交藤，一名地精，一名陳知白。”詳見馬肝石條。

【地麩】瞿麥(石竹科) *Dianthus superbus* L.《廣群芳譜》卷七瞿麥條：“[本草]瞿麥，一名巨句麥，一名大蘭，一名地麩。”詳見蓬麥條。

【地樓】栝樓(葫蘆科) *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 栝樓又稱菰蘆、果羸、瓜樓、天瓜、黃瓜、澤姑、瓜羹等。地樓《本草經》(草部中品)：“栝樓，味苦，寒。主治消渴，身熱煩滿，大熱。補虛安中，續絕傷。一名地樓。生川谷及山陰。”栝樓學名中的 *Trichosanthes*，來自[希] *thrix*(毛髮) + *anthos*(花)，此為栝樓屬；*kirilowii* 指[俄] P. Y. kirilow 氏的。栝樓是多年生攀援草本。塊根圓柱狀，灰黃色，莖長達 10 米，多分枝，捲鬚腋生，細長，分 2~5 叉；葉互生，葉片近圓形或近心形，長寬均約 7~20 厘米，常 3~7 淺裂或中裂；花單性，雌雄異株，雄花 3~8，排列成總狀花序，有時單生，花冠白色，雌花單生，子房卵形，花柱 3 裂；瓠果近球形，黃褐色，光滑；種子多數，呈壓扁狀。分佈於我國北部至長江流域各地。野生或栽培。果皮、種子和根入藥，果皮




地樓(栝樓)

和種子合用時主治胸痹脅痛、咳嗽多痰、大便燥結等症；根稱“天花粉”，功能清熱、生津，主治熱病、消渴等症。

【地嚙】爬山虎(葡萄科) *Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch.《本草拾遺》：“一名地錦，一名地嚙。蔓延着地，葉光淨，露下有光。”詳見地錦條。

【地嚙】地錦(大戟科) *Euphorbia humifusa* Willd. 名見《本草拾遺》。詳見地肤條。

【地錢草】積雪草(傘形科) *Centella asiatica* (L.) Urban. 積雪草又稱連錢草、馬蹄草、地棠草等。《本草綱目》卷一四積雪草：“此草葉圓如錢，荆楚人謂為地錢草。”積雪草學名中的 *Centella*，來自 *centrum*(刺) + *-ella*(小形字尾)，積雪草屬；*asiatica* 為亞洲的。積雪草為多年



地錢草(積雪草)

生匍匐草本。莖光滑或稍被疏毛，節上有不定根；單葉互生，葉片圓形或腎形，直徑約 3 厘米，邊緣具鈍齒，上面光滑，下面有細毛；傘形花序，花瓣 5 片，紅色，卵形，雄蕊 5 枚，子房下位，花柱 2，較短；雙懸果扁圓形，光滑，主稜間有網狀紋相連。多生於路旁、溝邊、田坎邊稍濕

潤而肥沃的土地。分佈於江蘇、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、四川、貴州、雲南、福建、廣東、廣西等地。全草入藥，有清熱利濕、消腫解毒之功效。治痧氣腹痛、暑瀉、痢疾、跌打損傷等疾病。

【地薰】北柴胡（傘形科）*Bupleurum chinense* DC. 北柴胡又稱芸蒿、山菜、茹草、竹葉柴胡、茈胡。《廣群芳譜》卷九四柴胡：“《本草綱目》柴胡，一名地薰，一名芸蒿，一名山菜，一名茹草。”北柴胡學名中的 *Bupleurum*，來自[希]bous(公牛)



地薰(北柴胡)

與 pleuron(肋骨); *chinense* 意指中國的。北柴胡是多年生草本，高 50~85 厘米。主根粗大，棕褐色；莖直立，上部多分枝，稍成“之”字形彎曲；基生葉倒披針形或狹橢圓形，早枯，莖生葉倒披針形或寬條狀披針形，長 3~12 厘米，寬 6~18 毫米，先端漸尖，有短芒尖頭，全緣，有平行脈 7~9 條；復傘形花序多數，傘梗 4~10，長 1~4 厘米，總苞片無或 2~3，花梗 5~10，長約 2 毫米，小總苞片 5，萼齒不明顯，花瓣鮮黃色，頂端 2 淺裂；雙懸果寬橢圓形。生於乾燥的荒山坡、路旁。分佈於我國東北、華北、西北、華東和華中各地。根供藥用。尚有多種同屬植物

亦作柴胡入藥。

【地藤草】瓜子金（遠志科）*Polygala japonica* Houtt. 名見《植物名實圖考》。詳見金鎖匙條。

【地蕪根】香附子（莎草科）*Cyperus rotundus* L. 名見《廣群芳譜》。詳見草附子條、莎草條。

【地蘭】綿棗兒（百合科）*Scilla scilloides* (Lindl.) Druce 名見《嶺南採藥錄》，並曰：“取頭搗爛，能縛治乳瘡、毒瘡。”詳見石棗兒條。

【地蠶】甘露子（唇形科）*Stachys sieboldii* Miq. 《本草會編》：“草石蠶，徽州甚多，土人呼為地蠶。肥白而促節，大如三眠蠶。”詳見滴露條。

【地蠶子】硬毛地筍（唇形科）*Lycopus lucidus* Turcz. var. *hirtus* Regel 名見《本草便方》。詳見地瓜兒苗條。

【杛】楊梅（楊梅科）*Myrica rubra* (Lour.) Sieb. et Zucc. 《花鏡》楊梅：“楊梅，一名杛，為吳、越佳果。”詳見杛子條。

【杛子】山楂（薔薇科）*Crataegus pinnatifida* Bge. 《本草綱目》卷三〇山楂：釋名杛子等，並曰：“郭璞注《爾雅》云：杛，樹如梅。其子大如指頭，赤色似小柰，可食。此即山楂也，世俗作棣字亦誤矣。”詳見猴楂條。

【杛子】楊梅（楊梅科）*Myrica rubra* (Lour.) Sieb. et Zucc. 楊梅又稱杛、聖僧等。《本草綱目》卷三〇楊梅：“[釋名]杛子[時珍曰]其形如水楊子而味似梅，故名。段氏《北戶錄》名杛子。揚州人呼白楊梅為聖僧。”楊梅學名中的 *Myrica*，[拉]楊梅，指此種植物在江河堤岸上發現，後被林奈轉用為本屬名；*rubra* 意為紅色的。楊梅為常綠喬木。莖高達 15 米以上，樹皮灰色有縱向淺裂，枝無毛；葉革質，倒卵狀或楔狀披針形，長 16 厘米以上，葉中部以上邊緣具稀疏銳鋸齒；

花期4月份,花單性,雌雄異株,雄花序圓柱形,單穗狀,雌花序卵狀長橢圓形;果期6~7月份,核果毬形,表面具乳頭狀凸起,紫紅色,外果皮肉質多汁,核堅硬卵圓形。分佈於我國長江以南各地。喜酸性土壤,喜濕耐陰。果可生食,根、樹皮、核仁均可入藥,有理氣、止血、化癥功效,可治療胃痛、疝氣、血崩、脚氣、牙痛等症。



杙子(楊梅)

【邪木】椰子(棕櫚科) *Cocos nucifera* L.《廣群芳譜》卷六七椰子:“《神異經》東南荒中有邪木,高三十丈,或十餘圍,或七八尺,其枝喬直,上不可邇也,葉如甘瓜……木高,人取不能得,惟木下有多羅之人,緣能得之。一名無葉,世人後生不見葉,故謂之無葉也。一名倚驕。”詳見胥餘條。

【邪蒿】青蒿(菊科) *Artemisia carvifolia* Buch. — Ham. ex Roxb. 青蒿又稱蒿、藪、香蒿、三庚草等。《救荒本草》卷八邪蒿:“生田園中,今處處有之。苗高尺餘,似青蒿細軟,葉又似葫蘿蔔葉微細,而多花又莖葉稠密,梢間開小碎瓣黃花,苗葉味辛,性溫,無毒。”青蒿學名中的 *Artemisia*, 來自[希]神話中的月亮和狩獵女



邪蒿(青蒿)

神,此為蒿屬; *carvifolia* 意指似傘形科葛縷子葉的。青蒿是一年生草本,有香氣。主根單一,側根少;莖單生,直立,高40~150厘米,上部多分枝,幼綠,有縱紋;葉互生,2回羽狀深裂,長5~15厘米,寬2~2.5厘米,裂片長圓形,二次裂片條形,質柔,無毛,青綠色;頭狀花序多數,排列成開展的圓錐花序,花序托半毬形,花黃綠色,冠管狀,外層雌性,內層兩性;瘦果長圓形,微小。生濕潤河邊路旁。幾佈全國。入藥,清熱涼血、止癢、不抗瘡。該種中藥也稱青蒿,但不是正品。另查《植物名實圖考》卷四邪蒿,系傘形科植物。

【芋渠】芋(天南星科) *Colocasia esculenta* (L.) Schott.《植物名實圖考長編》卷四芋:“又芋之大者,前漢謂之芋魁,後漢謂之芋渠;渠、魁,皆言大也。”詳見蹲鴟條。

【芋魁】芋(天南星科) *Colocasia esculenta* (L.) Schott.《漢書·翟方進傳》:“翟子威,飯我豆食羹芋魁。”詳見蹲鴟條。

【芋菜】薺(十字花科) *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic. 名見《醫林纂要》。

詳見護生草條。

【芍】萼薺(莎草科) *Heleocharis dulcis* (Burm. f.) Trin. ex Henschel《爾雅》：“芍，薺薺。”《爾雅翼》：“薺薺，當是薺好食之。”詳見烏芋條。

【芍】蘆葦(禾本科) *Phragmites communis* Trin. 名見《廣群芳譜》。詳見蘆條、葦條。

【芒芋】東方澤瀉(澤瀉科) *Alisma orientale* (Sam.) Juz. 《本草經》：“澤瀉，味甘，寒……一名水瀉，一名芒芋，一名鵠瀉。”詳見水瀉條。

【芒種花】西南金絲梅(藤黃科) *Hypericum henryi* Lévl. et Van. 名見《植物名實圖考》。詳見雲南連翹條。

【芒草】芒(禾本科) *Miscanthus sinensis* Anderss. 名見《華嚴經音義上》。詳見筴茅條。

【芒草】紅毒茴(木蘭科) *Illicium lanceolatum* A. C. Smith 名見《本草綱目》。詳見鼠莽、莽草條。

【芒草】白薇(蘿藦科) *Cynanchum atratum* Bunge《廣群芳譜》卷九四：“白薇，《爾雅》薺，春草。[注]一名芒草。”詳見春草條。

【芝】靈芝屬(多孔菌科) *Ganoderma* spp. 《爾雅校箋》卷下釋草第十三：“茵，芝。芝，一歲三華，瑞草。”詳見靈芝草條。

【芎藭】蘿藦(蘿藦科) *Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino《本草綱目》卷一八蘿藦：“[恭曰]按陸璣《詩疏》云：蘿藦一名芎藭，幽州謂之雀瓢。”詳見斫合子條。

【芎藭】川芎(傘形科) *Ligusticum chuanxiong* Hort. 《本草綱目》卷一四芎藭：“[釋名]胡藭、川芎、香果、山鞠窮。”詳見山鞠窮條。

【芑】稷(禾本科) *Panicum miliaceum*

L. 名見《本草綱目》。詳見藿條、稷條。

【芑】接骨草(忍冬科) *Sambucus chinensis* Lindl. 《植物名實圖考長編》卷九蒴藿：“《別錄》：蒴藿，味酸，溫，有毒。主風瘙癢疹，身癢，濕痹，可作浴湯。一名莖草，一名芑，生田野。”詳見陸英條。

【吉貝】木棉(木棉科) *Bombax malabaricum* DC. 《本草綱目》卷三六木綿：“[時珍曰]木綿有二種：似木者名古貝，似草者名古終。或作吉貝者，乃古貝之訛也。”詳見古貝條。

【老少年】莧(莧科) *Amaranthus tricolor* L. 名見《花鏡》。詳見雁來紅條。

【老虎花】羊躑躅(杜鵑花科) *Rhododendron molle* (Blum) G. Don 名見《本草綱目》卷一七羊躑躅。詳見玉枝條。

【老虎刺尖】雲實(豆科) *Caesalpinia sepiaria* Roxb. 《滇南本草》：“老虎刺尖，味苦，性寒。治咽喉腫痛乳蛾。”詳見天豆條。

【老翁鬚】忍冬(忍冬科) *Lonicera japonica* Thunb. 名見《本草綱目》。詳見金釵股條、金銀藤條。

【老鼠花】芫花(瑞香科) *Daphne genkwa* Sieb. et Zucc. 《植物名實圖考》卷二四芫花：“芫花，《本經》下品。淮南、北極多，通呼為頭痛花，以嗅其氣頭即涔涔作痛，故名。又曰老鼠花，以其花作穗如鼠尾也。”老鼠花亦見於《東還紀程》。詳見芫條。

【老鼠刺】枸骨(冬青科) *Ilex cornuta* Lindl. 名見《綱目拾遺》。詳見貓兒刺條。

【老鴉瓜】王瓜(葫蘆科) *Trichosanthes cucumeroides* (Ser.) Maxim. 名見《本草綱目》卷一八王瓜：“[釋名]土瓜、鉤蘆、老鴉瓜等。”並曰：“瓜似雹子，熟則色赤，鴉喜食之，故俗名赤雹、老鴉瓜。”詳見鉤條。

【老鴉舌】仙人掌(仙人掌科)*Opuntia dillenii* (Ker-Gawl.) Haw. 詳見平慮草條、龍舌條。

【老薺】荇蕒(十字花科)*Thlaspi arvense* L. 名見《爾雅注》。詳見遏藍菜條、大薺條。

【老鶴菜】苦苣菜(菊科)*Sonchus oleraceus* L. 名見《本草綱目》。詳見天香菜條、苦菜條。

【老鶴嘴】龍芽草(薔薇科)*Agrimonia pilosa* Ldb. 名見《植物名實圖考》。詳見瓜香草條。

【老鶴瓢】地梢瓜(蘿藦科)*Cynanchum thesioides* (Freyn) K. Schum. 《植物名實圖考》卷五地梢瓜：“《唐本草》女青，注：此草即雀瓢也，生平澤，葉似蘿藦兩相對，子似瓢形，大如棗許，故名雀瓢。根似白微，莖葉並臭。又云：蘿藦葉似女青，故亦名雀瓢。據此，則北語老鶴瓢即雀瓢矣。”詳見女青條。

【耳癩草】蒲公英(菊科)*Taraxacum mongolicum* Hand. - Mazz. 名見《本草綱目》卷二七。詳見黃花地丁條、蒲公英條。

【耳環草】鴨跖草(鴨跖草科)*Commelina communis* L. 名見《本草綱目》。詳見竹鷄草條、竹葉菜條。

【耳璫草】蒼耳(菊科)*Xanthium sibiricum* Patr. 陸璣《詩疏》：“卷耳，一名苓耳，一名藁耳。葉青白色，似胡荽……四月中生子，正如婦人耳中璫，今或謂之耳璫草。”詳見卷耳條。

【西土藍】甘藍(十字花科)*Brassica oleracea* L. var. *capitata* L. 《本草綱目》卷一六甘藍：“[藏器曰]此是西土藍也。葉闊可食。”詳見藍菜條。

【西天王草】茜草(茜草科)*Rubia cordifolia* L. 名見《本草綱目》。詳見茹蘆條、四補草條。

【西王母杖】枸杞(茄科)*Lycium chinense* Mill. 名見《名醫別錄》。詳見枸杞條、枸檮條。

【西芎】川芎(傘形科)*Ligusticum chuanxiong* Hort. 名見《本草綱目》。詳見京芎條、山鞠翦條。

【西河柳】檉柳(檉柳科)*Tamarix chinensis* Lour. 名見《本草匯言》，並曰：“味苦微鹹。”詳見兩師條。

【西洋鞠】西蕃蓮(西蕃蓮科)*Passiflora caerulea* L. 《植物名實圖考》卷三〇西蕃蓮：“《南越筆記》其種來自西洋，蔓細如絲，朱色繚繞籬間。花初開如黃白蓮，十餘出。久之十餘出者皆落，其蕊復變而為鞠。瓣為蓮而蕊為鞠，以蓮始而以鞠終，故又名西洋鞠。”詳見玉蕊花條。

【西茵陳】豬毛蒿(菊科)*Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. 《日華子本草》：“石茵陳與山茵陳同物。”另《植物研究》1991(1)P8：“據考證所謂‘山茵陳’似‘蓬蒿’而葉緊細者，或稱‘石茵陳’、‘西茵陳’等，原植物是豬毛蒿 *A. scoparia*……”詳見白蒿條。

【西國草】插田泡(薔薇科)*Rubus coreanus* Miq. 《花鏡》：“西國草，一名荃，一名覆盆子，隨處有之，秦地尤多。”詳見藜蘆條。

【西番菊】向日葵(菊科)*Helianthus annuus* L. 名見《廣群芳譜》卷三〇丈菊條。詳見迎陽花條、西番葵條。

【西番葵】向日葵(菊科)*Helianthus annuus* L. 向日葵又稱丈菊、迎陽花、西番菊等。《花鏡》卷六向日葵：“向日葵一名西番葵。高一二丈，葉大於蜀葵，尖狹多缺刻。六月開花，每幹頂上只一花，黃瓣大心，其形如盤，隨太陽回轉，如日東升則花朝東，日中天則花直朝上，日西沉則花朝西。”向日葵學名中的 *Helianthus*，來自希臘語的 *helios*(太陽)和 *an-*

themon(花); *annuus* 意為一年生的。向日葵為一年生草本。莖直立,高達3米;葉互生,有柄,葉片呈闊卵圓形,邊緣有鋸齒;頭狀花序較大,直徑可達20~40厘米,總苞片多層,舌狀花黃色,兩性花,棕色或紫色,雄蕊5個,雌蕊1個;瘦果倒卵形淺灰色或黑色;花期7~9月份,果期8~9月份。喜溫暖,耐旱。原產美洲,現我國各地均有栽培。種子可作油料,根、莖、葉、花均可入藥,具祛風、明目功效,可治療高血壓、面腫、牙痛、疝氣等症。



西番葵(向日葵)

【西番蜀秫】薏苡(禾本科) *Coix lacryma-jobi* L. 名見《廣群芳譜》。詳見解蠶條。

【百嬌】百部(百部科) *Stemona japonica* (Bl.) Miq. 名見《楊氏經驗方》。詳見野天門冬條。

【百合蒜】百合(百合科) *Lilium brownii* F. E. Brown. 名見《玉篇》。詳見蒜腦諸條。

【百兩金】牡丹(芍藥科) *Paeonia suffruticosa* Andr. 牡丹又稱鹿韭、洛陽花等。《唐本草》：“牡丹，生漢中。劍南所出者，苗似羊桃，夏生白花，秋實圓綠，冬實赤色，凌冬不凋，根似芍藥，肉白皮丹。土人謂之牡丹，亦名百兩金，京下謂之吳

牡丹者，是真也。”牡丹學名中的 *Paeonia*，來自希臘神話中的神醫 Peion 的名字；*suffruticosa* 亞灌木狀的。牡丹是多年生落葉小灌木。枝短而粗，高1~1.5米；葉互生，通常為2回3出復葉；花單生於枝端，大形，雄蕊多數，花絲紅色，花藥黃色，雌蕊2~5枚，綠色，柱頭葉狀，花盤杯狀；萼果聚生。生於向陽及土壤肥沃的地方。分佈於河北、河南、山東、四川、陝西、甘肅等地，我國各地均有栽培，是著名的觀賞植物。根、皮、花也可入藥，具有涼血、和血、消瘀之功效。



百兩金(牡丹)

【百枝】防風(傘形科) *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. 《植物名實圖考長編》卷六防風：“《別錄》：辛，無毒。主脅痛，脅風頭面去來，四肢攣急，治乳金瘡內瘻。葉主中風，熱汗出。一名茴草，一名百枝，一名屏風，一名藺根，一名百蜚。”詳見銅芸條。

【百條根】百部(百部科) *Stemona japonica* (Bl.) Miq. 名見《楊氏經驗方》。詳見野天門冬條。

【百倍】牛膝(莧科) *Achyranthes bidentata* Bl. 牛膝又稱山莧菜、對節菜、牛莖、脚斯蹬等。《本草經》(草部上品)：“牛膝，味苦平。主治寒濕痿痺，四肢拘攣，膝痛不可屈伸，逐血氣，傷熱火爛，墮胎。

久服輕身耐老。一名百倍。生川谷。”牛膝學名中的 *Achyranthes*，來自[希] *achyron*(皮、殼)+*anthos*(花)，此為牛膝屬；*bidentata* 意為有二牙齒的。牛膝是多年生草本。根圓柱形；莖直立，四稜形，節部膝狀膨大，有分枝；葉對生，卵形至橢圓形或橢圓狀披針形，長2~12厘米，寬1~5厘米，全緣；穗狀花序腋生和頂生，花小，綠色；胞果長圓形，光滑；種子1枚，黃褐色。產於我國各地。生山坡林下。根或全草入藥，性平，味苦酸，有活血散瘀、通利關節之功，主治經閉、痛經、腰膝痠痛、關節不利等症。




百倍(牛膝)

【百般嬌】虞美人(罌粟科) *Papaver rhoeas* L. 名見《花鏡》。詳見麗春條。

【百部草】百部(百部科) *Stemona japonica* (Bl.) Miq. 名見《抱撲子》。詳見野天門冬條。

【百結】紫丁香(木犀科) *Syringa oblata* Lindl. 紫丁香又稱丁子香、鷄舌香、百結花、支解香等。《花鏡》卷三：“丁香一名百結。葉似茉莉，花有紫、白二種，初春開花，細小似丁香，蓓蕾而生於枝杪，其瓣柔、色紫，清香襲人。”紫丁香學名中的 *Syringa*，來自[希] *syrinx*(管子)，此為丁香屬；*oblata* 意指扁圓形的。紫丁香是落葉灌木或小喬木，高達4米，枝條無

毛。葉卵圓形至腎形，通常寬度大於長度，對生，無毛；圓錐花序發自側芽，花冠紫色，直徑約13毫米，筒長10~15毫米；蒴果長1~2厘米，壓扁狀，頂端尖，光滑。原產於我國北部，朝鮮亦有。廣為栽培，亦野生於山地或山溝。花可提制芳香油，嫩葉亦可代茶。



百結(紫丁香)

【百結花】紫丁香(木犀科) *Syringa oblata* Lindl. 《植物名實圖考》卷二六：“丁香花，《山堂肆考》：江南人謂丁香為百結花。”詳見百結條。

【百蜚】防風(傘形科) *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. 名見《吳普本草》。詳見回芸條、銅芸條。

【百歲羹】薺(十字花科) *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic. 《清異錄》：“俗號薺為百歲羹，言至貧亦可具，雖百歲可長享也。”詳見護生草條。

【百頭】貫衆(鮮毛蕨科) *Cyrtomium fortunei* J. Sm. 名見《本草經》。詳見貫節條、濼條。

【戎菽】豌豆(豆科) *Pisum sativum* L. 《廣群芳譜》卷一〇豌豆條：“一名戎菽。《爾雅》云：戎菽謂之荏菽。注云：即胡豆。”詳見回鶻豆條。

【戎菽】玉蜀黍(禾本科) *Zea mays* L. 名見《廣群芳譜》。詳見玉高粱條。

【戎菽】大豆(豆科) *Glycine max* (L.) Merr.《植物名實圖考長編》卷一大豆條：“《鄭箋》：戎菽，大豆也。”詳見菽條。

【戎葵】蜀葵(錦葵科) *Althaea rosea* (L.) Cavan. 蜀葵又稱衛足葵、胡葵、吳葵、一丈紅、苜等。《花鏡》卷六：“蜀葵陽草也，一名戎葵，一名衛足葵。言其傾葉向陽，不令照其根也。來自西蜀，今皆有之。”蜀葵學名中的 *Althaea*，來自[希] *althaino*(醫治)，此為蜀葵屬；*rosea* 意指淡紅銅色的。蜀葵是二年生草本，高達2.5米。莖直立，不分枝，具星狀簇毛；葉互生，卵圓形或近圓心形，長6~10厘米，寬5~10厘米；花單生於葉腋，花大，直徑約6~9厘米，有淡紅、紫紅、白、黃及黑紫等色，單瓣或重瓣；果實盤狀，直徑約2厘米，被短柔毛；種子斜腎臟形，背部邊緣豎起如鷄冠狀，側面有斜紋。原產於我國西南地區。我國和世界各地廣泛栽培，供觀賞。全草入藥，有清熱止血、消腫解毒之功，治吐血、血崩等症，花和種子能利尿通便。莖皮含纖維可代麻用。



戎葵(蜀葵)

【灰莧】藜(藜科) *Chenopodium album* L.《植物名實圖考》卷四灰藿：“《詢蜀錄》：古稱藜即灰莧，老可為杖，蓋藜杖

也。”詳見藜條。

【灰條】小藜(藜科) *Chenopodium serotinum* L. 名見《野菜譜》。詳見灰藿條。

【灰條菜】小藜(藜科) *Chenopodium serotinum* L. 名見《植物名實圖考》。詳見灰藿條。

【灰桑樹】柘樹(桑科) *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bru. 名見《湘陰縣誌》。詳見柘條。

【灰菜】藜(藜科) *Chenopodium album* L.《救荒本草》卷八灰菜：“生田野中，處處有之。苗高二三尺，莖有紫紅線楞，葉有灰癖，結青子。成穗者甘，散穗者微苦，性暖，生牆下樹下者不可用。”詳見藜條。

【灰蓀菜】小藜(藜科) *Chenopodium serotinum* L. 名見《梁簡文帝勸醫文》。詳見灰藿條。

【灰滌銀粉菜】小藜(藜科) *Chenopodium serotinum* L.《植物名實圖考》卷四灰藿：“灰滌銀粉菜，作菜食令人不噎隔反胃……”詳見灰藿條。

【灰藿】藜(藜科) *Chenopodium album* L.《植物名實圖考》卷四灰藿：“灰藿，《嘉祐本草》始著錄，即灰條菜。其紅心者為藜；一種圓葉者名和尚頭，味遜。”詳見藜條。

【灰藿】小藜(藜科) *Chenopodium serotinum* L. 小藜又稱金鎖天、釐草、灰條菜、灰條、灰蓀菜、灰滌銀粉菜等。《本草綱目》卷二七灰藿：“[釋名]灰滌菜、金鎖天[時珍曰]此菜莖葉上有細灰如沙，而枝葉翹趨，故名。《梁簡文帝勸醫文》作灰蓀菜，俗訛為灰條菜。雷公炮炙論謂之金鎖天。”小藜學名中的 *Chenopodium*，來自[希] *chen*(鵝) + *podion*(小足)，藜屬；*serotinum* 意指後熟的。小藜是一年生草本，高20~50厘米。莖粗壯，多



灰藿(小藜)

分枝，有稜條和綠條紋；葉互生，葉片卵狀矩圓形，長3~5厘米，寬1.5~3.5厘米，通常三淺裂，中裂片兩邊近平行，側裂片近三角形，葉兩面被粉粒；花兩性，腋生或頂生，數花團聚成圓錐狀花序，花被近毬形，5深裂，淡綠色；胞果包在花被內，果皮與種子貼生；種子雙凸鏡狀，黑色光亮。生於荒野，全國分佈。嫩葉作野蔬。

【托盤】蓬蘽(薔薇科) *Rubus hirsutus* Thunb. 名見《救荒本草》。《植物名實圖考》卷一九潑盤條引為托盤。詳見潑盤條。

【吐血絲】菟絲子(旋花科) *Cuscuta chinensis* Lam. 名見《嶺南採藥錄》。詳見火燄草條。

【赤】大豆(豆科) *Glycine max* (L.) Merr. 《本草綱目》卷二四大豆條：“[釋名]赤，俗作菽。[時珍曰]豆、赤皆莢穀之總稱也。篆文赤，像莢生附莖下垂之形。”詳見菽條。

【同蒿】茼蒿(菊科) *Chrysanthemum coronarium* L. 《嘉祐本草》：“同蒿，平。主安

心氣，養脾胃，消水飲。又動風氣，熏人心，令人氣滿，不可多食。”詳見菊花菜條。

【同蒿菜】茼蒿(菊科) *Chrysanthemum coronarium* L. 名見《滇南本草》。詳見菊花菜條。

【回子白菜】甘藍(十字花科) *Brassica oleracea* L. var. *capitata* L. 名見《植物名實圖考》。詳見藍菜條。

【回回豆】鷹嘴豆(豆科) *Cicer arietinum* L. 鷹嘴豆又稱那合豆等。《救荒本草》卷六：“回回豆，又名那合豆，生田野中，莖青，葉似蒺藜葉……”鷹嘴豆學名中的 *Cicer*，為鷹嘴豆屬屬名；*arietinum* 為公羊角狀之意。鷹嘴豆為一年生草本。莖分枝多，有白色腺毛；羽狀復葉，小葉9~15，卵形、倒卵形或橢圓形，邊緣有小鋸齒，兩面有白色腺毛，托葉大；花單生於葉腋，萼齒5，披針形，花冠白色或淡紫色，雄蕊二組(9+1)；莢果卵毬形，淡黃色，長約2.5厘米，被白柔毛；種子1~2粒，毬形，基部具短尖，白色、紅色或黑色。生於熱帶和溫帶。我國廣東、河北、山西等地有栽培。種子食用。



回回豆(鷹嘴豆)

【回回豆】豌豆(豆科) *Pisum sativum* L. 名見《本草綱目》。詳見回鶻豆條。

【回回葱】火蔥(百合科) *Allium ascalonicum* L. 名見《本草綱目》。詳見胡蔥條。

【回回蒜】茴茴蒜(毛茛科) *Ranunculus chinensis* Bunge 名見《救荒本草》。詳見水胡椒條。

【回芸】防風(傘形科) *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schichk. 《廣群芳譜》卷九四：“防風，一名屏風，一名回芸，一名目草，一名銅芸，一名蔞根，一名百枝，一名百蜚。”詳見銅芸條。

【回陽草】卷柏(卷柏科) *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring 名見《滇南本草》卷上。詳見石蓮花條、萬歲條。

【回頭見子花】卷丹(百合科) *Lilium lancifolium* Thunb. 《廣群芳譜》卷四七山丹條在介紹山丹後，另曰：“一種高四五尺，如萱花，花大如碗，紅斑黑點，瓣俱反捲，一葉生一子，名回頭見子花，又名番山丹，根似百合，不堪食。[注]按此即本草所云卷丹也。”詳見番山丹條。

【回頭青】香附子(莎草科) *Cyperus rotundus* L. 《廣群芳譜》卷九五香附子：“《清異錄》云：香附子，湖湘人謂之回頭青，言就地劃去，轉首已青也。”詳見莎草條。

【回鶻豆】豌豆(豆科) *Pisum sativum* L. 豌豆又稱宛豆、登豆、胡豆、戎菽、畢豆、蟬豆、留豆、淮豆、國豆、青小豆、青斑豆、麻纍、寒豆、痺豆、回回豆等。《本草綱目》卷二四：“其苗柔弱宛宛，故得名豌豆。”又云：“《飲膳正要》作回回豆。回回，即回鶻也。”豌豆學名中的 *Pisum*，是拉丁語的豌豆原名；*sativum* 為種植之意。豌豆為一年或二年生攀援草本。株高 30~150 厘米，全株無毛，帶白粉；偶數羽狀復葉，小葉 2~6，葉軸頂端有分枝的捲鬚，托葉葉狀，常比小葉大，下緣有細鋸齒；花單生，或 2~3 朵組成腋生



回鶻豆(豌豆)

的總狀花序，花冠白色或帶紫色；莢果，長圓柱形；種子 2~10 粒，毬形，青綠色，乾後黃色。性喜溫暖濕潤的氣候和砂質或黏質土。我國廣泛栽培。種子及嫩葉可食用，種子還可入藥，有強壯、利尿、止瀉之功效。

【因預】茵芋(芸香科) *Skimmia reevesiana* Fortune 《本草綱目》卷一七茵芋：“[釋名]莞草、卑共[時珍曰]茵芋本作因預，未詳其義。”詳見莞草條。

【肉果】肉豆蔻(肉豆蔻科) *Myristica fragrans* Houtt. 肉豆蔻又稱豆蔻、迦拘勒等。《本草綱目》卷一四肉豆蔻：“[釋名]肉果、迦拘勒[宗奭曰]肉豆蔻對草豆蔻為名，去殼只用肉。肉油色佳，枯白瘦虛者劣。[時珍曰]花實皆似豆蔻而無核，故名。”肉豆蔻學名中的 *Myristica*，來自[希]myristikos(香味)；*fragrans* 意指芳香的。肉豆蔻是常綠喬木。莖高 15 米左右，幼枝細長；葉近革質，橢圓形，先端短漸尖，基部楔形或近圓形，長 4~8 厘米，寬 1.5~4 厘米；總狀花序腋生，單性異株，雄花序長 1~3 厘米，着花



肉果(肉豆蔻)

3~20,花被裂片3(-4),雌花序較長,着花1~2朵,花被裂片3;果常單生,假種皮紅色,至基部撕裂,種子卵珠形,生熱帶多栽培。原產於印度尼西亞馬魯古群島,我國臺灣、廣東、雲南等地有引種。本種是著名的香料和藥用植物。假果皮、果仁是調味品,亦是止瀉藥。

【肉棗】山茱萸(山茱萸科)*Cornus officinalis* Sieb. et Zucc.《本草綱目》卷三六山茱萸:“[時珍曰]《本經》一名蜀酸棗,今人呼為肉棗,皆象形也。”詳見蜀棗條。

【肉蕈】蘑菇(黑傘科)*Agaricus campestris* L. ex Fr.《本草綱目》卷二八蘑菇蕈:“[釋名]肉蕈。”詳見鷄腿蘑菇條。

【伏牛花】虎刺(茜草科)*Damnacanthus indicus* (L.) Gaertn. f. 虎刺又稱隔虎刺花、壽庭木等。《植物名實圖考》卷三五:“伏牛花,《開寶本草》始著錄。李時珍併入虎刺。”虎刺學名中的 *Damnacanthus*, 來自[希]damnao(征服的)+ akantha(荊棘),此為虎刺屬; *indicus* 意為印度的。虎刺是常綠小灌木,通常高30~100厘米。根粗大分枝,或縊縮呈念珠狀,根皮淡黃色;枝條細,灰白色,二叉分枝,被短硬毛,枝上直刺對生於葉柄間,黃綠色,




伏牛花(虎刺)

長約1~2厘米;葉對生,卵形或闊橢圓形,長1~2.5厘米,革質,全緣;花小,白色,1~2朵生於葉腋;核果近球形,直徑約5毫米,熟時鮮紅色;有4個堅硬的分核。廣佈於長江流域及其以南各地。生於陰山坡竹林下和溪谷兩旁灌叢中。全草入藥,有祛風利濕、活血消腫之功,治風濕痹痛、痰飲咳嗽、黃疸、婦女經閉、小兒疳積、蕁麻疹、跌打損傷等。

【伏兔】絲毛飛廉(菊科)*Carduus crispus* L. 名見《名醫別錄》。詳見木禾條、飛輕條。

【伏豬】絲毛飛廉(菊科)*Carduus crispus* L.《廣群芳譜》卷九六飛廉:“[本草綱目]飛廉,一名漏蘆,一名木禾,一名飛雉,一名飛輕,一名伏兔,一名伏豬,一名天薺。”詳見飛輕條。

【伏靈】茯苓(多孔菌科)*Poria cocos* Wolf. 茯苓又稱茯菟、茯苓、伏苓等。《本草綱目》卷三七茯苓:“茯苓,《史記·龜策列傳》作伏靈。蓋松之神靈之氣,伏結而成,故謂之伏靈、伏神也。”茯苓學名中的 *Poria*, 指茯苓屬; *cocos* 意指棕櫚科植物椰子,指茯苓的菌核像椰子的種子。茯苓的菌核為不規則的塊狀、毬狀體,大小不一,小者如拳,大者直徑達20~30



伏靈(茯苓)

厘米或更大；表皮淡灰棕色或黑褐色，呈瘤狀皺縮，內部白色稍帶粉紅，由菌絲組成，子實體傘形，直徑約 0.5~2 毫米；寄生於松科植物的樹根上，深入地下 20~30 厘米；分佈於河北、河南、山東、安徽、浙江、福建、廣東、廣西、湖南、湖北、四川、貴州、雲南、山西等地。乾燥菌核入藥，具有滲濕利水、益脾和胃、寧心安神之功效。

【竹帚】地膚(藜科) *Kochia scoparia* (L.) Schrad. 《滇南本草》：“竹帚子，即地膚子。味苦，性寒。利膀胱小便積熱，洗皮膚之風，療婦人諸經客熱，清利胎熱，婦人濕熱帶下用之良。”詳見地葵條。

【竹園菱】海金沙(海金沙科) *Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw. 海金沙又稱竹園菱、迷離網、鷄膠芥、斑鳩窩、左篆藤、金錢風、破網巾、黃金塔、左轉藤等。《本草綱目》卷一六海金沙：“竹園菱，其色黃如細沙也。謂之海者，神異之也。俗名竹園菱，象葉形也。”海金沙高達 1~4 米。葉軸上面有兩條狹邊，羽片多數，對生於葉軸上的短距兩側，平展，距長達 3 毫米，端有一叢黃色柔毛復蓋腋芽，不育羽片尖三角形，長寬幾相等，約 10~20 厘米或較狹，柄長 1.5~1.8 厘米，同羽



竹園菱(海金沙)

軸一樣多少被短灰毛，兩側並有狹邊，二回羽狀，一回羽片 2~3 對，互生，柄長 4~8 毫米，和小羽軸都有狹翅及短毛，基部一對卵圓形，長 4~8 厘米，寬 3~6 厘米，一回羽狀，二回小羽片 2~3 對，卵狀三角形，具短柄或無柄，互生，掌狀三裂，未回羽片短闊，中央一條長 2~3 厘米，寬 6~8 毫米，基部楔形或心臟形，先端鈍，頂端的二回羽片長 2.5~3.5 厘米，寬 8~10 毫米，波狀淺裂，向上的一回小羽形近掌狀分裂或不分裂，較短，葉緣有不規則的淺圓鋸齒，主脈明顯，側脈纖細，從主脈斜上，1~2 回二叉分歧，直達鋸齒，葉紙質，乾後綠褐色，兩面沿中肋及脈上略有短毛，能育羽片卵狀三角形，長寬幾相等，約 12~20 厘米，或長稍過於寬，二回羽狀，一回小羽片 4~5 對，互生，相距約 2~3 厘米，長圓披針形，長 5~10 厘米，基部寬 4~6 厘米，一回羽狀，二回小羽片 3~4 對，卵狀三角形，羽狀深裂；孢子囊穗長 2~4 毫米，往往長遠超過小羽片的中央不育部分，排列稀疏，暗褐色，無毛。生於山坡草地灌叢中。廣佈於我國暖溫帶及亞熱帶。全草及孢子囊入藥，主治通利小腸、療傷寒熱狂、治濕熱腫毒、小便熱淋膏淋血淋石淋

經痛、解熱毒氣。

【竹節草】馬蘭(菊科) *Kalimeris indica* (L.) Sch. - Bip. 《摘元方》：治打傷出血方：“竹節草、旱蓮草、松香、皂子葉爲末，搽入刀口。”詳見鷄兒腸條。

【竹節菜】鴨跖草(鴨跖草科) *Commelina communis* L. 《救荒本草》卷二：“竹節菜，一名翠蝴蝶，又名翠娥眉，又名筴竹花，一名倭青草。”詳見竹葉菜條。

【竹葉草】鴨跖草(鴨跖草科) *Commelina communis* L. 名見《竹譜詳錄》。詳見碧蟾蜍條、竹葉菜條。

【竹葉柴胡】北柴胡(傘形科) *Bupleurum chinense* DC. 《植物名實圖考》卷七柴胡：“《圖經》有竹葉、斜蒿葉、麥冬葉數種。”詳見地蕪條。

【竹葉菜】鴨跖草(鴨跖草科) *Commelina communis* L. 鴨跖草又稱鷄舌草、碧竹子、竹鷄草、竹葉草、淡竹葉、小青、耳環草、碧蟬花、藍姑草、竹節菜、翠蝴蝶、筴竹花、鼻斫草、翠娥眉、碧蟾蜍、碧鳳花、鴨脚、倭青草等。《本草綱目》卷一六鴨跖草：“[時珍曰]竹葉菜處處平地有之。三四月生苗，紫莖竹葉，嫩時可食。四五月開花，如蛾形，兩葉如翅，碧色可



竹葉菜(鴨跖草)

愛。”鴨跖草學名中的 *Commelina*，爲人名(荷)，此爲鴨跖草屬；*communis* 意爲共同的。鴨跖草是一年生草本。莖下部常匍匐地上，節上生根，節間較長，表面呈綠色或暗紫色；葉互生，略肉質，卵狀披針形，長3~8厘米，寬2厘米，先端短尖，全緣；聚傘花序有花數朵，花瓣深藍色；蒴果橢圓形，長5~7毫米；2室，種子4枚。多生於陰濕地區。我國各地都有分佈，越南和日本也有分佈。全草可作豬的飼料；中醫上用作清熱解毒、利尿藥，主治外感發熱、咽喉腫痛、小便不利等症。

【竹頭草】芩草(禾本科) *Phragmites japonica* Steud. 名見《植物名實圖考》。詳見芩條。

【竹鷄草】鴨跖草(鴨跖草科) *Commelina communis* L. 《廣群芳譜》卷八六：“淡竹葉，一名鴨跖草(《洛陽花木記》云，碧鳳花一名鴨脚，即此)，一名芩鷄舌草，一名碧竹子，一名竹鷄草，一名耳環草，一名碧蟬花，一名藍姑草，一名竹葉菜，處處平地有之。”詳見竹葉菜條。

【狽蒿】黃花蒿(菊科) *Artemisia annua* L. 保昇《蜀本草》：“草蒿，江東人呼爲狽蒿。”詳見臭蒿條。

【合子】榼藤子(豆科) *Entada phaseoloides* (L.) Merr. 《本草拾遺》：“象豆，甘，平，無毒……生嶺南山林，作藤著樹，如通草藤，三年一熟。角如弓袋，子若鷄卵，皮紫色，剖中仁用之，一名榼子，一名合子，主野鷄病爲上。”詳見象豆條。


【合昏】合歡(豆科) *Albizia julibrissin* Durazz. 《本草綱目》卷三五合歡：“[藏器曰]其葉至暮即合，故云合昏。”詳見青裳條。

【合鉢兒】蘿藤(蘿藤科) *Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino 名見《救荒本草》。詳見羊嬭科條、斫合子條。

【多南子】莽吉柿（藤黃科）*Garcinia mangostana* L. 沈瑩《臨海異物誌》：“多南子，如指大，其色紫，味甘，與梅子相似。出晉安。”詳見都念子條。

【多香木】土沉香（瑞香科）*Aquilaria sinensis* (Lour.) Gilg 名見《本草綱目》。詳見蜜香條。

【多骨】白豆蔻（薑科）*Amomum kravanh* Pierre ex Gagnep. 《本草綱目》卷一四白豆蔻：“[釋名]多骨[志曰]白豆蔻出伽古羅國，呼為多骨。其草形如芭蕉，葉似杜若，長八九尺而光滑，冬夏不凋，花淺黃色，子作朵如葡萄，初出微青，熟則變白，七月採之。”《植物名實圖考》卷二五白豆蔻：“白豆蔻，《酉陽雜俎》載之，《開寶本草》始著錄。今廣州有之，形如《圖經》。”白豆蔻學名中的 *Amomum*，來自[希]a+momos 無缺點之意，豆蔻屬。白豆蔻是多年生草本。莖叢生，高3米，莖基葉鞘綠色；葉片卵狀披針形，長60厘米，寬12厘米，葉舌圓形；穗狀花序由根莖發出，圓柱形，長9~11厘米，寬4~5厘米，苞片覆瓦狀排列，花萼管狀，白微透紅，花冠管裂片白色；蒴果近毬形，白色或淡黃色，有淺槽和縱綫條。生南方林下。雲南、廣東有栽培。果實藥用，作芳香健胃劑。



多骨(白豆蔻)

【多摩羅拔香】藿香（唇形科）*Agastache rugosa* (Fisch. et Meyer) O. Ktze. 名見《本草綱目》。詳見兜婁婆香條。

【朱竹】朱蕉（百合科）*Cordyline fruticosa* (L.) A. Cheval. 名見《南越筆記》。詳見鐵樹條。

【朱果】柿（柿科）*Diospyros kaki* Thunb. 《花鏡》卷四柿：“柿，朱果也。”詳見柿條。

【朱果】櫻桃（薔薇科）*Cerasus pseudocerasus* (Lindl.) G. Don 名見《品匯精要》。詳見含桃條。

【朱茱】櫻桃（薔薇科）*Cerasus pseudocerasus* (Lindl.) G. Don 《吳普本草》：“櫻桃，一名朱茱，一名麥英。”詳見含桃條。

【朱槿】木槿（錦葵科）*Hibiscus syriacus* Linn. 《廣群芳譜》卷三九：“木槿，一名椴，一名櫬，一名日及，一名王蒸，一名薺，一名朝菌，一名朱槿，一名赤槿，一名朝開暮落花。”詳見日及條。

【朱贏】菊花（菊科）*Dendranthema morifolium* (Ramat.) Tzvel. 名見《廣群芳譜》。詳見日精條、節華條。

【朱薯】番薯（旋花科）*Ipomoea batatas* (L.) Lam. 《植物名實圖考長編》卷五甘藷條：“……《閩小紀》：明時閩人得之外國……蓋渡閩海而南，有呂宋國，其國有朱薯，被野連山，不待種植，彝人率取食之。”詳見番藷條。

【朱蘭】白及（蘭科）*Bletilla striata* (Thunb.) Rehb. f. 《花鏡》卷六：“筭蘭亦名朱蘭，實非蘭也。”伊欽恒校注：“又有連及草、甘根、白根等名，系蘭科多年生草本。”詳見甘根條。

【朱櫻】櫻桃（薔薇科）*Cerasus pseudocerasus* (Lindl.) G. Don 《名醫別錄》：“櫻桃，味甘，主調和，益脾氣，令人好顏色。陶隱居云：此即今朱櫻。”詳見含桃條。

【朱欒】柚（芸香科）*Citrus maxima* (Burm.) Merr. 《本草綱目》卷三〇柚：“[時珍曰]柚色油然，其狀如卣，故名。

壺亦象形。今人呼其黃而小者爲蜜筒，正此意也。其大者謂之朱欒，亦取團欒之象。最大謂之香欒。《爾雅》謂之欒，又曰椴。《廣雅》謂之鑄柚，鑄亦壺也。《桂海誌》謂之臭柚，皆一物。但以大小古今方言稱呼不同耳。”詳見條條。

【朱欒】枸櫞(芸香科)*Citrus medica* L. 《花鏡》卷四香櫞：“香櫞，一名枸櫞……有大小兩種。皮光細而小者爲香櫞，皮粗而大者爲朱欒，香味不佳。”詳見香櫞條。

【自灸】毛茛(毛茛科)*Ranunculus japonicus* Thunb. 名見《本草綱目》。詳見毛建草條。

【自然穀】砂鑽臺草(莎草科)*Carex kobomugi* Ohwi 名見《博物誌》。詳見薜草條。

【血皮菜】觀音莧(菊科)*Gynura bicolor* DC. 名見《植物名實圖考》。詳見木耳菜條。

【血見愁】地錦(大戟科)*Euphorbia humifusa* Willd. 名見《本草綱目》。詳見地朕條。

【血見愁】茜草(茜草科)*Rubia cordifolia* L. 名見《土宿本草》。詳見茹蘆條。

【血見愁】紅絲綫(茄科)*Lycianthes biflora* (Lour.) Bitter 《植物名實圖考》卷九紅絲綫：“紅絲綫產南安。莖綠有毛，葉如山茶葉而薄，長柄下垂。結實如珠，生青熟紅，綠蒂托之。一名血見愁。俚醫搗敷紅腫，以爲良藥。”紅絲綫學名中的 *Lycianthes*，來自[希] *Lykion*，*lycin* (枸杞)與 *anthos* (花)，此爲紅絲綫屬；*biflora* 是有兩性花的。紅絲綫是半灌木。莖高 0.5~1.5 米，小枝、葉柄、花梗及花萼上密生淡黃色柔毛；葉互生，上部葉常成假對生，大小不相等，大葉片橢圓狀卵形，偏斜，長 9~15 厘米，寬 3~7 厘米，小葉片寬卵形，先端短漸尖，長 2.5~4 厘米，寬 2~3 厘米，葉兩面都具疏

柔毛；花常 2~3 朵生於葉腋，花萼杯狀，花冠淡紫色或白色，星狀，直徑 5~12 毫米，深 5 裂；漿果毬形，生青熟紅；種子卵狀三角形。生陰濕高山林下。南方高山有分佈。



血見愁(紅絲綫)

【血風草】地錦(大戟科)*Euphorbia humifusa* Willd. 名見《本草綱目》。詳見地朕條。

【血參】大葉三七(五加科)*Panax pseudo-ginseng* Wall. var. *japonicus* (C. A. Mey.) Hoo & Tseng 名見《花鏡》。詳見土參條。

【血竭】麒麟竭(棕櫚科)*Daemonorops draco* Bl. 麒麟竭又稱渴留、木血竭、海臘等。《本草圖經》云：“麒麟竭，舊不載所生州土，今出南番諸國及廣州。木高數丈，婆娑可愛，葉似櫻桃而有三角，其胎液從木中流出，滴下如膠飴狀，久而堅凝，乃成竭，赤作血色，故亦謂之血竭。”血竭學名中的 *Daemonorops*，來自希臘語的 *daimon* (神)和 *rhops* (灌木)，指該植物株形優美；*draco* 在拉丁語中爲龍，蛇之意。麒麟竭爲多年生常綠藤本，長達 10~20 米。莖遍生尖刺；羽狀復葉互生，葉綫狀披針形，先端銳尖；花單性，雌雄異株，肉穗花序；核果卵狀毬形，徑約 3~4 厘米，赤褐色，具黃色鱗片；有種子



血竭(麒麟竭)

1枚。主要分佈於印度尼西亞、馬來西亞、我國廣東、臺灣等地。果實可入藥，具散瘀定痛、止血生肌功效，可治療跌打折損、內傷瘀痛、外傷出血不止、癰癤、疔瘡、潰久不合等症。

【血竭】大血藤(木通科) *Sargentodoxa cuneata* (Oliv.) Rehd. et Wils. 名見《植物名實圖考》。詳見血藤條。

【血藤】大血藤(木通科) *Sargentodoxa cuneata* (Oliv.) Rehd. et Wils. 大血藤又稱過山龍、千年健、大活血、血竭。《植物名實圖考》卷一九大血藤：“李時珍按虞搏云，血藤即過山龍……”又：“羅思舉《簡易草藥》：大血藤即千年健，汁漿即見血飛，又名血竭，雌雄二本。”又：“今江西廬山多有之，土名大活血。”大血藤學名中的 *Sargentodoxa*，來自人名 Ch. S. Sargent(美國植物學家)與[希]adoxa(光榮)；*cuneata* 意指楔形的。大血藤是落葉木質藤本。3出復葉，互生，葉柄長，中間小葉菱狀卵形，先端尖，基部楔形，全緣，有柄，兩側小葉較中間者大，斜卵形，基部兩邊不對稱，外側截形或圓形，幾無柄；花序總狀，下垂，花單性，雌雄異株，萼片和花瓣均6片，黃色，雄花有雄蕊6個，雌花有不發育雄蕊6個，心皮多數，離生；漿果卵圓形。生於林下、溪邊。



血藤(大血藤)

分佈於河南、安徽、江蘇、湖南、湖北等地。根和藤入藥。

【血槠】苦槠(殼斗科) *Castanopsis sclerophylla* (Lindl.) Schottky 《本草綱目》卷三〇槠子：“苦槠子粒大，木文粗赤，俗名血槠。”苦槠學名中的 *Castanopsis*，來自 *Castanea* 栗屬(殼斗科)與[希]opsis 相似；*sclerophylla* 意指硬質葉的。苦槠是常綠喬木，高5~10米，幼枝無毛。葉革質，橢圓狀卵形或橢圓形，長7~14厘米，寬3~5厘米，先端漸尖或短漸尖，基部圓形至楔形，邊緣在中部以上有3~6對疏鋸齒，下部全緣，羽狀側脈10~14對，葉柄長1~3厘米；雄花序穗狀腋生，長8~15厘米，雌花單生總



血槠(苦槠)

苞內，殼斗扁毬形，直徑 8~10 毫米，幼時全包堅果，苞片排列成 4~6 個同心環；堅果圓錐形，直徑 1.1~1.4 厘米，成熟時殼斗開裂，包圍堅果 3/5~4/5。生長於丘陵或低山森林中。除雲南、廣東和臺灣外，廣佈於長江以南各省區。樹皮、葉、種仁供藥用，種子可做豆腐食用。

【江柳】旱柳(楊柳科) *Salix matsudana* Koidz. 名見《花鏡》卷三柳條。詳見河柳條、官柳條。

【江離】川芎(傘形科) *Ligusticum chuanxiong* Hort. 屈原《離騷》：“扈江離與辟芷兮，紉秋蘭以為佩。”詳見山鞠翦條。

【冰粉樹】桑寄生(桑寄生科) *Taxillus sutchuenensis* (Lecomte) Danser 名見《滇南本草》整理本。詳見寄屑條。

【冰臺】艾(菊科) *Artemisia argyi* Lévl. et Vant. 艾又稱艾蒿、黃草、醫草、白蒿等。《植物名實圖考》卷一一：“艾，《別錄》中品。《爾雅》：艾，冰臺。古人以灸百病，其治滯下諸證，亦入煎用之。今以蕪州產者良。”艾學名中的 *Artemisia*，來自[希]神話中的月亮和狩獵女神



冰臺(艾)

Artemis, 此為蒿屬。艾是多年生草本，高 45~120 厘米。主根明顯，略粗長，側根多，常有橫臥地下根狀莖及營養枝；莖直立，質硬，被灰白色軟毛，從中上部以上有短分枝；單葉互生，莖下部的葉在開花時枯萎，中部葉具短柄，葉片卵形、三角狀卵形或近菱形，長 5~9 厘米，寬 4~8 厘米，羽狀深裂或淺裂，裂片橢圓狀披針形，邊緣具鋸齒，上部葉漸小，三裂或全緣，無柄；頭狀花序多數，排列成復總狀；瘦果長圓形或長卵形。除極乾旱與高寒地區外，分佈遍及全國。生於路旁、草地、荒野等處。果實稱艾實，有明目之功，葉片入藥，治久痢、下血、月經不調、崩漏、帶下、疥癬等症。

【交加枝】枳椇(鼠李科) *Hovenia acerba* Lindl. 名見《雷公炮炙論》。詳見檳榔條、木蜜條。

【交莖】何首烏(蓼科) *Polygonum multiflorum* Thunb. 名見《廣群芳譜》。詳見馬肝石條。

【交時】卷柏(卷柏科) *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring 名見《名醫別錄》。詳見豹足條、萬歲條。

【交麻】芝麻(胡麻科) *Sesamum indicum* L. 《本草綱目》卷二二胡麻：“……又《杜實拾遺記》云：隋大業四年，改胡麻曰交麻。”詳見胡麻條。

【交藤】何首烏(蓼科) *Polygonum multiflorum* Thunb. 《本草圖經》云：“此藥本名交藤，因何首烏服而得名也。”詳見馬肝石條。

【交讓木】楠木(樟科) *Phoebe zhennan* S. lee et F. N. Wei 《植物名實圖考長編》卷一八楠木：“任方云：黃金山有楠木，一年東邊榮西邊枯，一年西邊榮東邊枯。張華云：交讓木。宋子京云：讓木，即楠也。”詳見楠條。

【充蔚】益母草(脣形科) *Leonurus artemisia* (Lour.) S. Y. Hu 《本草經》：“充蔚子，味辛，微溫。主明目益精，除水氣。久服輕身。莖，主癰癢，可作湯浴。一名益母，一名益明，一名大札。生池澤。”詳見菴條。

【羊不食草】羊躑躅(杜鵑花科) *Rhododendron molle* (Blum) G. Don 名見《本草拾遺》。詳見玉枝條。

【羊矢棗】君遷子(柿科) *Diospyros lotus* L. 《植物名實圖考長編》卷一七軟棗：“按樗即《釋木》之遵羊棗也。郭云：實小而圓，紫黑色，今俗呼之為羊矢棗。”詳見軟棗條。

【羊矢橘】金橘(芸香科) *Fortunella margarita* (Lour.) Swingle 名見《植物名實圖考長編》卷一六金橘條。詳見金棗條、盧橘條。

【羊石子】雲實(豆科) *Caesalpinia sepiaria* Roxb. 名見《本草圖經》。詳見臭草條、天豆條。

【羊石子草】雲實(豆科) *Caesalpinia sepiaria* Roxb. 名見《本草圖經》。詳見臭草條、天豆條。

【羊耳朵】密蒙花(馬錢科) *Buddleja officinalis* Maxim. 《滇南本草》羊耳朵：“羊耳(朵)，味酸苦，性微溫。”詳見水錦花條。

【羊尿胞】苦馬豆(豆科) *Sphaerophysa salsula* (Pall.) DC. 苦馬豆又稱馬屁胞等。《救荒本草》卷四：“苦馬豆，俗名羊尿胞。生延津縣郊野中……”苦馬豆學名中的 *Sphaerophysa*，源於希臘語 *sphaira*(球) + *physa*(氣泡)，現為苦馬豆屬屬名。苦馬豆為直立小灌木，高 20~60 厘米。羽狀復葉，小葉 13~21，倒卵狀橢圓形，下面有白色伏毛，小葉柄極短，托葉披針形；總狀花序腋生，萼杯狀，花冠淡紅色，子房柄明顯；莢果膜質，矩

圓形，有長柄；種子多數，腎狀圓形，棕褐色。分佈於河南、河北、山西、陝西、甘肅等地。可作綠肥，對牲畜有毒。



羊尿胞(苦馬豆)

【羊肚菜】蘑菇(黑傘科) *Agaricus campestris* L. ex Fr. 《廣菌譜》云：“蘑菇，出山東……一種狀如羊肚，有蜂巢眼者，名羊肚菜。”詳見鷄腿蘑菇條。

【羊角】決明(豆科) *Cassia tora* L. 《廣雅疏證》卷一〇：“決明，羊角也。”詳見決明條。

【羊角】豇豆(豆科) *Vigna unguiculata* Verdc. 名見《醫林纂要》。詳見豇豆條。

【羊角瓜】菜瓜(葫蘆科) *Cucumis melo* L. var. *conomon* (Thunb.) Makino 《本草綱目》卷二八越瓜：“越瓜南北皆有……一種長者至二尺許，俗呼羊角瓜。其子狀如胡瓜子，大如麥粒。其瓜生食，可充果、蔬，醬、豉、糖、醋藏浸皆宜，亦可作菹。”詳見越瓜條。

【羊角苗】蘿藦(蘿藦科) *Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino 名見《救荒本草》。詳見羊爛科條、斫合子條。

【羊角菜】白花菜(白花菜科) *Cleome gynandra* L. 白花菜又稱屢析草。《本